



DAHS & REUTER & CO

JUNGSFELD  
OBERPLEIS

1914  
HERBST  
FRÜHLIHR  
1915

BAUMSCHULEN  
GARTEN-  
ARCHITEKTUR









# DAHS, REUTER & C<sup>o</sup>

## BAUMSCHULEN JÜNGSFELD

POST OBERPLEIS BEZ. CÖLN • GEGRÜNDET 1877

Mitglied des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer

Telegr.-Adr.: Dahs Reuter Oberpleis

Telephonruf: Amt Oberpleis Nr. 1

Reichsbank-Giro-Konto: Bonn \* Postscheck-Konto: Nr. 654 Cöln

Correspondance française :-: English correspondence



## Preis-Verzeichnis

Herbst 1914

Frühjahr 1915




Der Katalog gelangt jährlich im September zum Versand und zwar an sämtliche Auftraggeber **der letzten drei Jahre**. Unsere übrige geehrte Kundschaft bitten wir, wenn Bedarf vorliegt, das Preisverzeichnis einzufordern. Zusendung erfolgt kostenlos. Nachdruck verboten.



KUNSTDRUCKEREI  
ZIEGLER BECKMANN KÖLN







# Haupt-Eisenbahn-Anschlüsse

Gültig für Sommer 1914

Ohne Gewähr

## Cöln-Siegburg-Uthweiler-Jüngsfeld.

|     |     |      |      |     |     |     |     |      |                          |     |     |      |      |     |     |     |      |
|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|--------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| 544 | 649 | 1018 | 1200 | —   | 347 | 500 | 613 | 846  | ab Cöln H.-B. . . an     | 658 | 819 | 1127 | 205  | 355 | 727 | 914 | 1126 |
| 623 | 730 | 1054 | 1239 | —   | 423 | 538 | 645 | 908  | an Troisdorf . . . ab    | 618 | 757 | 1053 | 123  | 315 | 650 | 837 | 1104 |
| 629 | 732 | 1056 | 1243 | —   | 428 | 545 | 650 | 909  | ab Troisdorf . . . an    | 616 | 755 | 1050 | 105  | 311 | 640 | 833 | 1055 |
| 635 | 738 | 1102 | 1249 | —   | 436 | 551 | 656 | 915  | an Siegburg . . . ab     | 610 | 749 | 1043 | 1259 | 305 | 634 | 825 | 1049 |
| 653 | 750 | 1110 | 100  | 210 | 455 | 600 | 726 | 940  | ab Siegb. (Bröltalb.) an | 600 | 730 | 1033 | 1150 | 256 | 530 | 808 | 1020 |
| 709 | 808 | 1126 | 116  | 225 | 510 | 615 | 740 | 956  | an Niederpleis . . ab    | 544 | 715 | 1020 | 1133 | 241 | 515 | 752 | 1094 |
| 724 | 818 | 1130 | 122  | 245 | 515 | 620 | 746 | 1005 | ab Niederpleis . . an    | 543 | 713 | 1018 | 1127 | 235 | 510 | 740 | 1001 |
| 749 | 851 | 1155 | 149  | 310 | 540 | 653 | 811 | 1030 | an Uthw.-Jüngsfeld ab    | 513 | 649 | 954  | 1100 | 211 | 446 | 716 | 937  |

## Beßdorf-Hennef-Uthweiler-Jüngsfeld.

|     |     |      |     |      |     |     |     |      |                        |     |     |      |      |     |     |      |      |
|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 439 | 641 | 1000 | —   | 1246 | —   | 307 | 548 | —    | ab Beßdorf . . . an    | —   | 916 | 1222 | —    | 529 | —   | 1014 | —    |
| 600 | 739 | 1056 | —   | 214  | —   | 429 | 716 | —    | an Hennef . . . ab     | —   | 750 | 1047 | —    | 407 | —   | 847  | —    |
| 646 | 750 | 1100 | —   | 216  | —   | 450 | 720 | —    | ab Hennef (Bröltb.) an | —   | 741 | 1045 | —    | 305 | —   | 813  | —    |
| 711 | 814 | 1125 | —   | 240  | —   | 513 | 743 | —    | an Niederpleis . . ab  | —   | 716 | 1021 | —    | 243 | —   | 746  | —    |
| 724 | 818 | 1130 | 122 | 245  | 515 | 620 | 746 | 1005 | ab Niederpleis . . an  | 543 | 713 | 1018 | 1127 | 235 | 510 | 740  | 1001 |
| 749 | 851 | 1155 | 149 | 310  | 540 | 653 | 811 | 1030 | an Uthw.-Jüngsf. . ab  | 513 | 649 | 954  | 1100 | 211 | 446 | 716  | 937  |

## Coblenz-Bonn-Uthweiler-Jüngsfeld.

|     |     |      |     |      |     |     |     |      |                         |     |      |      |      |     |     |     |   |
|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---|
| —   | —   | 803  | —   | 1206 | —   | —   | 442 | 629  | ab Coblenz . . . an     | —   | 1009 | 108  | 232  | 529 | —   | 921 | — |
| —   | —   | 913  | —   | 155  | —   | —   | 627 | 814  | an Bonn . . . ab        | —   | 822  | 1112 | 1233 | 342 | —   | 845 | — |
| 643 | —   | 950  | —   | 205  | —   | —   | 710 | 826  | ab Beuel (Bröltalb.) an | —   | 745  | 1052 | 1159 | 315 | —   | 816 | — |
| 713 | —   | 1019 | —   | 240  | —   | —   | 735 | 854  | an Niederpleis . . ab   | —   | 716  | 1021 | 1129 | 245 | —   | 745 | — |
| 724 | 818 | 1130 | 122 | 245  | 515 | 620 | 746 | 1005 | ab Niederpleis . . an   | 543 | 713  | 1018 | 1127 | 235 | 510 | 740 | — |
| 749 | 851 | 1155 | 149 | 310  | 540 | 653 | 811 | 1030 | an Uthw.-Jüngsf. . ab   | 513 | 649  | 954  | 1100 | 211 | 446 | 716 | — |

## Niederlahnstein-Niederdollendorf-Beuel.

|     |   |     |      |      |   |     |     |     |                        |                              |      |      |     |     |     |      |      |
|-----|---|-----|------|------|---|-----|-----|-----|------------------------|------------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| 553 | — | 543 | 750  | 1049 | — | 220 | 406 | 605 | ab Niederlahnstein an  | 850                          | 1036 | 152  | 340 | 550 | 807 | 1140 | 1253 |
| 556 | — | 755 | 950  | 1249 | — | 433 | 634 | 804 | an Niederdollend. ab   | 657                          | 832  | 1144 | 141 | 328 | 608 | 933  | —    |
| 611 | — | 808 | 1003 | 102  | — | 447 | 646 | 818 | an Beuel (Staatsb.) ab | 644                          | 819  | 1131 | 128 | 315 | 555 | 920  | 1112 |
|     |   |     |      |      |   |     |     |     |                        | bis Haltest. Pützchen 0,8 km |      |      |     |     |     |      |      |

## Pützchen-Uthweiler-Jüngsfeld.

|     |     |      |     |     |     |     |     |      |                       |     |     |      |      |     |     |     |      |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| 649 | —   | 956  | —   | 211 | —   | —   | 717 | 832  | ab Pützchen . . . an  | —   | 739 | 1046 | 1153 | 309 | —   | 810 | —    |
| 713 | —   | 1019 | —   | 240 | —   | —   | 735 | 854  | an Niederpleis . . ab | —   | 716 | 1021 | 1129 | 245 | —   | 745 | —    |
| 724 | 818 | 1130 | 122 | 245 | 515 | 620 | 746 | 1005 | ab Niederpleis . . an | 543 | 713 | 1018 | 1127 | 235 | 510 | 740 | 1001 |
| 749 | 851 | 1155 | 149 | 310 | 540 | 653 | 811 | 1030 | an Uthw.-Jüngsf. . ab | 513 | 646 | 954  | 1100 | 211 | 446 | 716 | 937  |

## Niederdollendorf-Grengelsbiße.

|     |     |     |      |        |     |     |     |     |                      |                           |     |     |      |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------------|---------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 700 | 808 | 837 | 1032 | W. 100 | 152 | 332 | 452 | 638 | ab Niederdollend. an | 818                       | 941 | 954 | 1236 | 309 | 556 | 626 | 755 |
|     |     |     |      |        |     |     |     |     |                      | (Heisterbacher Talbahn)   |     |     |      |     |     |     |     |
| 736 | 844 | 913 | 1108 | 136    | 228 | 408 | 528 | 714 | an Grengelsbiße . ab | 742                       | 905 | 918 | 1200 | 233 | 520 | 550 | 719 |
|     |     |     |      |        |     |     |     |     |                      | (4 km Fußfour b. Jüngsf.) |     |     |      |     |     |     |     |

Für die Züge Niederpleis-Uthweiler, die von Beuel (Rheinufer) keinen Anschluß haben, empfiehlt sich mit der elektrischen Kreisbahn ab Bonn (Beethovenhalle) bis Niederpleis-Menden zu fahren. (Abfahrt der Züge 10 Minuten vor jeder vollen und halben Stunde.) Entfernung von Haltestelle Niederpleis-Menden bis Niederpleis (Bröltalbahn) 1,6 km.



# Verkaufs- und Versandbedingungen der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant  
und dem Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

## Preise und Zahlung:

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 5 Stück einer Art und Form, der Hundertpreis bei 50, der Tausendpreis bei 500, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind unstatthaft. Wir bitten Reichsbank- und Postscheck-Konto zu benutzen, Geldsendungen sind dann für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag unter vorheriger Anzeige durch Postnachnahme eingezogen.
7. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Katalogs nicht unbedingt maßgebend, sondern werden ev. dem Werte der gewählten Pflanzen entsprechend abgeändert.

## Versand:

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Abzüge für auf dem Transport, durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. Derartige Reklamationen müssen an der Empfangsstation, oder beim Spediteur gemacht werden.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

## Verpackung:

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Nur die unbeschädigten Körbe werden bei sofortiger Franko-Rücksendung und gleichzeitiger Benachrichtigung wieder gutgeschrieben, unter Abzug von  $\frac{1}{3}$  des Nettobetrages für Verschleiß.

## Rollgeld:

Das Rollgeld zur Bahn (Mark — 20 per Zentner) trägt der Besteller. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet.

## Qualität und Garantie:

1. Geschäfts-Prinzip ist: Nur absolut fehlerfreies, gesundes Pflanzenmaterial zum Versand zu bringen. Sollte in einem Falle irgendwie fehlerhafte Ware zur Abfertigung gelangen, so bitten um sofortige Benachrichtigung. Spätere Reklamationen, insbesondere bezüglich des Nichtanwachsens müssen unter allen Umständen abgelehnt werden.
2. Garantie für das Anwachsen wird nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Vereinbarung übernommen bei Zahlung eines Zuschlages von 10% zu den Fakturenpreisen.
3. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

## Ersatz für ausverkaufte Sorten:

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten halten wir für gestattet, falls dies im Auftrage **nicht ausdrücklich verbeten** ist.

## Muster und Maße:

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten und oben sind nicht zu umgehen.

## Beschwerden:

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.





## Bahntarif für Frachtgut ohne Gewähr

Bäume und Sträucher in Wagenladungen, sowie Stückgüter bis 3,50 m lang und bis 150 kg Gewicht reisen in Deutschland als Eilgut zu Frachtgutpreisen

| von<br>Siegburg<br>nach | Bäume und Sträucher |                            |                            | von<br>Siegburg<br>nach | Bäume und Sträucher |                            |                            |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|                         | fest<br>verpackt    | un-<br>verpackt            | un-<br>verpackt            |                         | fest<br>verpackt    | un-<br>verpackt            | un-<br>verpackt            |
|                         | Stückgut<br>pro     | i. Wagen-<br>ladung<br>von | i. Wagen-<br>ladung<br>von |                         | Stückgut<br>per     | i. Wagen-<br>ladung<br>von | i. Wagen-<br>ladung<br>von |
|                         | 100 kg              | 5000 kg                    | 10000 kg                   |                         | 100 kg              | 5000 kg                    | 10000 kg                   |
|                         | M.                  | M.                         | M.                         |                         | M.                  | M.                         | M.                         |
| Aachen .....            | 1.20                | 21.50                      | 34.—                       | Hagen i. W. ....        | 1.18                | 21.—                       | 33.—                       |
| Aschaffenburg ..        | 2.52                | 46.50                      | 63.—                       | Halle a. S. ....        | 4.39                | 87.—                       | 114.—                      |
| Augsburg .....          | 4.86                | 99.50                      | 130.—                      | Hamburg H. ....         | 4.27                | 84.—                       | 110.—                      |
| Barmen H.-B. ...        | 0.91                | 17.—                       | 27.—                       | Hannover                |                     |                            |                            |
| Basel .....             | 4.56                | 91.—                       | 119.—                      | Eilgutabf. ....         | 3.29                | 61.50                      | 82.—                       |
| Berlin H. u. L. ...     | 5.11                | 107.—                      | 139.—                      | Karlsruhe H.-B. .       | 3.15                | 58.50                      | 78.—                       |
| Beßdorf .....           | 0.79                | 15.—                       | 24.—                       | Kiel .....              | 4.97                | 103.—                      | 134.—                      |
| Bielefeld H. ....       | 2.32                | 42.50                      | 58.—                       | Leipzig                 |                     |                            |                            |
| Bochum Süd. ....        | 1.28                | 24.—                       | 35.—                       | M. Th. Bhf. ....        | 4.64                | 93.—                       | 122.—                      |
| Boppard .....           | 1.22                | 21.50                      | 34.—                       | Lübeck .....            | 4.72                | 95.50                      | 124.—                      |
| Braunschweig            |                     |                            |                            | Magdeburg H.-B.         | 4.24                | 83.—                       | 109.—                      |
| H.-B. ....              | 3.70                | 70.50                      | 93.—                       | Mainz H.-B. ....        | 1.96                | 36.—                       | 50.—                       |
| Breslau                 |                     |                            |                            | Mannheim .....          | 2.60                | 48.—                       | 65.—                       |
| Oberschl. Bhf. .        | 6.71                | 153.50                     | 197.—                      | Metz H.-B. ....         | 3.11                | 57.50                      | 77.—                       |
| Bremen H. ....          | 3.52                | 66.50                      | 88.—                       | München H.-B. ...       | 5.23                | 110.50                     | 143.—                      |
| Bromberg .....          | 7.15                | 166.50                     | 214.—                      | Münster i. Westf. .     | 1.99                | 36.50                      | 50.—                       |
| Cassel                  |                     |                            |                            | Neuß .....              | 0.83                | 15.50                      | 25.—                       |
| (Oberstadt) ....        | 2.84                | 52.50                      | 70.—                       | Nürnberg H.-B. .        | 4.10                | 80.—                       | 105.—                      |
| Coblenz H.-B. ...       | 1.01                | 18.50                      | 30.—                       | Osnabrück               |                     |                            |                            |
| Cöln-Gereon ...         | 0.44                | 8.—                        | 14.—                       | Eilgutbhf. ....         | 2.47                | 45.—                       | 61.—                       |
| Darmstadt H.-B. .       | 2.29                | 41.50                      | 57.—                       | Paderborn H.-B. .       | 2.30                | 42.—                       | 57.—                       |
| Dortmund Süd. .         | 1.40                | 26.—                       | 37.—                       | Remscheid .....         | 0.88                | 16.—                       | 26.—                       |
| Dresden                 |                     |                            |                            | Saarlouis .....         | 2.75                | 51.—                       | 68.—                       |
| (Neustadt) ....         | 5.34                | 113.50                     | 147.—                      | Siegen .....            | 0.98                | 18.—                       | 29.—                       |
| Düren .....             | 0.86                | 16.—                       | 26.—                       | Stettin H.-B. ....      | 5.92                | 130.50                     | 168.—                      |
| Düsseldorf H.-B.        | 0.82                | 15.—                       | 25.—                       | Straßburg Els.          |                     |                            |                            |
| Elberfeld .....         | 0.87                | 16.—                       | 26.—                       | H.-B. ....              | 3.50                | 66.—                       | 88.—                       |
| Emmerich .....          | 1.76                | 32.50                      | 45.—                       | Stuttgart H.-B. .       | 3.72                | 71.—                       | 94.—                       |
| Erfurt .....            | 3.79                | 72.50                      | 96.—                       | Trier H.-B. ....        | 2.15                | 39.50                      | 54.—                       |
| Essen (Ruhr)            |                     |                            |                            | Weilburg .....          | 1.76                | 32.50                      | 45.—                       |
| H.-B. ....              | 1.17                | 21.—                       | 33.—                       | Wesel .....             | 1.42                | 26.50                      | 38.—                       |
| Frankfurt a. M.         |                     |                            |                            | Wien Staatsb. ...       | 8.75                | 183.—                      | 235.—                      |
| H.-B. ....              | 2.21                | 40.50                      | 55.—                       | Wiesbaden Süd. .        | 1.94                | 35.50                      | 49.—                       |
| Gießen .....            | 1.67                | 31.—                       | 43.—                       | Würzburg .....          | 3.31                | 62.—                       | 82.—                       |

### Besonders wichtig

ist die Behandlung der Baumsendungen nach dem Eintreffen!

Um das Anwachsen zu sichern, sind die Pflanzen direkt auszupacken, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser zu tauchen, oder reichlich zu begießen und dann  sofort  (nahe der Pflanzstelle) einzeln einzuschlagen.

Bei dem Einpflanzen selbst ist wieder zu beachten, daß jede Pflanze mit nassen Wurzeln in die Erde gesetzt wird, auch wenn der Boden genügend Feuchtigkeit zeigt.

Sollte vor Ankunft der Sendung starker Frost eingetreten sein, so lege man die Ballen oder Körbe, möglichst schonend — unausgepackt — in einen kühlen, frostfreien Raum, bis dieselben vollständig aufgetaut sind. Als dann verfähre man, wie oben angegeben.

Pflanzung von **Rosen**, siehe unter Abteilung: **Rosen**.



# Allgemeine Grundsätze

## über Pflanzung und Pflege der Nutz- und Ziergehölze.

### Qualität der Ware.

Bei dem riesigen Aufschwung, den der Obstbau im letzten Jahrzehnt erfreulicherweise genommen, hat die Erfahrung gelehrt, daß nur gesunde, auf gutem Boden gewachsene Bäume ein erfolgreiches Gedeihen versprechen. Verarmte und verkrüppelte Pflanzen sind am besten Standorte nicht in der Lage, die erforderlichen Nährstoffe aufzunehmen und zu verarbeiten. Es muß daher immer wieder betont werden, daß das Beste vom Besten zum Anpflanzen gerade gut genug ist.

### Bei Wahl der Obstsorten

kommt Lage und Bodenart der Pflanzstelle zuerst in Betracht, sodann die beabsichtigte Verwendungsart, ob Tafelobst für jeden Monat des Jahres oder gangbarste Marktware. In diesen verschiedensten Fragen stehen wir mit unserer langjährigen Erfahrung gerne zu Diensten. Wichtig ist ferner, die Bestellungen möglichst früh aufzugeben, weil selbst die größte und leistungsfähigste Baumschule in der späteren Saison nicht mehr alles nach Wunsch liefern können. Empfehlenswert ist auch, stets eine oder mehrere Sorten zum Ersatz mit anzugeben für den Fall, daß irgend eine der zunächst gewünschten Sorten nicht mehr vorhanden ist.

### Lockerer Boden

ist Vorbedingung für jede Pflanzung und in dem Grade, wie man die Pflanzstelle durch weites und tiefes Umgraben durchlüftet, wird die Pflanzung gedeihen. Bei schwerem Boden dürfen die Vorbereitungsarbeiten und erst recht das Pflanzen selbst, nicht bei nasser Witterung

vorgenommen werden. Leichter, humusreicher Lehm Boden ist für alle Pflanzen am vorteilhaftesten. Feuchte Böden müssen durch eine geeignete Drainage trocken gelegt werden; bei einem hohen Grundwasserstand ohne Abflußmöglichkeit hilft man sich durch aufgeworfene Hügel, so daß die zu pflanzenden Gehölze mit der Wurzel über dem Grundwasser bleiben.

### Pflanzung.

Am besten ist sofortiges Einpflanzen an Ort und Stelle, oder — was meistens erforderlich sein wird — in sogenannten *Einschlag* und zwar so, daß die vorher gut angefeuchteten Wurzeln mit ebenfalls feuchter, lockerer Erde dicht umschlossen sind. Bleiben Hohlräume zwischen den Wurzeln, so gehen letztere bald in Fäulnis über. Hieran geht manche Pflanze bei übereilem oder bündelweisem Einschlag zu Grunde. Beim späteren Einpflanzen der Gehölze werden verletzte Wurzeln glatt abgeschnitten, dann tauche man die Wurzelkrone ganz in Wasser — besser noch in Lehmbrei — und pflanze in lockere, feuchte Erde.

### Pflanzweite.

Starkwüchsige, namentlich flachkronige Apfel- und Birnen-Hochstämme zeigen in gutem Erdreich nach etwa 50 Jahren bis 10 Meter Kronenausdehnung, in flachgründigem, kiesigem oder steinigem Boden 7 bis 8 m und können ein Alter von 80 bis 100 Jahren erreichen. Steinobstbäume sterben schon nach 30 bis 40 Jahren ab mit einem Kronendurchschnitt von 4 bis 6 m. Obstpyramiden und Buschbäume haben in 20 bis 30 Jahren, je nach der Bodenart 3 bis 5 m Kronenbreite. Eine zweckmäßige Pflanzung ist Kernobst mit Buschbäumen oder Steinobsthochstämmen als Zwischenpflanzung.



### Pflanzhöhe.

Bei tief ausgehobenen Baumgruben muß beim Pflanzen stets auf Nachsinken des Bodens gerechnet werden; der Baum ist richtig gepflanzt, wenn nach einigen Jahren, nach endgültiger Senkung der Baumgrube, die oberen Wurzelanfänge am Stamme frei zu liegen kommen. Bei Strauchrosen wird die Veredelungsstelle in die Erde gepflanzt.

### Düngung.

Man darf frischen Dünger niemals beim Einpflanzen an die Wurzeln bringen, ebensowenig wie unzerseßte Blätter, Gras und dergl., deren chemische Zerseßungsprodukte die Wurzelhaut angreifen und das Anwachsen unmöglich machen.

Sehr wertvoll hingegen ist das Abdecken der Pflanzstellen mit verrottetem Stalldünger, der den Boden feucht und locker hält, und dessen Nährkraft durch Regen ausgelaugt, leicht zu den Wurzeln dringt. Man verwendet zum Einpflanzen mit Erfolg Torfmuß, besonders in minderwertigem, trockenem Boden. Der Torfmuß saugt sehr viel Wasser an und hält dadurch lange Feuchtigkeit, eine wesentliche Förderung zur Bildung von Saugwurzeln. Sehr wichtig ist bei allen Bodenarten eine geeignete Kalkdüngung.

### Herbst- und Frühjahrspflanzung.

Die beste Pflanzzeit ist in der Regel der Herbst, da bei günstiger Witterung die Gehölze sofort neue Saugwurzeln bilden können.

Andere, besonders Zierpflanzen mit fleischigen Wurzeln und harzigen Knospen, werden vorteilhaft im Frühling verpflanzt.

### Neuanpflanzungen

bedürfen bei Trockenheit Nachhilfe durch Gießen, besonders immergrüne Zierpflanzen. Dann muß die feuchte Pflanzstelle, sofern nicht Stalldung aufgelegt werden kann, nach einiger Zeit sorgfältig aufgelockert werden, um ein Verkrusten der obern Bodenschicht zu verhindern. Fragen über Baumpflege, Düngung, Winterschutz usw. haben wir in einer achtseitigen Schrift: Pflanzung und Behandlung von Rosen, Obst- und Zierbäumen (Preis M. 0.10) beantwortet und steht dieselbe Interessenten gerne zu Diensten. Zum Studium der Mannigfaltigkeiten im Obst- und Gartenbau führen wir unter

### Gartenbau-Literatur


eine Auswahl von Fachwerken auf, u. a. eine Abhandlung über die Einwirkung der Luft auf den Erdboden (Luftverwertung in Garten, Feld, Weinberg, Wald und Wiese, Preis M. 0.50). Alle an uns gestellten Fragen über

### Landschaftsgärtnerei

wie Anlage und Ausstattung von privaten und öffentlichen Anlagen werden von unserm Gartenarchitekten gewissenhaft bearbeitet. Die Ausführung von Anlagen übernehmen wir nicht.







Pyramide mit 1 Etage

Hochstamm

Halbstamm



Cordon, wagerecht, 2armig






Pyramide mit 2 Etagen




Spalier mit 2 Etagen



Senkrechter Cordon

U-Form



Verrierpalmette





# BSTBÄUME

Bei gemeinsamen Bezügen durch Vereine und Korporationen bitten für die benötigten Sorten und Stückzahlen besondere Offerte zu verlangen.

Wir machen unsere geehrten Kunden darauf aufmerksam, daß unsere Firma im Vertragsverhältnis zur Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz steht und für Sortenechtheit garantiert. . . .

## Zeichenerklärung:

H = Hochstamm  
P = Pyramide  
S = Spalier  
U = U-Form

C = Cordon  
B = Buschform  
1j. = Einjährige Veredlung

Photographische Abbildungen siehe Seite 8 und 9.

## Äpfel

|  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. | 1000 St.<br>M. |
|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Hochstämmе</b> , 6—7 cm Stammumfang, 1 m vom Boden gemessen                                       | 1.40          | 13.—         | 120.—         | 1100.—         |
| „ 7—8 „ „ 1 „ „ „ „  | 1.60          | 15.—         | 140.—         | 1300.—         |
| „ 8—9 „ „ 1 „ „ „ „  | 1.90          | 18.—         | 170.—         | 1600.—         |
| „ 9—10 „ „ 1 „ „ „ „   | 2.40          | 22.—         | 200.—         |                |
| „ 10—12 „ „ 1 „ „ „ „  | 3.20          | 30.—         | 280.—         |                |
| <b>Halbstämme</b> , 6—8 „ „ ca. 1,20 m Stamm . . . .   | 1.25          | 11.—         | 100.—         | 900.—          |
| <b>Pyramiden</b> mit 1 Etage, formiert . . . . .   | 1.50          | 14.—         | 130.—         |                |
| „ „ 2 Etagen „ . . . . .   | 2.50          | 24.—         | 230.—         |                |
| „ „ 3 „ . . . . . à M. 3.50 bis 5.—  |               |              |               |                |
| „ extra starke, verpflanzte, tragfähig 2,50—4 m hoch, 1,50 bis 3 m breit . . . . . à M. 8.— bis 20.— |               |              |               |                |
| <b>Spaliere</b> mit 1 Etage . . . . .  | 1.50          | 14.—         | 130.—         |                |
| „ „ 2 Etagen . . . . .   | 2.50          | 24.—         | 230.—         |                |
| „ „ 3 „ . . . . .  | 3.60          | 34.—         | 320.—         |                |
| <b>U-Formen</b> 3jährig . . . . .  | 2.20          | 20.—         | 180.—         |                |
| „ 4—5jährig . . . . .  | 3.—           | 28.—         | 260.—         |                |
| <b>Verrierpalmetten</b> mit 4 Ästen (Sorten werden auf Wunsch mitgeteilt) . . . . . à M. 5.— bis 7.— |               |              |               |                |
| <b>Cordons</b> , wagerechte, 1 armig, 2jährig . . . . .  | 1.50          | 14.—         | 130.—         |                |
| „ „ 1 „ 3—4 „ . . . . .  | 1.80          | 17.—         | 160.—         |                |
| „ „ 2 „ 2 „ . . . . .  | 1.80          | 17.—         | 160.—         |                |
| „ „ 2 „ 3—4 „ . . . . .  | 2.50          | 24.—         | 230.—         |                |
| „ senkrechte, 2 „ . . . . .  | 1.25          | 11.—         | 100.—         |                |
| „ „ 3—4 „ . . . . .  | 1.75          | 16.—         | 150.—         |                |
| <b>Buschformen</b> , unformiert (in den mit P bezeichneten Sorten) 2jährig                           | 1.20          | 11.—         | 100.—         | 900.—          |
| „ „ „ „ „ „ 3—4 „  | 1.50          | 14.—         | 130.—         | 1200.—         |
| <b>Einjährige Veredlungen</b> . . . . .  | 0.60          | 5.50         | 50.—          | 450.—          |



|                                      | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung  | Genuß-<br>reife     | Wachstum<br>des Baumes          | Bemerkungen  |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--|
| Annaapfel . . .                      | H.                        | mittelgroß, Tafel- und gute Marktfrucht                                     | August              | mittelstark                     | Eine in der Dürener Gegend bekannte Sorte                            |
| Apfel a. Croncels                    | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß, gelb, la. Tafel-, Markt- und Kochapfel                                | Okt.-Dez.           | stark,<br>aufrecht              | gedeiht in jedem Boden und kalten Lagen; sehr fruchtbar              |
| „ aus Halder .                       | H.                        | ziemlich groß, grünlich gelb, Tafel und Wirtschaft                          | Jan.-Mai            | mittelstark                     | spätblühend, für rauhe Gegend; reichtragend                          |
| Astrachan roter .                    | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | mittelgroß, lebhaft rot, gute Tafelfrucht                                   | Juli-Aug.           | mäßig                           | reichtragend, auch in rauher Lage                                    |
| „ weißer                             | P.                        | mittelgroß, weißlich grün, weinsäuerlich, Tafel und Wirtschaft              | Juli-Aug.           | mittelstark                     | äußerst reichtragend,  |
| Bellefleur gelber                    | P.                        | groß, zitronengelb, hochedler Tafelapfel                                    | Nov.-<br>April      | mittelstark<br>hängend          | verlangt guten, mäßig feuchten Boden                                 |
| „ roter (Malmedier Siebenschläfer)   | H.P.S.                    | mittelgroß, dunkelrot, Tafel und Wirtschaft                                 | Dezemb.-<br>März    | mittelstark,<br>breit, aufrecht | sehr spätblühend, vorzüglich für kalte Gegenden                      |
| Bismarckapfel .                      | H.P.S.C.<br>U.            | sehr große Schaufrucht  | Novemb.-<br>Februar | mittelstark                     | sehr früh- und reichtragend  |
| Bohnäpfel großer                     | H.                        | mittelgroß, hochgebaut, rot gestr., Wirtschaftsapfel ersten Ranges          | Jan.-Mai            | stark,<br>pyramidal             | vorwiegend f. leichten, kalkreichen Boden, blüht spät, sehr ertragr. |
| Boikenapfel . .                      | H.P.S.C.<br>U.            | groß, hellgelb, m. rotem Anflug, la. Tafel-, Markt- und Kochapfel           | Febr.-Mai           | mittelstark,<br>breit, aufrecht | spätblühend, dankbar in allen Lagen                                  |
| Cellini . . . . .                    | H.P.                      | groß, rot gestreift, Tafel, Markt, Wirtschaft                               | Okt.-Dez.           | stark,<br>pyramidal             | sehr reichtragend  |
| Charlamowsky .                       | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | mittel bis groß, blaßrot gestreift, ausgezeich. f. Tafel, Markt, Wirtschaft | Sept.-<br>Nov.      | stark,<br>pyramidal             | sehr reichtragend, auch für Sandboden                                |
| Dülmener Herbst-<br>Rosenapfel . .   | H.                        | mittelgroß, Tafel, Markt  | Nov.-Dez.           | stark,<br>pyramidal             | in Westfalen sehr beliebt  |
| Edelapfel gelber                     | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | sehr groß, vorzüglich für Tafel und Markt                                   | Nov.-<br>Januar     | stark, schmal<br>aufrecht       | nicht festhängend, für geschützte Lagen                              |
| Eiserapfel roter<br>(roter Paradies) | H.                        | mittelgroß, dunkelrot, Wirtschaft   | Jan.-Mai            | stark                           | gedeiht am besten in schwerem, feuchtem Boden u. warmer Lage         |
| Eitel Friß . . . .                   | P.S.U.                    | groß bis sehr groß Tafel- und Marktapfel                                    | Okt.-<br>April      | mittelstark                     | auch für rauhe Lage  |
| Ernst Bosch . .                      | H.P.S.C.                  | mittelgroß, gelb, weinsäuerlich, Tafel                                      | Okt.-Jan.           | schwach                         | sehr reichtragend  |
| Fießers Erstling                     | P.S.U.                    | groß, rot gestreift, Tafelfrucht  | Nov.-Dez.           | stark                           | sehr früh und reichtragend   |
| Fürstenapfel<br>grüner . . . . .     | H.                        | mittelgroß, grün, Wirtschaft  | Februar-<br>Juni    | stark,<br>pyramidal             | überall sehr fruchtbar, für rauhe Lage geeignet                      |
| Grahams Jubiläumsapfel . .           | P.S.U.                    | groß, Tafel und Markt   | Nov.-<br>März       | schwach                         | äußerst ertragreich  |
| Gravensteiner .                      | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß, gelb, rotgestreift, la. Tafel   | Sept.-<br>Dez.      | stark u. breit                  | verlangt guten, feuchten Boden                                       |
| „ von Wenau .                        | H.P.                      | mittel bis groß, gelb, sonnenwärts gerötet                                  | Sept.-Jan.          | stark, gesund                   | in der Dürener Gegend beliebt  |
| Grünäpfel<br>(Kahenkopf) . .         | H.                        | groß, rot gestreift, Wirtschaft   | Febr.-<br>Juni      | stark, sparrig                  | spätblühend, alle 2 Jahre sehr reichtragend                          |



|                                      | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung   | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes            | Bemerkungen   |
|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---|
| Hagedorn . . .                       | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>wachsartig weiß, Koch-<br>und Marktapfel  | Okt.-Dez.       | mittelstark,<br>pyramidal         | außergewöhnlich reich-<br>tragend                           |
| Jakob Lebel . .                      | H.P.S.                    | groß bis sehr groß,<br>gelbrot, angenehm<br>säuerlich, ausgezeichnet.<br>Tafel-, Koch- und<br>Marktapfel | Okt.-Jan.       | stark, breit                      | äußerst reichtragend,<br>empfehlenswert                     |
| Kaiser Alexander                     | H.P.S.C.<br>U.            | sehr groß, weißgelb,<br>rotgestreift, Schau-<br>frucht, empfehlenswert.<br>Markt- und Kochapfel          | Okt.-Nov.       | stark,<br>pyramidal               | ziemlich reichtragend                                       |
| „ Wilhelm . . .                      | H.                        | groß, gelb, rotgestreift,<br>Tafel- und Kochapfel  | Nov.-<br>April  | stark,<br>pyramidal               | anspruchslos  |
| Kalvill Aders-<br>lebener . . .      | H.                        | groß, gelblich, la. Tafel  | Nov.-<br>März   | stark                             | widerstandsfähig  |
| „ Großherzog<br>von Baden .          | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>la. Tafel   | Okt.-Dez.       | stark,<br>pyramidal               | trägt früh und sehr<br>reich                                |
| „ roter Herbst .                     | H.                        | mittelgroß, dunkelrot,<br>Tafel  | Okt.-Nov.       | schwach,<br>unförmig              | taugt nicht für geringen,<br>trocknen Boden                 |
| „ weißer Winter                      | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß, grünlichgelb,<br>allerfeinste Tafelsorte   | Nov.-<br>Febr.  | schwach                           | gedeiht nur in aller-<br>bester Lage                        |
| Kantapfel<br>Danziger . . .          | P.                        | ziemlich groß, blutrot<br>verwaschen, für Tafel<br>und Wirtschaft  | Okt.-Dez.       | mittelstark                       | auch für rauhe Lagen  |
| Kardinal<br>geflammerter . .         | H.P.                      | groß, Tafel- und Koch-<br>apfel  | Nov.-Dez.       | stark, breit                      | reichtragend  |
| Klarapfel weißer                     | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | mittelgroß, vorzüglich<br>im Geschmack, Tafel,<br>Wirtschaft   | Juli-Aug.       | stark                             | gut für alle Lagen, sehr<br>früh- und reichtragend          |
| Königinapfel . .                     | P.S.                      | sehr groß, goldgelb,<br>rotgestr., Schaufrucht   | Okt.-Dez.       | gedrungen                         | sehr fruchtbar  |
| Küchenapfel<br>Deans . . .           | H.P.S.C.                  | groß, gelb, ausgezeich-<br>neter Kochapfel   | Dez.-<br>März   | mittelstark                       | äußerst reichtragend  |
| „ Manks . . .                        | H.P.S.C.<br>U.            | mittelgroß, wachsgelb,<br>Tafel-, Markt- und<br>Kochapfel  | Okt.-<br>Febr.  | schwach                           | sehr reichtragend, für<br>geschlossene Gärten               |
| Kurzstiel könig-<br>licher . . . . . | H.P.S.                    | mittelgroß, rauhschalig,<br>wohlschmeckender<br>Tafel- und Kochapfel                                     | Dez.-<br>März   | mittelstark,<br>fast<br>pyramidal | spätblühend, sehr<br>fruchtbar, muß spät<br>geerntet werden |
| Lane's Prince<br>Albert . . . . .    | H.P.S.                    | groß b. sehr groß, blaß-<br>gelb mit roten Streifen,<br>Tafel- und Kochapfel                             | Nov.-<br>März   | stark, breit                      | sehr fruchtbar, verlangt<br>kräftigen Boden                 |
| Lord Grosvenor                       | H.P.S.C.<br>U.            | sehr groß, wirklich<br>empfehlenswerter<br>Markt- und Kochapfel  | Sept.-<br>Okt.  | sehr gesund<br>und kräftig        | überaus früh- und<br>reichtragend                           |
| „ Suffield . . .                     | P.                        | sehr groß, Tafel-,<br>Markt- und Kochapfel   | Sept.-<br>Okt.  | kräftig                           | sehr reich- und früh-<br>tragend, für alle Lagen            |
| Matapfel brauner                     | H.                        | mittelgroß, für Markt  | Dez.-<br>März   | stark                             | für rauhe Lage, im<br>Alter reichtragend                    |
| Minister von<br>Hammerstein .        | H.P.S.U.                  | groß, wohlschmeckend,<br>Tafel- und Kochapfel  | Dez.-<br>März   | mittelstark,<br>fast<br>pyramidal | frühtragend   |



|  | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung   | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes    | Bemerkungen   |
|--|---------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|
| Ohm Paul . . .   | P.                        | fast groß, gelb,<br>Tafelapfel   | Juli-Sept.      | fast stark                | frühtragend   |
| Ontario . . . . .  | P.                        | mittelgroß, gelb mit rot<br>verwaschen, Tafelapfel   | Jan.-April      | mittelstark               | früh- und reichtragend  |
| Parmäne Winter<br>Gold . . . . .   | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | ziemlich groß, goldgelb,<br>rotgestreift, ganz vor-<br>zügliche, würzige Frucht<br>für alle Zwecke | Nov.-<br>Febr.  | stark,<br>pyramidal       | verlangt guten, nicht zu<br>trocknen Boden, enorm<br>fruchtbar, aber empfind-<br>lich gegen Krankheiten |
| Pepping Dr.<br>Seeligs Orangen   | H.P.S.                    | mittelgroß, rund, wohl-<br>schmeckende Tafelfr.  | Okt.-Dez.       | stark,<br>pyramidal       | verlangt guten Boden  |
| „ Newtown . . .  | H.                        | zieml. groß, Wirtschaft  | Dez.-<br>April  | stark,<br>pyramidal       | fruchtbar und<br>anspruchslos   |
| „ Parkers . . .  | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | mittelgroß, berostet,<br>sogen. Rabauenschale,<br>eine der besten Tafel-<br>sorten                 | Dez.-<br>März   | mäßig,<br>pyramidal       | reichtragend, verlangt<br>kräftigen, feuchten<br>Boden, guff. rauhe Lage                                |
| „ Ribstons . . .   | H.P.S.C.<br>U.            | groß, gelb, rötlich ge-<br>streift, 1a. Tafel, Markt<br>und Wirtschaft                             | Dez.-<br>Febr.  | stark,<br>hängend         | reichtragend, für rauhe<br>Lage, aber nicht zu<br>feuchten Boden  |
| Pomona Cox . .   | H.                        | groß bis sehr groß,<br>gelblich grün, Sonnen-<br>seite gerötet, Markt-<br>und Schauf Frucht        | Okt.-Nov.       | stark,<br>pyramidal       | für geschlossene<br>Gärten  |
| Prinzenapfel . .   | H.                        | groß, hochgebaut, gelb<br>mit roten Streifen,<br>Tafel-, Markt- und<br>Kochapfel                   | Sept.-<br>Dez.  | mittelstark,<br>pyramidal | spätblühend, für alle<br>Lagen  |
| Rambour roter<br>Winter . . . . .<br>(von d. Landwirtschafts-<br>kammer empfohlen) | H.P.S.                    | groß bis sehr groß,<br>schön rot gefärbt, aus-<br>gezeichneter Tafel-,<br>Markt- und Kochapfel     | Nov.-<br>März   | stark, breit              | sehr ertragreich, für<br>alle Lagen   |
| Rambour roter<br>Winter (Dürener)  | H.                        | gut mittelgroß, rot<br>gefärbt   | Nov.-<br>Febr.  | kräftig                   | in der Dürener Gegend<br>sehr beliebt   |
| Renette Ananas   | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | kaum mittelgroß, gold-<br>gelb, punktiert, deli-<br>kater Tafelapfel                               | Nov.-<br>März   | gedrungen                 | verlangt guten Boden  |
| „ Baumanns . .   | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß, prächtig rot,<br>Tafel-, Markt- und<br>Kochapfel   | Dez.<br>Febr.   | stark,<br>pyramidal       | sehr fruchtbar, auch in<br>trocknem Boden   |
| „ Biesterfelder  | P.                        | groß, gelb mit hell-<br>roten Streifen, Tafel  | Okt.-Dez.       | stark<br>wachsend         | auch in kalten Lagen  |
| „ Burchardts .   | H.P.S.<br>1j.             | mittelgroß, neßartig<br>überzogene Schale, gut<br>für Tafel, einer der<br>besten Kochäpfel         | Okt.-Jan.       | mittelstark,<br>pyramidal | sehr fruchtbar, liebt<br>feuchten, tiefgründigen<br>Boden   |
| „ Champagner   | H.P.S.<br>1j.             | kaum mittelgroß,<br>wachs gelb, 1a. für Tafel  | Jan.-Juni       | mäßig,<br>pyramidal       | reichtragend, gedeiht<br>noch in rauher Gegend  |
| „ Coulons . . .  | P.                        | groß, von angenehm<br>würzigem Geschmack,<br>Tafel, Markt  | Dez.-<br>März   | stark                     | für alle Lagen  |
| „ Cox Orangen  | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | mittelgroß, gelb,<br>Sonnenseite rötlich,<br>hochedler Tafelapfel                                  | Nov.-<br>März   | mäßig, breit              | verlangt gute Lage und<br>kräftigen Boden   |
| „ Gaesdonker .   | H.                        | kaum mittelgroß, gelb,<br>sonnenwärts rötlich,<br>Tafelfrucht                                      | Dez.-<br>April  | stark,<br>pyramidal       | auch für rauhe Lagen  |



|                                   | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung  | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes | Bemerkungen  |
|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------------|--|
| Renette Gold von<br>Berlepsch . . | H.P.C.                    | ziemlich groß, gelb mit<br>rot, vorzüglich für<br>Tafel und Markt                   | Januar-<br>Mai  | kräftig,<br>pyramidal  | anspruchslos   |
| „ Gold von<br>Blenheim . .        | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß, goldgelb, rotge-<br>streift, la. Tafel, Markt                                 | Nov.-<br>März   | stark, breit           | verlangt tiefgründigen<br>Boden und warme Lage                       |
| „ Gold von<br>Peasgood . .        | P.S.C.<br>U.              | sehr groß, gelbrot<br>gestreift, eine der<br>schönsten Tafel- und<br>Schauf Früchte | Dez.-<br>Febr.  | stark,<br>pyramidal    | dankbar tragend  |
| „ graue<br>französische .         | H.P.S.                    | mittelgroß, grau be-<br>rostet, sogen. Rabauen,<br>feiner Tafelapfel                | Nov.-<br>März   | mäßig,<br>breit        | sehr fruchtbar, verlangt<br>kräftigen, tiefgründigen<br>Boden        |
| „ graue Herbst .                  | H.P.S.C.                  | mittelgroß, hellbraun,<br>berost. (Rabauen), Tafel                                  | Okt.-Nov.       | mittelstark            | für guten, tiefgründigen<br>Boden                                    |
| „ große Kasseler                  | H.P.                      | mittelgroß bis groß,<br>goldgelb gerötet, gut<br>für Tafel u. Wirtschaft            | Febr.-Mai       | stark,<br>pyramidal    | gedeiht noch in rauh-<br>esten Gegenden, muß<br>spät geerntet werden |
| „ Harberts . . .                  | H.P.                      | groß, goldgelb, Sonnen-<br>seite gerötet, guter<br>Tafelapfel                       | Dez.-<br>März   | stark,<br>pyramidal    | erst im Alter reich-<br>tragend                                      |
| „ Karmeliter . .                  | P.                        | mittelgroß, Tafelapfel  | Nov.-<br>April  | mittel                 | früh- und reichtragend<br>auch für rauhe Lage                        |
| „ Landsberger .                   | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß, hellgelb, leicht<br>gerötet, Tafel-, Markt-<br>und Kochapfel                  | Nov.-Jan.       | stark,<br>pyramidal    | genügsam und ertrag-<br>reich  |
| „ Luxemburger                     | H.                        | mittelgroß, hellgelb,<br>rötlich marmoriert,<br>la. Tafelapfel                      | Jan.-April      | hängend                | sehr spätblühend<br>für feuchte Lage                                 |
| „ Luxemburger<br>doppelte . . .   | H.                        | groß, grünlichgelb, ge-<br>rötet, vorzüglich Tafel-,<br>Markt- und Kochapfel        | Dez.-<br>März   | stark, breit           | gedeiht noch in kaltem<br>Boden                                      |
| „ Muskat . . . .                  | P.                        | mittelgroß, rötlich ge-<br>streift, würzig, la. Tafel                               | Dez.-<br>März   | mäßig, breit           | auch für kalte<br>Gegenden   |
| „ Oberdiecks . .                  | H.                        | mittelgroß bis groß,<br>grünlichgelb, wohl-<br>schmeckend                           | Dez.-<br>März   | stark,<br>pyramidal    | fruchtbar  |
| „ rote Stern . .                  | H.P.                      | mittelgroß, blutrot,<br>punktiert, zum Teil<br>auch innen rot, la. Tafel,<br>Markt  | Dez.-<br>April  | mittel,<br>pyramidal   | regelmäßig tragend   |
| „ von Kanada .                    | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>blaßgelb, hochedle<br>Tafel- und Schauf Frucht               | Dez.-<br>April  | mittelstark,<br>breit  | sehr fruchtbar, verlangt<br>guten Boden und<br>warme Lage            |
| „ v. Zuccalmaglio                 | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | mittelgroß bis groß,<br>gelblich, punktiert, edle<br>Tafel- und Marktf Frucht       | Jan.-April      | stark,<br>pyramidal    | äußerst früh- und<br>reichtragend                                    |
| „ Wachendorfer                    | P.                        | mittelgroß,<br>edler Tafelapfel   | Dez.-<br>März   | schwach                | für guten Boden  |
| Richard gelber .                  | H.P.                      | groß, hellgelb, Tafel,<br>Markt   | Nov.-<br>Febr.  | mäßig                  | verlangt feuchten<br>Boden, gut für rauhe<br>Lagen                   |
| Riesenboiken-<br>apfel . . . . .  | H.P.                      | sehr groß, wohl-<br>schmeckend, Tafel,<br>Markt                                     | Jan.-April      | gesund und<br>kräftig  | für rauhe Lagen  |



|                                    | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung  | Genuß-<br>reife     | Wachstum<br>des Baumes                 | Bemerkungen   |
|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|--|---|
| Rosenapfel<br>virginischer .       | H.P.                      | gut mittelgroß, gelb,<br>sonnenwärts gerötet,<br>Tafel, Markt   | Aug.-<br>Okt.       | mittelstark                            | früh- und reichtragend  |
| Schafsnase . . .                   | H.                        | groß, Markt- und<br>Kochapfel   | Dez.-<br>April      | sehr stark                             | reichtragend  |
| Schöner<br>von Boskoop .           | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | sehr groß, berostet,<br>sonnenwärts gerötet,<br>ausgezeichneter Tafel-<br>apfel von feinstem<br>Geschmack | Nov.-<br>Mai        | sehr stark,<br>bildet breite<br>Kronen | liefert reiche Erträge;<br>für tiefgründigen,<br>guten Boden                    |
| „ „ Pontoise .                     | H.                        | sehr groß, gelb, rötlich<br>gestreift, Schauf Frucht  | Dez.-<br>März       | stark,<br>pyramidal                    | fruchtbar   |
| „ v. Nordhausen                    | H.                        | mittelgroß, rot ver-<br>waschen, gute Tafel-<br>und Wirtschaftsfrucht                                     | Dez.-<br>April      | mittelstark                            | spätblühend, für alle<br>Lagen  |
| Signe Tillisch . .                 | P.                        | groß, Tafel, Wirtschaft   | Nov.-Jan.           | mittel                                 | reichtragend,<br>unempfindlich  |
| Sondergleichen .<br>Langtons . . . | H.                        | mittelgroß bis groß,<br>rot gestreift, Tafel,<br>Markt  | Okt.-Dez.           | ziemlich<br>stark,<br>pyramidal        | sehr dankbar tragend  |
| Tulpenapfel . .                    | H.                        | groß, Wirtschaft  | Jan.-April          | fast stark,<br>hängend                 | vorwiegend im mittlern<br>Siegtal angebaut, für<br>rauhe Lage<br>empfehlenswert |
| Weinapfel roter<br>Trierer . . . . | H.                        | kleiner, bekannter<br>Most- und Kochapfel   | Winter-<br>Frühjahr | stark<br>aufrecht                      | sehr ertragreich  |

## Empfehlenswerte Sortiment.

### A. Für die Rheinprovinz zum allgemeinen Anbau:

Bellefleur roter  
Bohnapfel großer  
Boikenapfel  
Charlamowsky

Parmäne Winter Gold  
Rambour roter Winter  
Renette Baumanns  
„ Landsberger

Schöner von Boskoop  
Weinapfel roter Trierer

unter besonderen Umständen zugelassen:

{ Eiserapfel roter  
Kurzstiel königlicher  
Renette rote Stern

### B. Sorten für Straßenbepflanzung:

Bellefleur roter  
Bohnapfel großer  
Boikenapfel  
Eiserapfel roter  
Fürstenapfel grüner  
Kurzstiel königlicher

Parmäne Winter Gold  
Renette Baumanns  
„ Champagner  
„ Gaesdonker  
„ große Kasseler  
„ Harberts

Renette Landsberger  
„ Luxemburger doppelte  
Weinapfel roter Trierer  
Schafsnase



**C. In trockenem Boden gedeihen:**

Astrachan weißer  
Bohnapfel großer  
Boikenapfel  
Charlamowsky

Fürstenapfel grüner  
Jakob Lebel  
Kaiser Alexander  
Pepping Parkers

Renette Baumanns  
" große Kasseler  
" Landsberger  
Sondergleichen Langtons

**D. In feuchtem Boden:**

Astrachan roter  
Boikenapfel  
Eiserapfel roter  
Jakob Lebel  
Parmäne Winter Gold

Pepping Parkers  
Rambour roter Winter  
Renette Burchardts  
" graue Herbst  
" Harberts

Renette Luxemburger doppelte  
" Muskat  
" von Kanada  
" von Zuccalmaglio  
Schöner von Boskoop

**E. Für rauhe Lagen:**

Apfel aus Croncels  
Bellefleur roter  
Bohnapfel großer  
Boikenapfel  
Charlamowsky  
Eiserapfel roter

Fürstenapfel grüner  
Kurzziel königlicher  
Rambour roter Winter  
Renette Baumanns  
" große Kasseler  
" Luxemburger dopp.

Schöner von Boskoop  
" von Nordhausen  
Sondergleichen Langtons  
Weinapfel roter Trierer

**F. Sorten von gesundem, schönem Wuchs, welche überall reiche Erträge liefern:**

Apfel aus Croncels  
Bellefleur roter  
Charlamowsky

Jakob Lebel  
Rambour roter Winter  
Renette Baumanns  
" Landsberger

Renette von Zuccalmaglio  
Schafsnase  
Schöner von Boskoop

**G. Sorten, deren Tragbarkeit besonders früh eintritt (die Bäume werden meistens nicht übermäßig groß und verlangen nahrhaften Boden):**

Apfel aus Croncels  
Bismarckapfel  
Charlamowsky  
Hagedorn

Küchenapfel Manks  
Lord Grosvenor  
Lord Suffield  
Minister von Hammerstein

Parmäne Winter Gold  
Renette Ananas  
" von Zuccalmaglio

**H. Sorten, welche besonders schöne, sogen. Schaufrüchte tragen:**

Apfel aus Croncels  
Bismarckapfel  
Edelapfel gelber  
Kaiser Alexander

Königinapfel  
Lord Grosvenor  
Lord Suffield  
Renette Gold von Paesgood

Renette von Kanada  
Riesenboikenapfel  
Schöner von Boskoop



# Birnen.

Hochstämme, 6—7 cm Stammumfang, 1 m v. Boden gemessen

" 7—8 " " 1 " " " "

" 8—9 " " 1 " " " "

" 9—10 " " 1 " " " "

" 10—12 " " 1 " " " "

Halbstämme, 6—8 " " ca. 1,20 m Stamm . .

Pyramiden mit 1 Etage, formiert . . . . .

" " 2 Etagen, " . . . . .

" " 3 " " . . . à M. 3.50 bis 5.—

" extra starke, verpflanzte, tragfähig 2,50—4 m hoch,  
1,50—3 m breit . . . . . à M. 8—20

Spaliere mit 1 Etage . . . . .

" " 2 Etagen . . . . .

" " 3 " " . . . . .

U-Formen 3jährig . . . . .

" 4—5 jährig . . . . .

Verrierpalmetten mit 4 Ästen (Sorten werden auf Wunsch  
mitgeteilt). . . . . à M. 5.— bis 7.—

Cordons, wagerechte, 1 armig, 2 jährig . . . . .

" " 1 " 3—4 " . . . . .

" " 2 " 2 " . . . . .

" " 2 " 3—4 " . . . . .

" senkrechte 2 " . . . . .

" " 3—4 " . . . . .

Buschformen, unformiert (in den m. P. bezeichn. Sorten), 2jähr.

" " " " " " " 3—4 "

Einjährige Veredlungen . . . . .

| 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. | 1000 St.<br>M. |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.40          | 13.—         | 120.—         | 1100.—         |
| 1.60          | 15.—         | 140.—         | 1300.—         |
| 1.90          | 18.—         | 170.—         | 1600.—         |
| 2.40          | 22.—         | 200.—         |                |
| 3.20          | 30.—         | 280.—         |                |
| 1.25          | 11.—         | 100.—         | 900.—          |
| 1.50          | 14.—         | 130.—         |                |
| 2.50          | 24.—         | 230.—         |                |
| 1.50          | 14.—         | 130.—         |                |
| 2.50          | 24.—         | 230.—         |                |
| 3.60          | 34.—         | 320.—         |                |
| 2.20          | 20.—         | 180.—         |                |
| 3.—           | 28.—         | 260.—         |                |
| 1.50          | 14.—         | 130.—         |                |
| 1.80          | 17.—         | 160.—         |                |
| 1.80          | 17.—         | 160.—         |                |
| 2.50          | 24.—         | 230.—         |                |
| 1.25          | 11.—         | 100.—         |                |
| 1.75          | 16.—         | 150.—         |                |
| 1.20          | 11.—         | 100.—         | 900.—          |
| 1.50          | 14.—         | 130.—         | 1200.—         |
| 0.60          | 5.50         | 50.—          | 450.—          |

|                                   | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung   | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes    | Bemerkungen   |
|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|---------------------------|---|
| Alexandrine<br>Douillard . . .    | P.S.C.U.                  | fast groß, Tafel, Markt  | Okt.-Nov.       | mittelstark,<br>aufrecht  | sehr früh- und reich-<br>tragend  |
| Andenken an den<br>Kongreß . . .  | H.P.S.C.<br>U.            | sehr groß, gelb, Tafel-,<br>Markt- und Schauf Frucht                               | Septemb.        | mittelstark,<br>aufrecht  | der großen Früchte<br>wegen ist geschützte<br>Lage vorzuziehen                      |
| André Desportes                   | P.                        | mittelgroß, gute Tafel-<br>frucht  | Juli-Aug.       | mittelstark               | sehr ertragreich  |
| Baronsbirne . .                   | H.                        | groß, gelb, ausgezeich-<br>nete Winterkochbirne                                    | Jan.-April      | stark,<br>pyramidal       | liebt feuchten Boden  |
| Bergamotte deut-<br>sche National | H.P.S.C.<br>U. Ij.        | groß, gelb, apfelförmig,<br>Tafel, Markt; gut zum<br>Einmachen                     | Sept.-<br>Okt.  | mittelstark,<br>aufrecht  | sehr ertragreich, nicht<br>anspruchsvoll an Lage<br>und Boden                       |
| " Esperens .                      | H.P.S.U.                  | mittelgroß, plattrund,<br>grüngelb, Tafel, Markt                                   | Jan.-März       | mittelstark,<br>pyramidal | reichttragend, sehr spät<br>zu ernten, verlangt<br>feuchten Boden und<br>warme Lage |
| " Lübecker<br>Sommer .            | H.                        | mittelgroß, Tafel, Markt   | Sept.-<br>Okt.  | sehr stark,<br>aufrecht   | gut für rauhe Lagen   |
| " rote . . .                      | H.                        | klein bis mittelgroß<br>gelbgrün, eine der<br>besten Einmach- und<br>Kompottbirnen | Sept.           | stark, schön<br>pyramidal | gedeiht noch in<br>sandigem Boden und<br>rauhem Lage                                |



|  | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung  | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes                    | Bemerkungen  |
|--|---------------------------|---|-----------------|---|--|
| <b>Birne v. Tongern</b>  | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß, braunrot, Tafel,<br>Markt   | Sept.-<br>Okt.  | mittelstark,<br>i. Alter etwas<br>hängend | sehr ertragreich, nicht<br>wählerisch  |
| <b>Butterbirne</b><br><b>Alexander</b><br><b>Lucas . . . .</b> | H.P.S.C.                  | groß, kegelförmig,<br>Sonnenseite rotge-<br>streift, edle Tafelfrucht   | Nov.-Dez.       | kaum<br>mittelstark                       | auch für kältere Lagen   |
| <b>„ Amanlis . . .</b>   | H.P.S.<br>U. 1j.          | groß, gelblichgrün, be-<br>rostet, saftig, süß und<br>gewürzt, Tafel, Markt   | Sept.           | sehr stark,<br>hängend                    | früh- und sehr reich-<br>tragend, gedeiht noch<br>in trockenem Boden und<br>rauhem Lage    |
| <b>„ Blumenbachs</b>   | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | mittelgroß, gelbbraun,<br>punktiert, köstliche<br>Tafel- und Marktf Frucht  | Okt.-Nov.       | mittelstark,<br>aufrecht                  | für feuchten Lehm-<br>boden, gedeiht auch in<br>kälteren Gegenden                          |
| <b>„ Clairgeaus .</b>  | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>gelb, sonnenwärts<br>leicht gerötet, für<br>Tafel und Markt                                    | Nov.-Dez.       | schwach,<br>aufrecht                      | für guten, feuchten<br>Boden und windge-<br>schützte Lage                                  |
| <b>„ Colomas</b><br><b>Herbst . . . .</b>                      | H.                        | fast groß, Tafel und<br>Markt   | Okt.-Nov.       | fast stark,                               | anspruchlos  |
| <b>„ Diels . . . .</b>   | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>gelb, rostig punktiert,<br>Tafel, Markt  | Nov.-Dez.       | stark,<br>hängend                         | für feuchten Boden,<br>sehr gut für rauhe<br>Lagen   |
| <b>„ Gellerts . . .</b>  | H.P.S.C.<br>U.            | groß, gelbgrün, eine<br>der schönsten Tafel-<br>und Marktbirnen   | Sept.-<br>Okt.  | stark, schön<br>pyramidal                 | für guten, feuchten<br>Boden und warme<br>Lagen  |
| <b>„ Giffards . . .</b>  | H.P.S.                    | mittelgroß, blaßgelb,<br>Sonnenseite gerötet,<br>Tafel  | August          | mittelstark,<br>hängend                   | fruchtbar  |
| <b>„ graue Herbst</b>  | H.                        | mittelgroß, grau,<br>berostet, Tafel  | Okt.-Nov.       | fast stark,<br>aufrecht                   | für feuchten Boden und<br>geschützte Lage  |
| <b>„ Grumkower .</b>   | H.                        | groß, beulig, grüngelb<br>Tafel   | Okt.-Nov.       | stark, fast<br>aufrecht                   | für kräftigen, feuchten<br>Boden, auch in rauher<br>Lage                                   |
| <b>„ Hardenponte</b><br><b>Winter . . . .</b>                  | H.P.S.                    | groß, hellgelb, fein<br>punktiert, eine der<br>köstlichsten Tafelb.   | Nov.-Jan.       | schwach,<br>aufrecht                      | nur für sehr guten,<br>warmen Boden und<br>geschützte Lage                                 |
| <b>„ Liegels Winter</b>  | H.P.                      | mittelgroß, grüngelb,<br>Tafel-, Markt- und<br>Kochbirne  | Nov.-Jan.       | stark,<br>aufrecht                        | verlangt guten, feuchten<br>Boden  |
| <b>„ Sterkmanns .</b>  | H.P.                      | fast groß, rotgestreift,<br>Tafel, Markt  | Nov.-Dez.       | stark,<br>aufrecht                        | für gute Lage  |
| <b>Christbirne</b><br><b>Williams . . . .</b>                  | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>hellgelb, von feinem,<br>würzigem Geschmack,<br>eine der besten Tafel-,<br>Markt- u. Einmachb. | Sept.           | fast stark,<br>aufrecht                   | feinste Sorte, für jeden<br>Gartenboden, muß vor<br>der vollen Reife ge-<br>erntet werden. |
| <b>Comtesse de</b><br><b>Paris . . . . .</b>                   | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>grünlichgelb, la. Tafel<br>Markt   | Dez.-Jan.       | stark,<br>aufrecht                        | gut für rauhe Lagen,<br>sehr reichtragend, muß<br>spät geerntet werden                     |
| <b>Conference . . .</b>  | H.                        | groß, Tafelfrucht   | Nov.-<br>Dez.   | mittelstark                               | auch für rauhe Lagen   |



|                                    | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung   | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes             | Bemerkungen   |
|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------------------------------------|---|
| Dechantsbirne<br>Juli . .          | H.P.                      | klein, gelb, sonnenwärts<br>gerötet, Sommerbirne<br>für Tafel und Markt                              | Juli-Aug.       | mittelstark<br>aufrecht            | der frühen Reife wegen<br>wähle man den<br>sonnigsten Standort                        |
| „ Vereins                          | H.P.S.C.<br>U.            | groß, blaßgelb,<br>la. Tafel, Markt  | Okt.-Nov.       | schwach, fast<br>aufrecht          | nur für guten Boden u.<br>warme, geschützte Lage                                      |
| „ Winter                           | P.                        | groß, fast grün,<br>Tafelbirne   | Jan.-März       | mittelstark,<br>aufrecht           | nur für beste Obstlagen<br>geeignet   |
| Dr. Jules Guyot .                  | H.P.S.C.                  | groß, hellgelb, gewürzt,<br>vorzügliche Tafelbirne   | Aug.-<br>Sept.  | mittelstark,<br>aufrecht           | verlangt vor Wind<br>geschützte Lage  |
| Edelcrassane . .                   | P.                        | groß, fast wie eine<br>Bergamotte<br>edle Tafelfrucht  | Dez.-<br>Febr.  | mittelstark                        | nur für warme Lagen   |
| Flaschenbirne<br>Boscs . . . . .   | H.P.                      | groß, länglich, birn-<br>förmig, goldartig<br>berostet, edle Tafel-<br>und Marktbirne                | Sept.-<br>Okt.  | stark, Zweige<br>überhängend       | für alle Lagen, liefert<br>in trockenem, dürrtigem<br>Boden noch sehr gute<br>Erträge |
| Frau Luise Goethe                  | P.S.                      | mittelgroß, saftreich,<br>edle Tafelfrucht   | Jan.-März       | stark,<br>aufrecht                 | für sehr warme Lagen,<br>trägt erst im Alter reich                                    |
| Geißhirtelbirne<br>Stuttgarter . . | H.                        | kaum mittelgroß,<br>Sonnenseite rotbraun,<br>Tafel, Markt, vorwie-<br>gend zum Einmachen             | Sept.-<br>Okt.  | stark,<br>aufrecht                 | gedeiht in fast allen<br>Lagen  |
| Gute graue . . .                   | H.                        | mittelgroß, zimtfarbig<br>berostet, stark punk-<br>tiert, beliebte Markt-,<br>Koch- und Dörrbirne    | Sept.           | sehr stark,<br>aufrecht            | für Baumwiesen, auch<br>in feuchter Lage  |
| Gute Luise von<br>Avranches . .    | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | gut mittelgroß bis groß,<br>gelb mit rotem Anflug,<br>Tafel-, Markt- und Ein-<br>machbirne 1. Ranges | Sept.-<br>Okt.  | stark,<br>aufrecht                 | der großen Frucht-<br>barkeit wegen ist guter<br>Boden vorzuziehen                    |
| Herrenbirne<br>Esperens . . .      | H.P.S.                    | mittelgroß, gelbgrün,<br>rostig punktiert,<br>schmelzend, Tafel,<br>Markt                            | Sept.-<br>Okt.  | fast stark,<br>aufrecht            | gedeiht noch in kalten<br>Lagen und trockenem<br>Boden                                |
| Herzogin von<br>Angoulême          | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>grünlichgelb, la. Tafel-,<br>Markt- und Schaufrucht                           | Okt.-<br>Dez.   | mittelstark,<br>schön<br>pyramidal | verlangt guten, feuchten<br>Boden und vor Wind<br>geschützten Standort                |
| „ von Bordeaux                     | P.S.                      | ziemlich groß,<br>la. Tafelbirne   | Dez.-<br>März   | mittelstark                        | in warmer Lage sehr<br>fruchtbar  |
| Hofratsbirne . .                   | H.P.S.                    | fast groß, gelblichgrün<br>berostet, gut für Tafel   | Okt.-<br>Nov.   | stark,<br>aufrecht                 | liefert in trockenem<br>Boden noch gute<br>Erträge                                    |
| Josephine von<br>Mecheln . . . .   | P.                        | mittelgroß, gelblich,<br>bergamottförmig,<br>edle Tafelbirne   | Dez.-März       | schwach,<br>etwas über-<br>hängend | liebt feuchten Boden,<br>im Alter reichtragend  |
| Julibirne bunte .                  | P.                        | mittelgroß,<br>gelb und rot gefärbt,<br>Tafel und Wirtschaft   | Juli            | mittelstark                        | auch für rauhe Lagen  |
| Kampervenus . .                    | H.                        | mittelgroß, dunkelgelb,<br>vorzügliche Kompottb.   | Nov.-Jan.       | stark,<br>aufrecht                 | für jede, auch rauhe<br>Lage  |
| Kaßenkopf<br>großer . . . . .      | H.                        | groß bis sehr groß,<br>grünlichgelb, trüb gerötet,<br>gute Koch- u. Dörrbirne                        | Jan.-April      | sehr stark,<br>aufrecht            | verlangt tiefgründigen<br>feuchten Boden  |
| König Karl von<br>Württemberg .    | H.P.S.C.<br>U.            | sehr groß, gelb mit<br>grauen Punkten,<br>Schaufrucht 1. Ranges                                      | Okt.-<br>Nov.   | stark,<br>aufrecht                 | der sehr großen<br>Früchte wegen nur für<br>geschützte Lagen                          |



|   | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung   | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes                        | Bemerkungen  |
|---|---------------------------|--|-----------------|---|--|
| <b>Köstliche von Charneu . . .</b>          | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | ziemlich groß, zitronen-<br>gelb, sehr fein,<br>la. Tafel, Markt   | Okt.-<br>Nov.   | mittelstark,<br>aufrecht                      | für rauhe Lage bei<br>gutem, feuchtem Boden  |
| <b>Kuhfuß (Westfäl.<br/>Glockenbirne) .</b> | H.                        | gut mittelgroß, grün-<br>gelb, sonnenwärts<br>leicht gerötet, Tafel-,<br>Markt- und Dörrbirne                        | Sept.           | sehr stark,<br>fast aufrecht                  | für jede Lage und<br>jeden Boden   |
| <b>Le Lectier . . .</b>                     | H.P.S.C.<br>U.            | groß bis sehr groß,<br>hellgelb, eine der besten<br>Tafel- und Marktbirnen   | Dez.-Jan.       | mittelstark,<br>aufrecht                      | auch noch für rauhe<br>Lagen   |
| <b>Liebling Clapps .</b>                    | H.P.C.                    | groß, schön gelb,<br>Sommerbirne für Tafel<br>und Markt  | Aug.-<br>Sept.  | mittelstark,<br>aufrecht                      | nur für guten Boden<br>und warme Lage  |
| <b>Madame Verté .</b>                       | P.                        | mittelgroß, eiförmig,<br>berostet, gute<br>Tafelfrucht   | Dez.-Jan.       | fast stark                                    | nicht wählerisch auf<br>Lage und Boden   |
| <b>Magdalene grüne</b>                      | H.P.                      | kaum mittelgroß, hell-<br>grün, gesuchte Früh-<br>birne für den Markt  | Juli-Aug.       | fast stark,<br>aufrecht, lock.<br>Aststellung | vorwiegend für<br>trocknen Boden   |
| <b>Margaretenbirne<br/>kleine . . . . .</b> | P.                        | fast mittelgroß,<br>bergamottförmig, ge-<br>rötet, delikat   | Aug.-<br>Sept.  | stark,<br>aufrecht                            | für jeden Gartenboden  |
| <b>Marguérite<br/>Marillat . . . .</b>      | P.C.                      | sehr groß, gelb,<br>Tafelbirne   | Sept.-<br>Okt.  | schwach                                       | für geschützte Lagen   |
| <b>Minister<br/>Dr. Lucius . .</b>          | P.S.                      | groß bis sehr groß,<br>gelb, punktiert, Tafel-<br>und Marktf Frucht  | Okt.-<br>Nov.   | mittelstark                                   | für alle Lagen,<br>darf nicht zu spät<br>geerntet werden                               |
| <b>Mostbirne<br/>Sievenicher</b>            | H.                        | klein, gelblich, nur zur<br>Mostbereitung  | Okt.-<br>Nov.   | stark,<br>aufrecht                            | wird vorwiegend an<br>Straßen gepflanzt  |
| <b>„ Weilersche</b>                         | H.                        | dto.   | Okt.-<br>Nov.   | sehr stark,<br>schön pyram.                   | auch für rauheste<br>Lagen   |
| <b>Notaire Lepin .</b>                      | H.P.S.C.                  | groß, glockenförmig,<br>Winter-Tafelbirne  | Febr.-<br>März  | mittelstark,<br>aufrecht                      | gedeiht in trockenem<br>Boden u. rauher Lage   |
| <b>Olivier de Serres</b>                    | P.S.C.                    | mittelgroß, bergamottförmig, grün, vorzügliche Winter-Tafelbirne   | Dez.-<br>März   | mittelstark,<br>aufrecht,                     | nur für warme,<br>geschützte Lage  |
| <b>Pastorenbirne .</b>                      | H.P.S.C.<br>U. 1j.        | groß bis sehr groß,<br>flaschenförmig, gelb-<br>grün, eine der ertrag-<br>reichsten Tafel-, Markt-<br>und Kochbirnen | Nov.-Jan.       | sehr stark,<br>Spitzen leicht<br>überhängend  | für den allgemeinen<br>Anbau bei etwas<br>feuchtem Boden in jeder<br>Lage zu empfehlen |
| <b>Philippsbirne<br/>doppelte . . .</b>     | H.P.                      | groß, hellgelb, leicht<br>berostet, edle Tafel-<br>und Marktbirne  | Sept.-<br>Okt.  | mittelstark,<br>aufrecht                      | gedeiht noch in rauhen<br>Lagen  |
| <b>Poiteau neue . .</b>                     | P.S.U.                    | groß bis sehr groß,<br>gute Tafelfrucht  | Okt.-<br>Nov.   | stark   | für alle Lagen, Frucht,<br>bleibt auch bei voller<br>Genußreife grün                   |
| <b>Queenbirne . . .</b>                     | H.                        | mittelgroß, grüngelb,<br>vorzügliche Winter-<br>kochbirne  | Nov.-<br>Mai    | sehr stark,<br>schön<br>pyramidal             | auch für rauhe Lagen   |
| <b>Regentin . . . .</b>                     | P.S.U.                    | mittelgroß, grüngelb,<br>köstliche Winterbirne<br>für Tafel- und Markt   | Dez.-<br>Febr.  | schwach,<br>feinzweigig                       | liebt guten, mäßig<br>feuchten Boden und<br>warme Lage                                 |
| <b>Sommer-<br/>eierbirne . . .</b>          | H.                        | klein, Einmachfrucht<br>l. Ranges  | Aug.-<br>Sept.  | stark<br>wachsend                             | für warme Lage und<br>guten Boden  |



|  | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht und deren<br>Verwendung                                     | Genuß-<br>reife | Wachstum<br>des Baumes            | Bemerkungen   |
|--|---------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---|
| Souvenir de<br>Jules Guindon             | P.S.C.                    | groß, länglich, feine<br>Tafel- und Marktfrucht                    | Dez.-Jan.       | fast stark                        | sehr reichtragend,<br>für geschützte Lage                             |
| Triumph von<br>Jodoigne                  | H.P.                      | groß bis sehr groß,<br>grünelb, leicht be-<br>rostet, Tafel, Markt | Nov.-<br>Dez.   | stark über-<br>hängende<br>Zweige | gedeiht überall, am<br>schönsten werden die<br>Früchte in warmer Lage |
| „ von Vienne                             | H.P.S.C.                  | groß bis sehr groß,<br>ausgezeichnete Tafel-<br>und Marktbirne     | Sept.-<br>Okt.  | mittelstark,<br>aufrecht          | unempfindlich bz. Lage<br>und Boden                                   |
| Zwiebel-<br>bergamotte<br>(Zwiebelbirne) | H.                        | kaum mittelgroß, grau,<br>berostet, gute Winter-<br>kochbirne      | Jan.-März       | stark, tadel-<br>los pyram.       | für Straßen, auch in<br>den rauhesten Lagen<br>gut geeignet           |

## Empfehlenswerte Sortimente.

### A. Für die Rheinprovinz zum allgemeinen Anbau:

|  |                          |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Butterbirne Amanlis  | Butterbirne Gellerts     | Mostbirne Sievenicher |
| „ Diels  | Gute Luise von Avranches | Pastorenbirne         |
| unter besonderen Umständen zugelassen: { Christbirne Williams<br>Köstliche von Charneu |                          |                       |

### B. Für Straßenbepflanzung:

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Baronsbirne             | Gute Luise von Avranches | Mostbirne Sievenicher |
| Butterbirne Blumenbachs | Kampervenus              | „ Weilersche          |
| „ Liegels               | Kapenkopf großer         | Queenbirne            |
| Gute graue              | Kuhfuß                   | Zwiebelbergamotte     |

### C. In trockenem Boden gedeihen:

|                         |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Andenken an den Kongreß | Dechantsbirne Vereins | Herrenbirne Esperens |
| Bergamotte rote         | Flaschenbirne Boscs   | Hofratsbirne         |
| Butterbirne Amanlis     | Gute graue            | Magdalene grüne      |
| Christbirne Williams    | „ Luise von Avranches |                      |

### D. In feuchtem Boden:

|                         |                        |                       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Butterbirne Blumenbachs | Butterbirne Grumkower  | Kapenkopf großer      |
| „ Clairgeaus            | „ Liegels              | Köstliche von Charneu |
| „ Diels                 | Gute graue             | Kuhfuß                |
| „ Gellerts              | Herzogin von Angoulême | Pastorenbirne         |
| „ graue Herbst          | Josephine von Mecheln  |                       |

### E. Für rauhe Lagen geeignet:

|                         |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Bergamotte rote         | Butterbirne Liegels  | Josephine von Mecheln |
| Butterbirne Blumenbachs | Flaschenbirne Boscs  | Kuhfuß                |
| „ Diels                 | Gute graue           | Pastorenbirne         |
| „ Grumkower             | Herrenbirne Esperens |                       |

### F. Sorten von gesundem, schönem Wuchs, welche überall reiche Erträge liefern:

|                              |                         |                          |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Bergamotte deutsche National | Butterbirne Blumenbachs | Gute Luise von Avranches |
| Birne von Tongern            | Christbirne Williams    | Köstliche von Charneu    |
| Butterbirne Amanlis          | Comtesse de Paris       | Pastorenbirne            |
|                              | Flaschenbirne Boscs     |                          |



**G. Sorten, wobei die Tragbarkeit besonders früh eintritt (die Bäume werden meistens nicht übermäßig groß und verlangen nahrhaften Boden):**

Alexandrine Douillard  
Andenken an den Kongreß  
Butterbirne Clairgeaus

Christbirne Williams  
Gute Luise von Avranches  
Herzogin von Angoulême

König Karl von Württemberg  
Liebling Klapps  
Triumph von Vienne

**H. Sorten, welche besonders schöne, sogen. Schaufrüchte liefern:**

Andenken an den Kongreß  
Birne von Tongern  
Butterbirne Clairgeaus  
" Diels

Christbirne Williams  
Comtesse de Paris  
Dechantsbirne Vereins  
Herzogin von Angoulême

König Karl von Württemberg  
Le Lectier  
Marguérite Marillat  
Triumph von Jodoigne

## Aprikosen.

|  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang . . . . .   | 2.50          | 24.—         | 230.—         |
| " 8—9 " " . . . . .                        | 3.—           | 28.—         | 260.—         |
| " 9—10 " " . . . . .                       | 3.50          | 33.—         |               |
| Halbstämme, 6—8 " " ca. 1,20 m Stamm . . . | 1.80          | 17.—         | 160.—         |
| Spaliere mit 1 Etage . . . . .             | 2.—           | 18.—         | 160.—         |
| " " 2 Etagen . . . . .                     | 3.—           | 28.—         | 260.—         |
| " " 3 " . . . . .                          | 3.60          | 34.—         |               |
| Buschformen . . . . .                      | 1.50          | 14.—         | 130.—         |

|                                       | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht                  | Reife  | Bemerkungen  |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--|
| Ambrosia . . . . .                    | H.S.B.                    | sehr groß               | Juli   | Der Unterschied im Wuchs ist nicht so groß, daß beim Pflanzen der einzelnen Sorten darauf Rücksicht genommen werden muß.<br>schöne Sorte |
| Frühe gelbe Alexandrinische . . . . . | H.S.B.                    | groß                    | Juli   |  |
| " große . . . . .                     | H.S.B.                    | sehr groß               | Juli   | eine der besten, namentlich für Hochstämme   |
| " von Jouy . . . . .                  | H.S.B.                    | groß                    | Juli   |  |
| " " Montplaisir . . . . .             | H.S.B.                    | groß, gelb, Fleisch rot | Juli   |  |
| Luizet . . . . .                      | H.                        | groß                    | Juli   |  |
| Pfirsichaprikose v. Nancy . . . . .   | H.S.B.                    | sehr groß               | August | sehr zu empfehlen  |
| Souvenir d'Amic . . . . .             | H.S.B.                    | groß                    | Juli   |  |

**Für die Rheinprovinz empfohlen:**

Frühe große, Pfirsichaprikose von Nancy.





## Pfirsiche und Nektarinen

|  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang . . . . .   | 2.50          | 24.—         | 230.—         |
| „ 8—9 „ „ . . . . .                        | 3.—           | 28.—         | 260.—         |
| Halbstämme, 6—8 „ „ ca. 1.20 m Stamm . . . | 1.80          | 17.—         | 160.—         |
| Spaliere mit 1 Etage . . . . .             | 2.—           | 18.—         | 160.—         |
| „ „ 2 „ . . . . .                          | 3.—           | 28.—         | 260.—         |
| „ „ 3 „ . . . . .                          | 3.60          | 34.—         |               |
| Buschformen . . . . .                      | 1.50          | 14.—         | 130.—         |

|  | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht | Reife | Wachstum<br>des Baumes | Bemerkungen |
|--|---------------------------|--------|-------|------------------------|-------------|
|--|---------------------------|--------|-------|------------------------|-------------|

### A. Pfirsiche.

|                                       |        |                                      |             |             |                                     |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Amsden . . . . .                      | H.S.B. | groß, schön rot gefärbt              | Juli        | mittelstark | extra                               |
| Arcansas . . . . .                    | S.B.   | mittelgroß, sonnen-<br>wärts gerötet | Juli        | stark       |                                     |
| Frühe Alexander . .                   | H.S.B. | mittelgroß, rötlich                  | Juli        | mittelstark | sehr gut                            |
| „ Beatrix . . . . .                   | S.B.   | rötlich                              | Juli        | sehr stark  |                                     |
| „ York . . . . .                      | H.S.B. | mittelgroß, gelblich                 | August      | sehr stark  |                                     |
| Hyatt . . . . .                       | B.     | groß                                 | Juli        | mittelstark | sehr schön                          |
| Jessie Kerr . . . . .                 | S.B.   | mittelgroß, gerötet                  | Juli        | mittelstark | widerstandsf.                       |
| Königin der Obst-<br>gärten . . . . . | H.S.B. | groß, purpurrot                      | September   | mittelstark | reichttragend                       |
| Königin Karola . . .                  | B.     | groß, gelbrot ver-<br>waschen        | September   | stark       |                                     |
| Magdalene weiße . .                   | S.B.   | ziemlich groß                        | Ende Aug.   | mittelstark | wird leicht von<br>Mehltau befallen |
| Mignonne große<br>frühe . . . . .     | H.S.B. | sehr groß, schön<br>gefärbt          | Mitte Aug.  | sehr stark  | extra                               |
| Rober . . . . .                       | B.     | mittelgroß                           | Ende Aug.   | stark       | gut z. Einmachen                    |
| Saunders . . . . .                    | H.S.B. | blutrot gefleckt                     | Juli        | mittelstark | gut und sehr<br>fruchtbar           |
| Schöne von Vitry . .                  | H.S.B. | hell                                 | Mitte Sept. | mittelstark | gut                                 |
| Sieger (Le Vainqueur)                 | S.B.   | mittelgroß                           | Juni-Juli   | sehr stark  | allerfrüheste<br>Sorte              |
| Valparaiso . . . . .                  | B.     | groß, rot                            | Anfang Okt. | stark       | gut z. Einmachen                    |
| Venusbrust . . . . .                  | H.S.B. | groß, schön gefärbt                  | Oktober     | mittelstark |                                     |
| Waterloo . . . . .                    | H.S.B. | sehr groß, von edlem<br>Geschmack    | Juli        | stark       | extra                               |

### B. Nektarinen.

|                      |      |                          |           |             |  |
|----------------------|------|--------------------------|-----------|-------------|--|
| Elruge . . . . .     | S.B. | groß<br>dunkel           | September | stark       |  |
| Frühe Rivers . . . . | S.B. | ziemlich groß, hell      | August    | sehr stark  |  |
| Galopin . . . . .    | B.   | groß, rötlich            | September | mittelstark |  |
| Lord Napier . . . .  | S.B. | groß, Sonnenseite<br>rot | Ende Aug. | stark       |  |

### Für die Rheinprovinz empfohlen:

Amsden, Magdalene weiße, Mignonne große frühe, Waterloo.



## Kirschen.

|  | 1 Stück<br>- M. | 10 Stück<br>M. | 100 St.<br>M. |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang . . . . .   | 1.60            | 15.—           | 140.—         |
| „ 8—9 „ „ . . . . .                        | 1.90            | 18.—           | 170.—         |
| „ 9—10 „ „ . . . . .                       | 2.40            | 22.—           | 200.—         |
| „ 10—12 „ „ . . . . .                      | 3.20            | 30.—           | 280.—         |
| Halbstämme, 6—8 „ „ ca. 120 cm Stamm . . . | 1.25            | 11.—           | 100.—         |
| Spaliere mit 1 Etage . . . . .             | 1.50            | 14.—           | 130.—         |
| „ „ 2 Etagen . . . . .                     | 2.50            | 24.—           | 230.—         |
| „ „ 3 „ . . . . .                          | 3.—             | 28.—           | 260.—         |
| Buschformen, einjährig . . . . .           | 1.20            | 11.—           | 100.—         |
| „ extra stark . . . . .                    | 2.—             | 18.—           | 170.—         |

|  | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht                                  | Reife nach<br>Wochen der<br>Kirschen-<br>zeit | Bemerkungen                          |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|
| <b>A. Süßkirschen.</b>                   |                           |   |   |                                      |
| Bigarreau Jaboulay . . . . .             | H.B.                      | groß, braunrot, fests fleischig         | 2.  | vorzügl., frühe Sorte<br>Herzkirsche |
| Eltonkirsche . . . . .                   | H.S.B.                    | groß, rotbackig                         | 2.  |                                      |
| Früheste der Mark . . . . .              | H.S.B.                    | mittelgroß, schwarzrot                  | 1.  |                                      |
| Herzkirsche gelbe . . . . .              | H.S.B.                    | fast groß, gelb mit rötlichem<br>Anflug | 3.  | „                                    |
| „ Kassins frühe . . . . .                | H.S.B.                    | eine der größten, schwarzrot            | 2.  | Herzkirsche                          |
| „ Koburger Mai . . . . .                 | H.S.B.                    | mittelgroß, schwarzrot                  | 1.  |                                      |
| „ Winklers weiße . . . . .               | H.B.                      | groß, schön                             | 2.  |                                      |
| Knorpel Büttners<br>große rote . . . . . | H.                        | groß, gelb mit rotem Anflug             | 5.  | Knorpelkirsche                       |
| „ Doenissens gelbe . . . . .             | H.S.B.                    | fast groß, glänzend gelb                | 5.  |                                      |
| „ große schwarze . . . . .               | H.S.B.                    | sehr groß, glänzend schwarz             | 5.  |                                      |
| „ Groths gelbe . . . . .                 | H.                        | groß                                    | 4.  | Herzkirsche                          |
| Lucienkirsche . . . . .                  | H.                        | groß, rötlich                           | 3.  |                                      |
| Ochsenherz . . . . .                     | H.                        | sehr groß schwarz                       | 3.  |                                      |
| Prinzessinkirsche . . . . .              | H.S.B.                    | sehr groß, rotbackig                    | 4.  | Herzkirsche                          |
| Riesenkirsche<br>Hedelfinger . . . . .   | H.S.B.                    | sehr groß, tief schwarzrot              | 4.  |                                      |
| Türkin (Flamentiner) . . . . .           | H.B.                      | groß, gelb mit rotem Anflug             | 3.  |                                      |

## B. Halbsaure.

|                               |        |                                 |    |                      |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|----|----------------------|
| Amarelle königliche . . . . . | H.S.B. | mittelgroß, hellrot, süßsäuerl. | 2. | Der Ertrag ist mäßig |
| Königin Hortense . . . . .    | H.S.B. | sehr groß, rötlich              | 4. |                      |
| „ „ frühe . . . . .           | H.     | groß, rötlich                   | 2. |                      |
| Maikirsche rote . . . . .     | H.S.B. | groß, rot                       | 2. |                      |
| Schöne von Chatenay . . . . . | H.     | groß, rot                       | 5. |                      |

## C. Sauerkirschen.

|   |        |                          |       |  |
|---|--------|--------------------------|-------|--|
| Glaskirsche spanische . . . . .                             | H.S.B. | mittelgroß, rot          | 3.    | } z. Einmachen geeignet  |
| Gobet großer . . . . .                                      | H.     | groß, rot                | 4.    |  |
| Harlemer . . . . .  | H.B.   | mittelgroß, hellrot      | 3.    |  |
| Kochs verb. Ostheimer<br>(Minister v. Podbielski) . . . . . | H.B.   | sehr groß, dunkelrot     | 5.    |  |
| Lotkirsche große lange<br>(Schattenmorelle) . . . . .       | H.S.B. | sehr groß, dunkelrot     | 5.—6. | unstreitig die beste und<br>ertragreichste, zum<br>Massenanbau<br>Einmachsorte |
| Schöne von Choisy . . . . .                                 | H.S.B. | mittelgroß, bräunlichrot | 2.    |  |
| Weichsel Ostheimer . . . . .                                | H.S.B. | mittelgroß, schwarzrot   | 4.    |  |

## Für die Rheinprovinz empfohlen:

Früheste der Mark, Knorpelkirsche große schwarze, Prinzessinkirsche große, Riesenkirsche Hedelfinger, Lotkirsche große lange.



## Mirabellen, Pflaumen, Reineclauden und Zwetschen.

|  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Hochstämme, 6—7 cm Stammumfang . . . . .   | 1.40          | 13.—         | 120.—         |
| „ 7—8 „ „ . . . . .                        | 1.60          | 15.—         | 140.—         |
| „ 8—9 „ „ . . . . .                        | 1.90          | 18.—         | 170.—         |
| „ 9—10 „ „ . . . . .                       | 2.40          | 22.—         | 200.—         |
| „ 10—12 „ „ . . . . .                      | 3.20          | 30.—         |               |
| Halbstämme, 6—8 „ „ ca. 1,20 m Stamm . . . | 1.25          | 11.—         | 100.—         |
| Pyramiden mit 2 Etagen, formiert . . . . . | 2.50          | 24.—         | 230.—         |
| Spaliere mit 1 Etage . . . . .             | 1.50          | 14.—         | 130.—         |
| „ „ 2 Etagen . . . . .                     | 2.50          | 24.—         | 230.—         |
| Buschformen, 1jährig . . . . .             | 1.—           | 9.—          | 80.—          |
| „ extra stark . . . . .                    | 2.—           | 18.—         | 170.—         |

|  | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht | Reifezeit | Wachstum<br>des Baumes | Bemerkungen |
|--|---------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|
|--|---------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|

### A. Mirabellen.

|                                    |        |                                     |        |                    |               |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| Gelbe . . . . .                    | H.S.B. | ziemlich groß, gelb                 | August | stark<br>aufrecht  | zum Einmachen |
| Herrenhäuser<br>doppelte . . . . . | H.     | mittelgroß, goldgelb, sehr<br>schön | August | mittelstark        | mäßig tragend |
| Von Metz . . . . .                 | H.S.B. | klein, gelb, leicht gerötet         | August | feinzweigig        | zum Einmachen |
| „ Nancy . . . . .                  | H.S.B. | mittelgroß, gelb                    | August | stark,<br>aufrecht | „ „           |

### B. Pflaumen.

|                                       |        |  |                |                         |                                |
|---------------------------------------|--------|--|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| Eierpflaume . . . . .                 | H.     | groß, rot                                    | End. Aug.      | stark                   |                                |
| Frühe fruchtbare . . . . .            | H.     | mittelgroß, schwarzblau                      | Juli-Aug.      | mittelstark             | sehr dankbar                   |
| „ Wagenstaedter . . . . .             | H.     | mittelgroß                                   | August         | stark                   |                                |
| Herrenpflaume<br>frühe rote . . . . . | H.     | groß, rot                                    | Juli           | stark,<br>aufrecht      |                                |
| Jeffersonpflaume . . . . .            | H.     | sehr groß, gelb, rotgefleckt                 | Septemb.       | stark,<br>aufrecht      |                                |
| Kirkespflaume . . . . .               | H.B.   | sehr groß, dunkelviolett                     | Septemb.       | stark,<br>aufrecht      |                                |
| Königin Viktoria . . . . .            | H.S.B. | groß, kirschrot, gelb<br>punktiert           | Ende<br>August | stark,<br>hängend       | sehr dankbar                   |
| Königspflaume von<br>Tours . . . . .  | H.S.B. | groß, rot, blau beduftet,<br>gelb marmoriert | August         | stark, etwas<br>hängend | sehr ertragreich               |
| The Czar . . . . .                    | H.     | groß, blau, eine der<br>besten Frühpflaumen  | Juli-Aug.      | stark                   | sehr früh- und<br>reichtragend |
| Tragédie . . . . .                    | H.     | mittelgroß, rot                              | Juli           | stark,<br>aufrecht      |                                |
| Washington . . . . .                  | HB.    | sehr groß, gelb, reine-<br>claudenartig      | Septemb.       | stark,<br>aufrecht      |                                |



|  | Vor-<br>handene<br>Formen | Frucht | Reifezeit | Wachstum<br>des Baumes | Bemerkungen |
|--|---------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|
|--|---------------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|

### C. Reineclauden.

|                    |        |  |                     |                         |                        |
|--------------------|--------|--|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Althanns . . . . . | H.S.B. | groß, rund, bläulichrot                      | August-<br>Septemb. | stark,<br>aufrecht      | trägt sehr reich       |
| Bavays . . . . .   | H.     | groß, fast ganz grün                         | Ende<br>Septemb.    | stark,<br>aufrecht      |                        |
| Frühe . . . . .    | H.     | groß, gelbgrün, rötlich<br>punktirt          | Juli-Aug.           | stark                   | ertragreich            |
| Große grüne . . .  | H.S.B. | groß, gelbgrün, öfters<br>rötlich angehaucht | August-<br>Septemb. | stark, etwas<br>hängend | die beste von<br>allen |
| Merolds . . . . .  | H.     | mittelgroß, gelb                             | Septemb.            | mittelstark             |                        |
| Von Jodoigne . .   | H.     | fast groß, bräunlich grün                    | Septemb.            | stark,<br>hängend       | ertragreich            |
| „ Oullins . . . .  | H.     | sehr groß, rundlich, gelb                    | August              | stark,<br>aufrecht      | reichtragend           |

### D. Zwetschen.

|  |      |  |                  |            |  |
|--|------|--|------------------|------------|--|
| Anna Späth . . . .                                   | H.   | ziemlich groß, pflaumen-<br>ähnlich      | Ende<br>Septemb. | stark      |  |
| <div>Borsumer späte<br/>Preis Hochst. à 2.50</div>   | H.B. | groß, blau, ähnlich<br>italienischer Zw. | Ende<br>Septemb. | stark      | sehr<br>reichtragend   |
| <div>Frühe Auerbacher<br/>Preis Hochst. à 2.50</div> | H.   | mittelgroß, blau                         | Juli-Aug.        | stark      | früheste Sorte   |
| Frühe Bühlers . . .                                  | H.B. | ansehnlich groß, schwarz-<br>blau        | August           | stark      | wohl die beste<br>Frühzwetsche                                     |
| „ Wangenheims  | H.   | mittelgroß, schwarzblau                  | August           | sehr stark |  |
| Früheste der Welt .                                  | H.   | groß, blau                               | Anf. Aug.        | stark      | reichtragend   |
| Große blaue Haus .<br>(veredelt)                     | H.   | groß, schwarzblau                        | Ende<br>Septemb. | sehr stark | für alle Zwecke<br>gut, unstreitig<br>die beste zum<br>Massenanbau |
| Gute von Bry . . .                                   | H.   | mittelgroß, violett                      | Ende Juli        | stark      |  |
| Italienische . . . .                                 | H.   | sehr groß, schwarzblau                   | Ende<br>Septemb. | stark      | hauptsächlich f.<br>warme Lagen                                    |

### Für die Rheinprovinz empfohlen:

Mirabelle von Meß, Mirabelle von Nancy, Kirkespflaume, Königin Viktoria, Reineclaude Althanns, Reineclaude große grüne, Große blaue Hauszwetsche, Frühe Wangenheims.

### Kirschäpfel.

| Malus  |            | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| cerasifera fructu luteo, kirschengroß, violett rot .   |            |               |              |               |
| „ coronaria, reineclaudengroß, angenehm duftend .      |            |               |              |               |
| „ Lady Crab, sehr groß . . . . .                       |            |               |              |               |
| „ pendula Elise Rathke, schöne, große Äpfel tragend    | Hochstämme | 1.60          | 15.—         | 140.—         |
| „ prunifolia fructu coccineo, kirschengroß, rot . .    | Halbstämme | 1.30          | 12.—         | 110.—         |
| „ sibirica coccinea, kirschengroß, rot . . . . .       | Pyramiden  | 1.20          | 11.—         | 100.—         |
| „ spectabilis Kaido, reineclaudengroß, gelb, rotbackig |            |               |              |               |
| „ toringo fastigiata bifera . . . . .                  |            |               |              |               |

### Mispeln.

|   |            |      |      |       |
|---|------------|------|------|-------|
| Großfrüchtige, sehr groß . . . . .                  |            |      |      |       |
| Kleinfrüchtige, gewöhnliche kleine . . . . .        |            |      |      |       |
| Königliche, ziemlich groß . . . . .                 |            |      |      |       |
| Steinlose, ziemlich groß und reichtragend . . . . . |            |      |      |       |
|   | Hochstämme | 1.60 | 15.— | 140.— |
|   | Halbstämme | 1.30 | 12.— | 110.— |
|   | Pyramiden  | 1.20 | 11.— | 100.— |

# Quitten.

Bereczki, birnförmig, enorm groß, eine der schönsten Sorten  
Champion, sehr groß, birnförmig . . . . .  
Fuller, groß, birnförmig . . . . .  
Portugiesische, sehr groß, birnförmig . . . . .  
Reas Mammut, mittelgroß, apfelförmig . . . . .  
Riesen von Vranja, sehr groß, birnförmig . . . . .  
Von Konstantinopel, groß, birnförmig . . . . .  
„ Leskovaz, sehr groß, birnförmig . . . . .

Hochstämme  
Halbstämme  
Pyramiden

| 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|---------------|--------------|---------------|
|---------------|--------------|---------------|

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 1.60 | 15.— | 140.— |
| 1.30 | 12.— | 110.— |
| 1.40 | 13.— | 120.— |

# Hagebutten.

Rosa rugosa (Regeliana) dankbar blühend, reichtragend . . .  
„ villosa (pomifera), gewöhnliche großfrüchtige . . .

Hochstämme

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1.50 | 14.— |      |
| 0.40 | 3.50 | 30.— |
| 0.50 | 4.—  | 35.— |

# Maronen (Edelkastanien).

Hochstämme, 10—12 cm Stammumfang . . . . .  
„ 12—14 „ „ . . . . .  
„ 14—16 „ „ . . . . .  
Pyramiden . . . . .

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 2.60 | 24.— | 220.— |
| 3.—  | 28.— | 260.— |
| 3.80 | 36.— | 340.— |
| 1.25 | 11.— | 100.— |

# Walnüsse.

Juglans nigra (Amerik. W.), starkwachsend, Früchte kugelig }  
„ cinerea (Butternuß), starkwachsend, Früchte länglich }  
„ regia (Deutsche bekannte Art), starkwachsend . . }  
Hochstämme

|         |      |      |       |
|---------|------|------|-------|
| 8—10 cm | 2.20 | 21.— | 200.— |
| 10—12 „ | 2.60 | 25.— | 240.— |
| 12—14 „ | 3.20 | 30.— |       |

# Haselnüsse.

Rotblättrige (Corylus maxima atropurpurea) . . . . .  
Waldhasel ( „ Avellana) . . . . .  
Großfrüchtige ( „ maxima) mit Namen in nachsteh. Sorten „

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.75 | 6.50 | 60.— |
| 0.40 | 3.50 | 30.— |
| 0.75 | 6.50 | 60.— |

\* siehe Abbildung Seite 28.

Bergers, sehr groß, länglich

Abbild. Nr. 8 \* Cosford, groß, „ zum Massenanbau geeignet

„ verbesserte, sehr groß, länglich

Frauendorfer frühe, sehr groß, länglich

„ 1 \* Hallesche Riesen, sehr groß, kugelig } zum Massenanbau geeignet

„ 7 \* Haselnuß von Mehl, groß, kugelig }

„ 5 \* Herzogin von Edinburgh, lang, von unregelmäßiger Form

„ 4 \* Kaiserhasel von Trapezunt, sehr groß, elliptisch

Langfrüchtige, groß, walzenförmig, zum Massenanbau geeignet

Nottingham's fruchtbare, mittelgroß

Rotfrüchtige, mittelgroß, Kernhaut hellrot, zum Massenanbau geeignet

Abbild. Nr. 2 \* Webbs Preisnuß, sehr groß, ertragreich und wohlschmeckend,  
zum Massenanbau, Preis p. Stück 1.— M.

Abbild. Nr. 3 \* Weißfrüchtige, mittelgroß, länglich

„ 6 \* Wunder von Bollweiler, groß, fast rund

Zellernuß lange, groß, sehr reichtragend





## Brombeeren.

### A. Aufrechtwachsende:

|  |      |      |      |   |
|--|------|------|------|---|
| Eldorado, Frucht groß, länglich, Fleisch dunkelrot . . . . . | 0.60 | 5.50 | 50.— | — |
| Erie, Frucht tiefschwarz, frühreifend . . . . .              |      |      |      |   |
| Newmans thornless, Frucht mittelgroß, wohlschmeckend . .     |      |      |      |   |
| Philadelphia, groß, schwarz . . . . .                        |      |      |      |   |
| Snyder, mittelgroß, süß, reichtragend . . . . .              |      |      |      |   |
| Theodor Reimers, reichtragend, glänzend schwarz . . . . .    |      |      |      |   |

### B. Rankende:

|   |      |      |      |   |
|---|------|------|------|---|
| Laciniata, Frucht groß, rundlich, schwarz, Blätter tief eingeschnitten  | 0.60 | 5.50 | 50.— | — |
| Lucretia, sehr groß, länglich, schwarz, ungemein reichtragend;<br>die schönen, saftreichen Früchte haben einen angenehmen,<br>säuerlichen Geschmack . . . . . | 0.60 | 5.50 | 50.— | — |

## Himbeeren.

### A. Einmaltragende:

|   |      |      |      |       |
|---|------|------|------|-------|
| Antwerpener gelbe, mittelgroß, hell- bis rötlichgelb, fest, wohl-<br>schmeckend . . . . .                                 | 0.30 | 2.50 | 20.— | —     |
| Fastolph, mittelgroß bis groß, dunkelrot, saftreich; süß und<br>aromatisch, zum Massenanbau . . . . .                     | 0.20 | 1.50 | 10.— | 80.—  |
| Hornet, sehr groß, dunkelrot, etwas spätreifend, vorzügliche Tafel-<br>frucht, zum Massenanbau . . . . .                  | 0.20 | 1.50 | 10.— | 80.—  |
| Knevetts Riesen, sehr groß, dunkelrot, zum Massenanbau . .  | 0.25 | 2.—  | 15.— | 100.— |
| Loganbeere, sehr groß, braunrot, eine Hybride zwischen Brom-<br>und Himbeere . . . . .                                    | 0.80 | 7.—  | 60.— | —     |
| Marlborough, zum Teil sehr groß, hellrot, äußerst fruchtbar . .   | 0.25 | 2.—  | 15.— | 100.— |
| Shaffers Colossal, sehr groß, fast schwarzblau, reichtragend;<br>Wuchs sehr stark; treibt keine Wurzeläusläufer . . . . . | 0.60 | 5.50 | 50.— | —     |
| Superlative, sehr groß, dunkelrot, eine der besten zum Massen-<br>anbau . . . . .   | 0.25 | 2.—  | 15.— | 100.— |

### B. Zweimaltragende:

|  |      |     |      |       |
|--|------|-----|------|-------|
| Immertragende vom Feldbrunnen, sehr groß, dunkelrot, äußerst<br>saftreich, gewürzt und reichtragend; gut zum Massenanbau | 0.25 | 2.— | 15.— | 100.— |
|--|------|-----|------|-------|

## Spargelpflanzen.

|                                 |   |   |     |      |
|---------------------------------|---|---|-----|------|
| Ruhm von Braunschweig . . . . . | — | — | 4.— | 35.— |
|---------------------------------|---|---|-----|------|

## Weinreben.

Infolge Artikel III der Phylloxera-Konvention werden Weinreben  
nicht mehr kultiviert.





DAHS, REUTER & CO.  
JÜNGSFELD.

## Erdbeeren.

Verpflanzte Ausläufer: 10 Stück — .60 M. | 100 Stück 5.— M. | 1000 Stück 40.— M.

### A. Großfrüchtige:

**Belle Alliance**, groß, rot, rundlich. Die jungen Ausläufer liefern fast immer im Herbst eine zweite Ernte.

**Deutsch Evern**, mittelgroß, leuchtendrot, herzförmig; die früheste von allen, dabei sehr reichtragend.

**Die Perle**, Frucht mittelgroß, rot, außerordentlich reichtragend, remontierend, sehr zu empfehlen.

**Kaisers Sämling**, groß, hellrot, vorzüglicher Geschmack; eine der reichtragendsten; widerstandsfähig.

**König Albert von Sachsen**, groß, leicht gerötet, zuweilen fast weiß, sehr reichtragend und von allen die wohlschmeckendste.

**Königin Luise**, Frucht groß, länglich, rot gefärbt, festfleischig und von köstlichem Geschmack.

**La Constante**, groß, hellrot, die späteste von allen.

**Louis Vilmorin**, groß, rot, länglich, reichtragend.

**Noble (Laxton)**, sehr groß, leuchtend rot, regelmäßig rund, liefert enorme Erträge, fast die beste zum Massenanbau.

**Ruhm von Vierlanden**, Frucht sehr groß, beulig, rot, eine der frühesten Sorten.

**Sieger**, sehr groß, lebhaft rot, Fleisch hellrot, fest, wohlschmeckend.

**St. Joseph** (2 mal tragend), kaum mittelgroß, dunkelrot. Die erste Ernte beginnt sehr früh, die zweite Anfang August. Nicht zum Massenanbau geeignet, weil die Früchte zu weich sind.

### B. Monatserdbeeren:

**Eythraer Kind**, klein, hellrot, trägt bis zum Herbst, weil jeder Ausläufer gleich Blüten treibt.

**Ruhm von Döbeltitz**, klein bis mittelgroß, dunkelrot, liefert bis zum August enorme Erträge; gut zum Massenanbau.

**Ruhm von Machern**, klein, rot, duftend, sehr feinschmeckend.

**Hochstämme** (nur die mit \* bezeichneten Sorten sind als Hochstämme vorhanden) 1—1,20 m hoch . . . . .

**Sträucher, verpflanzte** . . . . .

„ „ extra stark . . . . .

| 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|---------------|--------------|---------------|
| 1.30          | 12.—         | 110.—         |
| 0.40          | 3.50         | 30.—          |
| 0.60          | 5.50         | 45.—          |

**\*Große rote holländische**, Frucht groß, Traube sehr lang, äußerst reichtragend, unstreitig die beste zum Massenanbau:

\*Hochrote frühe, Frucht sehr groß, Traube ziemlich lang, äußerst reichtragend;

\*Knights rote, Frucht sehr groß, Traube lang, weniger dicht behangen.

\*Große weiße holländische, Frucht groß, Traube lang, von den weißen die beste zum Massenanbau:

\*Kaiserliche weiße, Frucht groß, Traube sehr lang:

**Versailler weiße**, Frucht mittelgroß, Traube lang, locker behangen.

\*Goliath, Frucht sehr groß, Traube lang, zum Massenanbau;

\*Lees schwarze, Frucht mittelgroß, Traube meist lang;

**Neapolitanische, Frucht groß, Traube mittellang.**

|                              |   |            |           |    |           |
|------------------------------|---|------------|-----------|----|-----------|
| Morus alba, weißfrüchtige M. | { | Hochstämme | 7—9       | cm | . . . . . |
|                              |   | "          | 10—12     | "  | . . . . . |
|                              |   | "          | 12—14     | "  | . . . . . |
|                              |   | Pyramiden  | . . . . . |    |           |

*Morus nigra*, schwarze M., selten, Frucht groß, angenehm im Geschmack,  
Hochstämme à 6.— bis 10.— M. . . . .

| 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|---------------|--------------|
| 2.—           | 18.—         |
| 3.—           | 27.—         |
| 4.50          | 42.—         |
| 0.50          | 4.50         |
| —             | —            |





DAHS, REUTER & CO.  
JÜNGSFELD.

Große rote holländische.



Früheste gelbe



Hönigs-Früheste



Früheste dünnchalige



Rieser-Zitronen



Golden-Riesen



Brauner-Riesen



Früheste von  
Neuwied



Lowen-R triumph



Weißer triumph



Sommer von  
Maurer



Reife triumph



Reife von  
Kristall



## Stachelbeeren.

**Hochstämme** (nur die mit \* bezeichneten Sorten sind als Hochstämme vorhanden), 1—1,20 m hoch . . . . .

**Sträucher**, verpflanzte . . . . .

| 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|---------------|--------------|---------------|
| 1.60          | 15.—         | 140.—         |
| 0.60          | 5.50         | 50.—          |

### A. Gelbfrüchtige:

\***Früheste gelbe**, Frucht mittelgroß, stark behaart, sehr früh; auch für Massenanbau.

\***Hönings früheste**, Frucht mittelgroß, stark behaart, einige Tage früher reifend wie vorige; zum Massenanbau.

\***Riesenbeere gelbe**, Frucht sehr groß, fast kahl, spätreifend.

\***Riesen-Zitronenbeere**, Frucht sehr groß, behaart.

### B. Grünfrüchtige:

**Flaschenbeere grüne**, Frucht sehr groß, birnförmig, kahl, eignet sich besser zum Einmachen, wie zum Rohgenuß.

**Früheste dünnchalige**, Frucht groß, behaart.

\***Früheste von Neuwied**, Frucht sehr groß, behaart, von den grünen unstreitig die beste; sehr gut zum Massenanbau.

\***Lowetts Triumph**, Frucht sehr groß, glatt, spätreifend.

**Riesenbeere grüne**, Frucht sehr groß, spätreifend.



DAHS, REUTER & Co. JÜNGSFELD.

Früheste von Neuwied

## C. Rotfrüchtige.

**Crown Bob**, Frucht groß, sehr reichtragend.

\***Eibeere rote**, Frucht sehr groß, kahl, frühreifend.

**Frühe rote**, Frucht mittelgroß, glatt.

**Holländische rote**, Frucht groß, sehr ertragreich.

\***Preisbeere rote**, Frucht sehr groß, kahl, ganz spätreifend; eine der besten zum Massenanbau.

\***Riesenbeere braunrote**, Frucht sehr groß, leicht behaart, sonnenwärts schwarzbraun.

\***Sämling von Maurer**, Frucht sehr groß, stark behaart, frühreifend, wohlschmeckend.

\***Triumphbeere rote**, Frucht sehr groß, behaart; zum Massenanbau, namentlich zu Kompott die beste von allen.

## D. Weißfrüchtige:

\***Kristallbeere weiße**, Frucht sehr groß, glatt, frühreifend, saftreich und wohlschmeckend.

\***Triumphbeere weiße**, Frucht sehr groß, fein behaart, mittelfrüh; zum Massenanbau.

\***Volltragende weiße**, Frucht sehr groß, glatt, bei voller Reife fast durchsichtig.

**White lion**, Frucht groß, flaumig behaart, dünnschalig.

---





*Abies concolor violacea* (hort.)





# ADELHÖLZER

## KONIFEREN ♦ ZAPFENTRÄGER

Größtes, schönstes und reichhaltigstes Sortiment.

Besondere Vorzüge unserer Koniferen:  
Schönheit der Form infolge regelrechten Schnittes. — Feste Lehmballen beim Versand. — Gesichertes Anwachsen durch oftmaliges Verpflanzen und unsere rauhe Höhenlage.

Das zur Umhüllung der Erdballen verwendete Packleinen braucht bei der Pflanzung nicht abgenommen zu werden, weil es den Pflanzen beim Anwachsen nicht nachteilig ist.

Extra starke Solitärpflanzen siehe Seite 62 und 63.

Für persönliche Auswahl siehe Verkaufsbedingungen Absatz Nr. 7.

**Abies**, (Lk.), Weiß-Edel-Tanne.

" **amabilis** (Forb.) liebliche T., Purpur-T.; prachtvoller Baum (ähnlich unsrer Nordmannstanne) von den Gebirgen Kaliforniens, welche ihres stolzen Baues wegen nur als Einzelpflanze Verwendung finden sollte . . . . .

" **arizonica** (Merr.) Arizon-T., Park-T.; eine in neuerer Zeit aus Nordamerika eingeführte Tanne von stahlblauer Färbung. Charakteristisch ist, daß sich der Stamm bei ältern Pflanzen, wie bei unserer heimischen Birke, weiß färbt . . . . .

" **balsamea** (Mill.), Balsam-T.; nordamerikanische Art mit schwärzlich grünen Blättern und verharzten Knospen . . . . .

" **brachyphylla** (Maxim.), kurzblättrige W.; aus Japan eingeführt; eine noch wenig verbreitete, schöne, widerstandsfähige Tanne, die eine regelmäßige Pyramide bildet und im Wuchs Ab. Nordmanniana ähnelt . . . . .

" **cephalonica** (Loud.), cephalonische W.; herrliche dekorative Tanne, pyramidal wachsend, Blätter dunkelgrün, scharf stechend . . . . .

" **cilicica** (Carr.), cilicische T.; bildet regelmäßige, dichtbezweigte Pyramiden von dunkelgrüner Farbe . . . . .

" **concolor** (Lindl. & Gord.), gleichfarbige W.; stammt von den kalifornischen Gebirgen; ein sehr zierender Baum mit 5—8 cm langen, blaugrünen Blättern, kommt nur als Einzelpflanze zur Geltung . . . . .

" " **var. lasiocarpa** (Engelm. & Sarg.) unterscheidet sich von vorstehender durch etwas steifern Wuchs und bildet eine schöne, regelmäßige Pyramide . . . . .

" " **violacea** (hort.), siehe Abbildung. Herrliche weißblaue Form, welche in dekorativer Hinsicht — wegen ihrer auffallenden Färbung — als schönste der Weißtannen bezeichnet werden muß . . . . .

" **grandis** (Lindl.), große, kalifornische W.; stark wachsend, eine schöne, schmale Pyramide bildend. Blätter glänzend dunkelgrün . . . . .

" **Mariesii** (Masters), Maries-T.; sehr zierliche, frostharte Tanne aus Japan mit dichten, grünen, flachen Blättern . . . . .

" **nobilis** (Lindl.), edle W.; Silbertanne; ist auf den höhern Gebirgen des Oregon heimisch; herrlicher Baum mit dunkel-blau-grünen Blättern, zeigt jedoch in Deutschland meistens einen unregelmäßigen Wuchs; empfindlich gegen Spätfröste . . . . .

" " **glauca** (hort.), ähnlich wie vorstehende, mit dunkelblau gefärbten Blättern . . . . .

| Höhe<br>cm | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|------------|---------------|--------------|
| 60—70      | 3.—           |              |
| 80—100     | 4.—           |              |
| 50—60      | 5.—           |              |
| 70—90      | 6.—           | 55.—         |
| 100—110    | 8.—           | 75.—         |
| 60—80      | 1.20          |              |
| 90—110     | 1.80          |              |
| 120—140    | 3.50          | 32.—         |
| 60—80      | 5.—           | 45.—         |
| 130—150    | 10.—          |              |
| 80—100     | 6.—           | 55.—         |
| 60—70      | 4.—           | 36.—         |
| 80—90      | 4.—           | 36.—         |
| 100—120    | 8.—           | 75.—         |
| 130—150    | 12.—          | 110.—        |
| 160—190    | 20.—          | 180.—        |
| 100—120    | 8.—           | 75.—         |
| 80—90      | 6.—           | 55.—         |
| 100—120    | 9.—           | 80.—         |
| 130—150    | 14.—          | 130.—        |
| 140—160    | 7.—           | 65.—         |
| 170—200    | 9.—           |              |
| 50—60      | 3.50          |              |
| 100—120    | 8.—           | 75.—         |
| 140—160    | 13.—          | 120.—        |
| 80—90      | 8.—           | 75.—         |
| 100—120    | 10.—          | 90.—         |
| 140—160    | 20.—          | 180.—        |





*Cedrus atlantica* (Manetti)

**Abies.**

|   | Höhe<br>cm                           | 1 Stück<br>M.               | 10 St.<br>M.                  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| " <b>Nordmanniana</b> (Lk.), Nordmanns-T.; prächtiger, stolzer, winterharter Zierbaum aus dem westlichen Kaukasien, regelmäßige Pyramiden bildend, mit üppiger, dunkelgrüner Belaubung, eine der schönsten Einzelpflanzen . . . . . | 80—100<br>110—130<br>140—160         | 4.—<br>6.—<br>8.—           | 36.—<br>55.—<br>75.—          |
| " <b>numidica</b> (Carr.), numidische W.; üppige, dunkelgrüne, harte Tanne, ähnlich Nordmanniana, mit kürzern, steifen Blättern . . . . .   | 110—130<br>140—160<br>170—190        | 6.—<br>10.—<br>15.—         |                               |
| " <b>pectinata</b> (D. C.), Weißtanne, Edel-T.; bekannte, einheimische Art mit schön pyramidalem Wuchs . . . . .  | 120—150                              | 2.—                         | 18.—                          |
| " <b>Pinsapo</b> (Boiss.), spanische W.; prächtige, in der Jugend empfindliche Art, welche sich am schönsten an geschütztem Standort entwickelt . . . . .   | 60—70<br>80—90<br>100—120<br>130—150 | 5.50<br>7.—<br>10.—<br>14.— | 50.—<br>65.—<br>90.—<br>130.— |
| " <b>subalpina</b> (Engelm.), westamerikanische Balsam-T.; hübscher gedrunen wachsender Baum mit bläulicher Belaubung. Diese Sorte fühlt sich anscheinend in kältern Lagen wohler, wie an geschützten Standorten . . . . .          | 90—100                               | 8.—                         |                               |
| " <b>Veitchi</b> (Carr.), Veitchs W.; reizende, winterharte Edeltanne, aus Japan eingeführt; Blätter unterseits silberweiß, weshalb namentlich größere Pflanzen einen auserlesenen Schmuck unserer Gärten bilden                    | 70—80<br>90—110<br>120—150           | 3.—<br>5.—<br>7.—           | 27.—<br>45.—<br>65.—          |

**Araucaria** (Juss.), Araukarie, Schmucktanne.

|  |       |      |      |
|--|-------|------|------|
| " <b>imbricata</b> (Pav.), chilenische A.; äußerst dekorative, auffallende Konifere, aus dem südlichen Chile, welche als Einzelpflanze mit ihrer kandellaberförmigen Aststellung, den schuppigen Zweigen und dem dunklen Grün sehr effektiv wirkt; verlangt Winterschutz | 70—80 | 10.— | 90.— |
|--|-------|------|------|

**Biota** (Endl.), Morgenländischer Lebensbaum.

|   |                   |            |              |
|---|-------------------|------------|--------------|
| " <b>orientalis</b> (Endl.), morgenl. L.; ein aus China und Japan eingeführter Baum mit hellgrüner Belaubung und kegelförmigem Wuchs; verlangt geschützten Standort . . . . .                                 | 80—100<br>110—130 | 3.—<br>5.— | 27.—<br>45.— |
| " <b>elegantissima</b> (hort.), schwachwachsende Form mit goldgelber Belaubung; bildet ungleichmäßige Säulen und wird nur in geschützten oder warmen Lagen ihre volle Schönheit zur Geltung bringen . . . . . | 40—50             | 3.50       |              |

**Cedrus** (Lk.), Zeder.

|  |  |                                     |                                       |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| " <b>atlantica</b> (Manetti), Atlas-Z.; ein vom Atlasgebirge aus Nordafrika stammender Baum mit pyramidalem Wuchs, horizontal abstehenden Ästen und graugrüner Belaubung; schöne Solitärpflanze, siehe Abbildung . . . . . | 80—100<br>110—130<br>170—190                     | 5.—<br>6.50<br>15.—                 | 45.—<br>60.—                          |
| " <b>glauca</b> (hort.), auffallende Form, mit lockerm, ungleichmäßigem Wuchs, bei welcher die blaugrüne, fast silbergraue Färbung besonders hervortritt . . . . .   | 100—120<br>130—150<br>160—180<br>190—210         | 7.—<br>10.—<br>15.—<br>20.—         | 65.—<br>90.—<br>140.—                 |
| " <b>Deodora</b> (Loud.), Himalaja-Z.; eine überaus schöne Konifere von pyramidalem Wuchs mit leicht im Bogen überhängenden Zweigen, hat vielfach blaugrüne Belaubung; auserlesene Einzelpflanze . . . . .                 | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—200          | 4.50<br>6.—<br>8.—<br>15.—          | 40.—<br>55.—<br>75.—<br>140.—         |
| " <b>argentea</b> (hort.), üppige Form von aufstrebendem Wuchs, an <i>Cedrus atlantica</i> erinnernd, mit auffallend blauen bis silbergrauen Blättern . . . . .  | 90—110<br>120—140                                | 7.—<br>10.—                         |                                       |
| " <b>aurea</b> (hort.), eine auffallende Form mit goldgelben Blättern und leicht überhängenden Zweigen. Nur für geschützte Lagen   | 130—150  | 12.—                                |                                       |
| " <b>Libani</b> (Barr.), Libanon-Z., herrlicher Baum von breit pyramidalem Wuchs, im Alter schirmförmige Krone . . . . .   | 60—70<br>80—100<br>110—130<br>140—160<br>180—200 | 3.50<br>5.—<br>6.50<br>10.—<br>15.— | 32.—<br>45.—<br>60.—<br>90.—<br>140.— |





*Chamaecyparis Lawsoniana* (Parl.)

**Cephalotaxus** (S. & Z.), Kopfeibe.

|   | Höhe<br>cm                             | 1 Stück<br>M.              | 10 St.<br>M.                  |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|
| " <b>Fortunei</b> (Hook.), Fortunes K.; ein aus China und Japan eingeführter, nicht hoch wachsender Baum mit 6—8 cm langen, glänzend grünen Blättern, Zweige etwas überhängend . . . . .            | 70—90<br>100—110<br>120—140            | 4.50<br>6.50<br>10.—       | 40.—<br>60.—<br>90.—          |
| " <b>pedunculata fastigiata</b> (Carr.), Säulen-K.; ebenfalls aus Japan stammende, säulenförmige Konifere mit steif aufrecht wachsenden Zweigen und dichtstehenden, lederartigen Blättern . . . . . | 60—70<br>110—130<br>140—160<br>170—190 | 4.—<br>7.—<br>10.—<br>15.— | 36.—<br>65.—<br>90.—<br>140.— |

**Chamaecyparis** (Spach.), Lebensbaum-Zypresse.

|   |   |                             |                               |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| " <b>Lawsoniana</b> (Parl.), siehe Abbildung. Lawsons L.; stammt aus Kalifornien. Eine allgemein beliebte Pflanze von pyramidalem Wuchs mit leicht überhängender, hellgrüner Bezweigung; prachtvolle Gruppenpflanze . . . . . | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—200 | 2.—<br>3.—<br>4.50<br>6.50  | 18.—<br>27.—<br>40.—<br>60.—  |
| " " <b>albo-spica</b> (hort.), schlanke, schöne, dichte Pyramide mit weißen Zweigspitzen . . . . .  | 80—100<br>180—200                       | 2.50<br>8.50                | 23.—<br>80.—                  |
| " " <b>Alumi</b> (hort.), Säulenform, meist stahlblaue Färbung; besonders schön und wertvoll, besonders zu empfehlen für regelmäßige Gärten und Friedhöfe . . . . .   | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—190 | 2.50<br>4.50<br>6.—<br>8.—  | 23.—<br>40.—<br>55.—<br>75.—  |
| " " <b>arg.-var.</b> (hort.), schöne, weißbunt-gefleckte Form . . . .   | 80—100<br>170—200                       | 3.—<br>8.—                  | 27.—<br>—                     |
| " " <b>aurea</b> (hort.), schwachwüchsige, gedrungene Form, von im Sommer leuchtend hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung, oft wie mit goldigem Schimmer überzogen; sehr empfehlenswert . . . . .                      | 80—90<br>100—120<br>130—150<br>160—180  | 3.50<br>5.—<br>8.—<br>12.—  | 32.—<br>45.—<br>75.—<br>110.— |
| " " <b>darleyensis</b> (hort.), eine hübsche, goldgelbe, pyramidal wachsende Form mit locker gestellten, leicht im Bogen überhängenden Zweigen . . . . .  | 60—80<br>90—110<br>130—160<br>190—200   | 2.50<br>4.—<br>5.50<br>12.— | 23.—<br>36.—<br>50.—<br>110.— |
| " " <b>erecta filiformis</b> (Neum.), zierliche, rundliche Form, deren fadenförmige Zweige leicht überhängen; sehr zu empfehlen   | 60—80<br>110—130<br>140—160             | 3.—<br>6.50<br>10.—         | 27.—<br>60.—<br>90.—          |
| " " <b>erecta viridis</b> (hort.), eine der wertvollsten, schönsten Formen, von schlankem Wuchs, mit aufstrebenden Ästen und frischem, saftigem Grün, das auch im Winter hält . .   | 80—90<br>100—120<br>130—150             | 2.50<br>3.50<br>5.50        | 23.—<br>32.—<br>50.—          |
| " " <b>filiformis</b> (hort.), lockere, schöne Form, deren grüne Zweige leicht im Bogen überhängen; für warme und geschützte Lagen . . . . .  | 80—100<br>110—120                       | 4.50<br>6.—                 | 40.—<br>55.—                  |
| " " <b>forsteckensis</b> (hort.), hübsche, seltene Kugelform mit dicht geknäuelten Zweigen . . . . .  | 30—40<br>40—50                          | 4.—<br>6.—                  | 36.—<br>55.—                  |
| " " <b>fragrans conica</b> (Beißn.), interessante, spitzkegelige Form mit kurzer, hahnenkammartig gekräuselter Bezweigung . .   | 70—90<br>100—120                        | 3.—<br>5.—                  | 27.—<br>45.—                  |
| " " <b>Fraseri</b> (hort.), eine steif säulenförmige, dichtbezweigte, dunkelblaue, schäpenswürdige Pflanze . . . . .  | 80—100<br>110—130                       | 2.50<br>4.50                | 23.—<br>40.—                  |
| " " <b>glauca</b> (hort.), auffallende, höchst wertvolle, gleich der Art leicht bezweigte Form von prächtiger, blau schimmernder Färbung . . . . .  | 110—130<br>140—160<br>180—200           | 4.50<br>6.—<br>9.—          | 40.—<br>55.—<br>80.—          |
| " " <b>glauca nivea</b> (hort.), gleich voriger in der Bezweigung, mit vollständig stahlblauer Färbung . . . . .  | 80—100<br>110—130<br>140—160            | 2.50<br>4.50<br>6.—         | 23.—<br>40.—<br>55.—          |
| " " <b>intertexta</b> (hort.), stark überhängende, weitgestellte, dicke blaugrüne Zweige; höchst dekorative, abweichende Form, welche kaum Zugehörigkeit zur Art erkennen läßt . . . .  | 80—100<br>160—180                       | 3.50<br>10.—                | 32.—<br>90.—                  |





*Chamaecyparis Laws. Triomf van Boskoop (hort.)*

## Chamaecyparis

|   |   | Höhe<br>cm                              | 1 Stück<br>M.               | 10 St.<br>M.                 |
|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| " | <b>Lawsoniana minima glauca</b> (hort.), ein ganz eigentümlicher, dicht gedrängter, zwergiger Kegel von dunkel-blaugrüner Färbung,<br>30—40 cm breit<br>40—50 " "   | 30—40<br>40—50                          | 3.—<br>4.50                 | 27.—<br>40.—                 |
| " | <b>nana</b> (hort.), siehe Abbildung, langsam wachsende, dichte, dunkelgrüne Zwergkugelform; wertvoll für Friedhöfe und kleinere, regelmäßige Gärten<br>30—40 cm breit<br>40—50 " "<br>50—60 " "  | 30—40<br>40—50<br>50—60                 | 3.—<br>4.50<br>7.—          | 27.—<br>40.—<br>65.—         |
| " | <b>pendula</b> (hort.), wildwachsende Form mit leicht und lang überhängender Bezweigung . . . . .   | 90—110<br>120—140                       | 5.—<br>7.50                 |                              |
| " | <b>pendula vera</b> (Hesse), schmale, leicht beästete Trauerform, deren Zweige schlaff bis zum Boden überhängen . . . . .   | 110—130<br>140—160                      | 5.—<br>7.—                  | 45.—<br>65.—                 |
| " | <b>pyramidalis</b> (P. Smith & Co.), schlank aufstrebende Pflanze mit zierlicher Bezweigung; sehr auffallend und dekorativ . . . . .  | 100—120<br>140—160<br>180—200           | 4.—<br>6.—<br>10.—          | 36.—<br>55.—                 |
| " | <b>Rosenthali</b> (P. Smith & Co.), Säulenform mit hellgrüner Belaubung, sehr zierliche, feine Bezweigung . . . . .   | 60—80<br>90—110<br>120—140              | 2.50<br>4.50<br>6.—         | 23.—<br>40.—<br>55.—         |
| " | <b>Silver Queen</b> (hort.), silberschillernde, locker wachsende Konifere, die besonders im Herbst und Winter sehr malerisch wirkt . . . . .  | 110—130<br>140—160<br>170—190           | 4.50<br>6.—<br>9.—          | 40.—<br>55.—<br>80.—         |
| " | <b>Smithi</b> (hort.), aufrecht wachsende Form mit silberigschimmernden leicht im Bogen überhängenden Zweigen . . . . .   | 70—90<br>100—120<br>130—150             | 3.50<br>5.—<br>7.—          | 32.—<br>45.—<br>65.—         |
| " | <b>Stewarti</b> , neuere Sorte, von geschlossenem, streng pyramidalen Wuchs und aufrechter Bezweigung, ähnlich Laws.-Fraseri, die Färbung ist schön gelb, bei jungen Trieben leuchtend goldgelb; unstreifig eine unsrer schönsten, gelben Koniferen . . . . .   | 80—100<br>110—130<br>140—160            | 4.50<br>6.50<br>8.50        | 40.—<br>60.—<br>80.—         |
| " | <b>Triomf van Boskoop</b> (hort.), siehe Abbildung, sehr schöne, silberigblaue Zypresse, hat den Wuchs der normalen Ch. Laws., ist dabei äußerst widerstandsfähig, der auffallenden blauen Färbung wegen besonders zu empfehlen . . . . .   | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—190 | 2.50<br>4.50<br>6.—<br>10.— | 23.—<br>40.—<br>55.—<br>90.— |
| " | <b>versicolor</b> (J. Conink), zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Sorte . . . . .  | 130—150                                 | 5.50                        | 50.—                         |
| " | <b>Westermanni</b> (hort.), eine goldgelb schimmernde, pyramidale, dichte aber dabei leicht und zierlich bezweigte Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält . . . . .   | 80—100<br>110—130<br>150—170<br>180—200 | 3.—<br>5.—<br>8.—<br>10.—   | 27.—<br>45.—<br>75.—<br>90.— |
| " | <b>Youngii</b> (hort.), auffallende, wenig verbreitete Form, mit leicht überhängenden, dicken, saftiggrünen Zweigen; abweichend von der Stammart; sehr zierend . . . . .  | 80—90<br>100—120<br>130—150             | 3.50<br>4.50<br>7.—         | 32.—<br>40.—<br>65.—         |
| " | <b>nutkaënsis</b> (Spach.), Nutka-L.; aus dem westlichen Nordamerika, von schlankem, pyramidalem Wuchs, Zweigspitzen leicht im Bogen überhängend; an Eleganz der Belaubung übertrifft dieselbe alle verwandten Arten, ist in jeder Größe dekorativ, zumal sie ihr frisches Grün auch den Winter über behält . . . . . | 90—110<br>120—140<br>150—170<br>180—200 | 3.50<br>5.50<br>7.—<br>10.— | 32.—<br>50.—<br>65.—<br>90.— |
| " | <b>arg.-var.</b> (hort.), silberbunte Form der vorigen . . . . .  | 70—90                                   | 4.50                        | 40.—                         |
| " | <b>aurea</b> (hort.), die jungen Triebe dieser schönen, pyramidal wachsenden Form sind goldgelb gefärbt . . . . .   | 240—260                                 | 20.—                        |                              |
| " | <b>compacta</b> (hort.), schön gedrungene, dichte, buschige Form, zierliche, blaugrüne Kugel bildend; für Friedhöfe und kleine Gärten zu empfehlen . . . . .  | 40—50<br>50—60<br>100—120               | 3.50<br>4.50<br>15.—        | 32.—<br>40.—                 |





*Chamaecyparis pisifera filifera* (hort.)

**Chamaecyparis**

|  | Höhe<br>cm                               | 1 Stück<br>M.                | 10 St.<br>M.                  |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| " <b>nutkaënsis glauca</b> (hort.), besitzt die Eigenschaften der Stammsorte <i>nutkaënsis</i> bei blaugrüner Belaubung . . . . .  | 90—110<br>120—140<br>150—170<br>180—200  | 3.50<br>5.50<br>7.50<br>10.— | 32.—<br>50.—<br>70.—<br>90.—  |
| " " <b>pendula</b> (hort.), höchst dekorative Form, welche zur Entfaltung ihrer ganzen Schönheit frei gepflanzt werden muß. Die Äste sind weißgestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter; sehr charakteristisch | 80—100<br>110—130                        | 4.50<br>6.—                  | 40.—<br>55.—                  |
| " <b>obtusa</b> (S. & Z.) Feuer-Z. Hinoki; aus Japan; dichtbezweigte, spitzkegelförmige Art mit festanliegenden, dicken, hellgrünen Blättern, gedeiht noch in trocknen Lagen . . . . .   | 100—120<br>120—140<br>150—170<br>180—200 | 3.50<br>5.—<br>7.—<br>12.—   | 32.—<br>45.—<br>65.—<br>110.— |
| " " <b>lycopodioides</b> (Carr.), dunkelgrüne, ungleichmäß. wachsende Zwergform mit dicklichen, öfter fast viereckigen und gedrehten, unterseits weiß gezeichneten Zweigen; passend zu Grotten- und Felspartien . . . . .                                    | 120—140<br>150—170                       | 4.50<br>6.—                  | 40.—<br>55.—                  |
| " " <b>lycopodioides forma coralliformis</b> , niedrige Zwergform mit grünen, runden, zierlich gedrehten Zweigen . . . . .   | 30—40                                    | 4.50                         | 40.—                          |
| " " <b>lycopodioides forma aurea</b> , Zwergform mit goldgelben, monströsen Zweigen . . . . .  | 40—50                                    | 5.—                          | 45.—                          |
| " " <b>nana gracilis</b> (hort.), reizende Zwergkegelform mit fächerförmigen, dunkelgrünen, eigenartig gedrehten Zweigen . .   | 30—40                                    | 4.50                         | 40.—                          |
| " <b>pisifera</b> (S. & Z.), erbsenfrüchtige L., japanischen Ursprungs, bildet leicht bezweigte, frischgrüne Pyramiden; die an den Spitzen überhängenden, unten weiß gezeichneten, jungen Zweige tragen sehr zu ihrer Schönheit bei . . . . .                | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—200  | 2.50<br>4.50<br>6.—<br>8.—   | 23.—<br>40.—<br>55.—<br>75.—  |
| " " <b>aurea</b> (hort.), rein goldgelbe Abart der vorigen; ist als besonders schön und winterhart zu empfehlen . . . . .  | 80—100<br>120—140<br>170—200             | 4.—<br>6.—<br>10.—           | 36.—<br>55.—<br>90.—          |
| " " <b>filifera</b> (hort.), siehe Abbildung, eine äußerst dekorative, harte Form mit fadenförmigen, nach allen Seiten hin überhängenden Zweigen und abstehenden, grünen, nadelähnlichen Blättern . . . . .  | 60—80<br>120—140<br>150—170<br>180—200   | 3.—<br>7.—<br>10.—<br>18.—   | 27.—<br>65.—<br>90.—<br>160.— |
| " " <b>filifera aurea</b> (hort.), hübsche, niedrige Form, deren fadenförmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist . . . . .  | 30—40                                    | 3.—                          |                               |
| " " <b>filifera nana</b> (Hesse), eine dichtbuschige Zwergform, welche auffallend langsam wächst . . . . .   | 50—60<br>70—90                           | 5.—<br>8.—                   | 45.—<br>75.—                  |
| " " <b>plumosa</b> (hort.), harte, dunkelgrüne pyramidale Pflanze; reizende, wertvolle Form, empfehlenswert für Gruppen . .  | 100—120<br>130—150<br>160—180            | 2.50<br>4.—<br>6.50          | 23.—<br>36.—<br>60.—          |
| " " <b>plumosa aurea</b> (hort.), zierliche, zumal beim jungen Triebe goldgelb gefärbte Konifere, die sich gegen dunkle Sorten hübsch abhebt . . . . .   | 100—120<br>130—150<br>160—180            | 3.50<br>5.—<br>7.—           | 32.—<br>45.—<br>65.—          |
| " " <b>squarrosa</b> (Beißn. & Hochst.), buschige, überaus zierliche, pyramidale Pflanze mit leicht abstehender, an den Spitzen überhängender Bezweigung; zur Zeit des frischen Triebes silberblau gefärbt . . . . .   | 70—90<br>100—120<br>130—150              | 2.50<br>4.—<br>6.—           | 23.—<br>36.—<br>55.—          |
| " " <b>squarrosa sulphurea</b> (hort.), zierliche Form der vorigen, hat im Sommer schwefelgelbe Bezweigung . . . . .   | 70—80                                    | 3.—                          | 27.—                          |
| " <b>sphaeroidea andelyensis</b> (Carr.), interessante Form der weißen Fluß-Zeder, zierlich pyramidal wachsend mit flachen, kurz gedrängten Zweigen und schuppigen Blättern . . . . .  | 60—80<br>90—100                          | 4.50<br>6.—                  | 40.—<br>55.—                  |
| <b>Cryptomeria</b> (Don.), <i>Cryptomeria</i> .  |  |                              |                               |
| " <b>japonica</b> (Don.), japanische C.; aus China und Japan eingeführt; schöner Baum mit überhängenden Zweigen, die von hellgrünen, gekrümmten, nadelförmigen Blättern rings umstellt sind . .  | 90—110<br>120—140<br>150—170<br>180—200  | 3.—<br>4.—<br>5.—<br>6.50    | 27.—<br>36.—<br>45.—<br>60.—  |





Chamaecyparis Lawsoniana nana (hort.)

**Cryptomeria**

- " **japonica compacta** (hort.), von schön gedrunenem Wuchse, mit dichter buschiger, blaugrüner Bezweigung . . . . .
- " " **elegans** (hort.), Jugendform der Art, mit längern, weichen, sichelförmig gebogenen Nadeln, färbt sich im Winter braun und muß bei starker Kälte geschützt werden . . . . .

**Ginkgo** (Kämpf.), Ginkgobaum

- " **biloba** (L.), echter G.; ein in China und Japan häufig vorkommender Baum mit lockerstehenden Ästen, ähnelt der fächerförmigen, im Herbst abfallenden Blätter wegen mehr einem Laubholz

**Juniperus** (L.), Wacholder, Sadebaum

- " **chinensis** (L.), chinesischer S., ein aus China und Japan eingeführter Baum, der in Gestalt und Belaubung außerordentlich wechselt; man findet an einem Zweige sowohl abstehende, stachelige, wie dachziegelig angedrückte Blätter; eine der schönsten Wacholderarten . . . . .
- " " **arg.-var.** (hort.), interessante, buschige, blaugrüne Form, bei welcher viele Zweigspitzen ganz weiß erscheinen . . .
- " " **Pfitzeriana** (Späth), unregelmäßig wachsende Form mit überhängender, sehr zierlicher Bezweigung . . . . .
- " " **procumbens aurea** (hort.), eine Form mit langen und stark übergebogenen, dabei ziemlich unregelmäßig gestellten Ästen, junge Triebe schön goldgelb . . . . .
- " **communis** (L.), gemeiner W.; bekannter, malerischer Strauch, welcher in jedem größeren Garten seinen Platz finden sollte . .

| Höhe<br>cm | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|------------|---------------|--------------|
| 60—70      | 2.50          | 23.—         |
| 60—80      | 2.50          | 23.—         |
| 90—110     | 4.—           | 36.—         |
| 120—140    | 6.—           | 55.—         |
| 150—170    | 8.—           | 75.—         |
| 130—150    | 3.50          | 32.—         |
| 160—180    | 5.—           | 45.—         |
| 100—120    | 4.—           | 36.—         |
| 170—200    | 10.—          | 90.—         |
| 80—100     | 4.—           | 36.—         |
| 110—130    | 5.50          | 50.—         |
| 60—70      | 4.—           | 36.—         |
| 80—100     | 6.—           | 55.—         |
| 40—50      | 3.50          | 32.—         |
| 70—90      | 2.50          | 23.—         |
| 100—120    | 3.50          | 32.—         |
| 130—150    | 5.—           | 45.—         |

Juniperus

|   | Höhe<br>cm                   | 1 Stück<br>M.        | 10 St.<br>M.         |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| " <b>communis cracovica</b> (hort.), aufstrebende Form mit horizontal abstehenden Ästen und hellgrünen Blättern . . . . .   | 80—100<br>110—130<br>140—160 | 4.—<br>5.—<br>6.50   | 36.—<br>45.—<br>60.— |
| " " <b>hibernica</b> (Gord.), irländischer W., besonders schöne, ganz dichte, schmale Säule; sehr wertvoll zu Einzelpflanzungen und Grabdekorationen siehe Abbildung . . . . .  | 60—70<br>80—90<br>100—120    | 3.—<br>4.—<br>5.50   | 27.—<br>36.—<br>50.— |
| " " <b>suecica</b> (Loud.), schwedischer W.; aufrechtwachsende Form mit steif aufstrebenden Ästen; hübsche, geschlossene Säulen bildend . . . . .   | 60—80<br>90—110              | 3.—<br>5.—           | 27.—<br>45.—         |
| " <b>nana</b> (Willd.), Zwerg- oder Alpen-W.; schöner niederliegender Strauch, welcher zur Bekleidung von Felspartien sehr dekorativ ist und sich durch die silberweiße Blattoberseite sofort von anderen Arten unterscheidet . . . . . | 70—90                        | 6.—                  |                      |
| " " <b>canadensis</b> (Carr.), von unregelmäßig breitem Wuchs, zum Teil trichterförmig gestellte Zweige . . . . .   | 50—60<br>60—70<br>80—90      | 3.50<br>3.50<br>4.50 | 32.—<br>32.—<br>40.— |
| " " <b>canadensis aurea</b> (hort.), unregelmäßig breit wachsend, junge Triebe bronzegelb; zur Bekleidung von Felspartien sehr wertvoll . . . . .   | 100—120<br>130—150           | 8.—<br>12.—          | 75.—<br>110.—        |
| " <b>occidentalis</b> (Hook.), westamerik. S.; ein in unsern Gärten bisher wenig vertretener, recht dekorativer Sadebaum von schlankem, pyramidalem Wuchs mit aufstrebenden Ästen von blaugrüner Färbung . . . . .                      | 60—70<br>80—100<br>110—130   | 3.—<br>4.—<br>6.—    | 27.—<br>36.—<br>55.— |



Juniperus virg. tripartita (hort.)





*Juniperus communis hibernica* (Gord.)

**Juniperus,**

|  | Höhe<br>cm                    | 1 Stück<br>M.        | 10 St.<br>M.         |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| " <b>Sabina</b> (L.), echter S.; schöner, dunkelgrüner Strauch; für Abhänge und zwischen Felsen sehr zu empfehlen; er breitet sich weit über den Boden aus . . . . .                       | 40—50<br>50—60<br>cm breit    | 2.50<br>3.50         | 23.—<br>32.—         |
| " " <b>tamariscifolia</b> (Ait.), einer der schönsten Sadeebäume, mit fast wagerecht ausgebreiteten Zweigen; unempfindlich. Zur Deckung von Abhängen und Felsen nicht genug zu empfehlen   | 40—50<br>cm breit             | 3.—                  | 27.—                 |
| " " <b>var.</b> (hort.), eine Form von J. Sabina mit fast auf dem Boden liegenden Ästen und beständiger, gelblich weißbunter Bezweigung . . . . .  | 80—90<br>cm breit             | 6.—                  | 55.—                 |
| " <b>sphaerica</b> (Lindl.), kugelfrüchtiger S.; aus dem nördlichen China; pyramidal wachsend mit leicht im Bogen überhängenden Zweigen . . . . .  | 100—120                       | 5.—                  | 45.—                 |
| " <b>virginiana</b> (L.), virginischer S.; rote Zeder; ein aus dem östlichen Nordamerika eingeführter, ganz harter, dekorativer Baum; ausgezeichnete Gruppenpflanze . . . . .              | 80—100<br>140—160<br>170—200  | 1.80<br>4.50<br>8.—  | 16.—<br>40.—<br>75.— |
| " " <b>albo-var.</b> (hort.), hübsche, weißbunte, beständige Form . . . . .  | 200—230                       | 12.—                 |                      |
| " " <b>aurea elegans</b> (hort.), zierliche, goldbunte Form von beständiger Färbung; wertvoll für Gruppen . . . . .  | 120—140<br>150—170<br>180—200 | 5.—<br>6.—<br>8.—    | 45.—<br>55.—<br>75.— |
| " " <b>elegantissima</b> (hort.), eine schöne pyramidale Pflanze mit goldgelben Zweigspitzen von gleichmäßiger, auffallender Zeichnung; von ähnlichen die schönste und wertvollste Form    | 100—120<br>150—170            | 4.50<br>8.—          | 40.—<br>75.—         |
| " " <b>glauca</b> (Carr.), üppig wachsend, von prächtig blaugrüner bis stahlblauer Färbung; sehr schöne, harte Konifere . . . . .  | 100—120<br>130—150<br>160—180 | 4.50<br>6.50<br>10.— | 40.—<br>60.—<br>90.— |
| " " <b>Kosteriana</b> (hort.), sehr schöne, niedrig bleibende Form mit schirmförmigen, abstehenden Zweigen . . . . .   | 70—80                         | 4.—                  | 36.—                 |
| " " <b>tripartita</b> (hort.), siehe Abbildung; niedrigbleibende Form mit ausgebreiteten oder übergeneigten Ästen und blaugrünen Blättern; schön an Abhängen und zwischen Felsen . . . . . | 60—80<br>80—100<br>110—130    | 2.50<br>4.—<br>6.—   | 23.—<br>36.—<br>55.— |

**Larix** (Lk.), Lärche.

|   |         |  |                             |
|---|---------|--|-----------------------------|
| " <b>europaea</b> (D. C.), gemeine L.; allgemein bekannter, hoch wachsender Baum mit horizontal abstehenden Ästen und zierlich hängenden Zweigen . . . . .            | 100—120 | 1.—<br>5.—<br>8.—<br>10.—                                      | 9.—<br>45.—<br>70.—<br>90.— |
|   |         | Hochstamm ca. 2 m Stamm, Umfang 13—15 cm<br>16—20 "<br>21—24 " |                             |
| " <b>leptolepis</b> (Gord.), dünnscuppige oder japan. L.; schöner, großer Baum mit horizontal abstehenden Ästen, rotbraunen Zweigen und blaugrünen Blättern . . . . . | 100—120 | 1.—  | 9.—                         |

**Libocedrus** (Endl.), Flußzeder.

|  |                               |                     |                      |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| " <b>decurrens</b> (Torr.), kalifornische F.; wertvoller, hellgrüner Baum von säulenförmigem Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und rotbrauner, im Alter tiefrissiger, weißer Rinde . . . . . | 100—120<br>130—150<br>160—180 | 5.—<br>7.50<br>10.— | 45.—<br>70.—<br>90.— |
| " " <b>aur.-var.</b> (hort.), schöne Form mit intensiv goldbunt gezeichneten Zweigen . . . . .   | 180—200                       | 12.—                |                      |

**Picea** (Lk.), Fichte (Rottanne).

|  |  |                            |                               |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| " <b>ajanensis</b> (Fish.), Ajan-F.; aus Sibirien; regelmäßige, steife, horizontal abstehende Bezweigung. Die oberseits dunkelgrün glänzende, unterseits silberweiße Belaubung verleiht älteren Pflanzen einen besondern Schmuck . . . . . | 70—90<br>100—120<br>130—150<br>160—180 | 3.50<br>6.—<br>8.—<br>15.— | 32.—<br>55.—<br>75.—<br>140.— |
| " <b>alba</b> (Lk.), nordamerikanische Weiß-F.; schöne, Pyramiden bildende Art, die durch ihre blaugrünen Blätter zierend wirkt . . . . .  | 100—120                                | 2.50                       | 23.—                          |





*Pinus Cembra* (L.)







*Pinus excelsa* (Wall.)

# Picea

„ **Omorica** (Panc.), Omorika-F. Höchst interessanter, schlanker Baum vom Himalaja mit kurzen Ästen und unterseits silbergrauen Blättern . . . . .

„ **orientalis** (Lk.), morgenländische oder Sapindus-F.; stammt vom Kaukasus; eine dichte, glänzend dunkelgrüne, zierliche Pyramide mit quirlständigen, abstrebenden Ästen und sehr dichtstehenden, auffallend kurzen Blättern . . . . .

„ **polita** (Carr.), glattzweigige Torano- oder Tigerschwanz-F.; aus Japan; ganz eigenartig schöne, von allen andern sofort zu unterscheidende Art mit aufstrebendem Wuchs, steifen Zweigen und scharf stehenden Blättern; die starrste aller bekannten Fichten .

„ **pungens** (Engelm.), Stech-F.; schöner pyramidalen Baum mit quirlständiger, steifer Bezweigung und abstehenden Nadeln; in der Färbung sehr veränderlich . . . . .

„ „ **glauca** (hort.), eine Form von hervorragender Schönheit mit quirlförmigen Ästen und auffallend blauer Färbung, welche auch den Winter über erhalten bleibt . . . . .

„ „ **Kosterii** (Kost.), diese prächtige, noch in den rauhesten Lagen harte Fichte ist der Liebling eines jeden Koniferenfreundes; der Wert dieser Sorte liegt besonders in der tiefblauen Färbung der Nadeln . . . . .

„ **Schrenkiana** (Fisch. & May.), Schrenks F.; aus Zentralasien eingeführte Fichte mit mattgrünen Blättern und leicht überhängenden Zweigen . . . . .

„ **sitkaënsis** (Carr. & Meyr.), Sitka-F.; hoher Baum aus dem westl. Nordamerika mit streng pyramidalem Wuchs, steif abstehenden Ästen und scharfen nadelgleich zugespitzten Blättern . . . . .

# Pinus (L.), Kiefer, Föhre.

„ **aristata** (Engelm.), Fuchsschwanz K.; buschiger Baum mit kurzer, quirlständiger Aststellung. Die Nadeln sind stets mit weißen Harzkörnern dicht besetzt . . . . .

„ **Cembra** (L.), Zirbel- oder Zübel-K., Arve, Zirne; siehe Abbildung. Besonders schöne, zierliche Kiefer aus Mitteleuropa, schätzbar für rauhe Lagen, hat schmalen, pyramidalen Wuchs und in Büscheln stehende lange Nadeln; sehr gute Einzelpflanze

„ **columnaris** (hort.), eine schöne, neue Säulenform der vorigen, von dicht geschlossenem Wuchs und senkrecht aufstrebenden Zweigen, die nur als Einzelpflanze zur vollen Geltung kommt

„ **excelsa** (Wall.), Tränen-K., Himalaja-Weimuts-K.; siehe Abbildung. Prächtiger, dekorativer Baum mit schlaff hängenden 12–18 cm langen Nadeln von bläulich silberartigem Schimmer; eignet sich besonders zur Einzelpflanzung . . . . .

„ **Jeffreyi** (Murr.), Jeffreys-K.; interessante, üppige Kiefer mit starken Zweigen und graugrünen, sehr langen Nadeln . . . . .

„ **Laricio austriaca** (Endl.), Schwarz-K.; üppiger Baum mit kandelaberförmiger Aststellung, Nadeln schwarzgrün, besonders steif abstehend . . . . .

| Höhe<br>cm | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|------------|---------------|--------------|
| 60–70      | 3.50          | 32.—         |
| 80–100     | 4.50          | 40.—         |
| 120–140    | 7.—           | 65.—         |
| 150–170    | 10.—          | 90.—         |
| 60–70      | 2.30          | 20.—         |
| 80–100     | 3.50          | 32.—         |
| 120–140    | 5.—           | 45.—         |
| 160–180    | 10.—          | 90.—         |
| 190–210    | 15.—          | 140.—        |
| 60–70      | 3.20          | 30.—         |
| 80–90      | 4.50          | 40.—         |
| 100–120    | 6.50          | 60.—         |
| 130–150    | 10.—          | 90.—         |
| 160–180    | 15.—          | 140.—        |
| 80–100     | 3.50          | 32.—         |
| 110–130    | 5.—           | 45.—         |
| 140–160    | 7.—           | 65.—         |
| 170–200    | 10.—          | 90.—         |
| 50–60      | 5.—           | 45.—         |
| 70–80      | 7.—           | 65.—         |
| 90–100     | 9.—           | 80.—         |
| 110–130    | 13.—          | 110.—        |
| 140–160    | 20.—          | 180.—        |
| 170–200    | 40.—          | 350.—        |
| 50–60      | 7.—           | 65.—         |
| 70–80      | 9.—           | 80.—         |
| 90–100     | 11.—          | 100.—        |
| 110–130    | 14.—          | 120.—        |
| 140–160    | 25.—          | 230.—        |
| 170–200    | 45.—          | 400.—        |
| 70–90      | 4.50          | 40.—         |
| 100–120    | 7.—           | 65.—         |
| 100–120    | 2.—           | 18.—         |
| 130–150    | 3.—           | 27.—         |
| 160–180    | 4.50          | 40.—         |
| 190–210    | 6.—           | 55.—         |
| 50–60      | 3.—           | 27.—         |
| 60–80      | 4.—           | 36.—         |
| 60–70      | 2.50          | 23.—         |
| 80–90      | 4.—           | 36.—         |
| 100–120    | 5.50          | 50.—         |
| 130–150    | 8.50          | 80.—         |
| 180–200    | 12.—          |              |
| 60–70      | 7.—           | 65.—         |
| 80–100     | 10.—          |              |
| 80–100     | 3.50          | 32.—         |
| 110–130    | 4.50          | 40.—         |
| 140–160    | 7.—           | 65.—         |
| 170–200    | 10.—          | 90.—         |
| 80–100     | 5.50          | 50.—         |
| 110–130    | 6.50          | 60.—         |
| 80–100     | 2.50          | 23.—         |
| 170–200    | 10.—          |              |





*Pinus silvestris fastigiata* (Carr.)

**Pinus,**

|   | Höhe<br>cm                  | 1 Stück<br>M.       | 10 St.<br>M.          |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| " <b>montana</b> (Mill.), Berg.-K., Krummholz-K., sehr veränderliche, meist niederliegende Form mit gleichfarbig dunkelgrünen Nadeln; eignet sich besonders für trocknen Standort. Sehr empfehlenswert für Felsen | 40—50<br>60—70<br>110—130   | 2.—<br>3.—<br>7.—   | 18.—<br>27.—<br>65.—  |
| " <b>parviflora</b> (S. & Z.), kleinblütige K.; mittelhoher japanischer Baum von pyramidalem Wuchs, horizontal gestellten Ästen und kurzen bräunlich-filzigen, jungen Zweigen . . . . .                           | 100—120                     | 10.—                |                       |
| " <b>glauca</b> (hort.), eine herrliche Form der vorigen mit stahl-blauen Nadeln; eigenartig schöne Einzelpflanze von unregelmäßigem Wuchs . . . . .  | 70—90<br>130—150<br>170—200 | 6.—<br>10.—<br>25.— | 55.—<br>90.—          |
| " <b>silvestris</b> (L.), gemeine K., Föhre; einheimische, bekannte Kiefer mit unregelmäßiger Bezweigung und kurzen, blaugrünen bis silbergrauen Nadeln . . . . .   | 100—120                     | 1.50                | 13.—                  |
| " <b>fastigiata</b> (Carr.), gedungen wachsende Form mit dunkel-blaugrüner Belaubung, <u>siehe Abbildung</u> . . . . .  | 60—70<br>100—120<br>120—140 | 4.—<br>10.—<br>15.— | 36.—<br>90.—<br>140.— |
| " <b>Strobus</b> (L.), Weimuts-K., Strobe; beliebter allgemein verbreiteter Baum aus Nordamerika mit ziemlich lockerer Belaubung; grüne, blauweiß gestreifte Nadeln . . . . .                                     | 100—120<br>180—200          | 1.80<br>5.50        | 16.—<br>50.—          |

**Pseudolarix** (Gord.), Goldlärche.

|  |                             |                     |                      |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| " <b>Kaempferii</b> (Gord.), chinesische G.; aufrechtwachsend; hat üppige, prächtig goldiggrüne Belaubung. Die Zweige sind mit 6—7 cm langen, vielfach in Büscheln stehenden Blättern dicht besetzt; sehr empfehlenswert . . . . . | 70—80<br>140—160<br>170—190 | 2.50<br>6.50<br>8.— | 23.—<br>60.—<br>75.— |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|

**Pseudotsuga** (Carr.), Douglas-Tanne.

|  |                               |                    |                      |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| " <b>Douglasi</b> (Carr.), Douglas-T.; ein herrlicher, sehr schnell wachsender, äußerst dekorativer Baum, mit hellgrünen, weichen Nadeln | 100—120<br>140—160            | 2.—<br>4.—         | 18.—<br>36.—         |
| " <b>glauca</b> (Mayr.), besitzt die Eigenschaften der P. Douglasi bei schöner, prächtig blaugrüner Färbung . . . . .                    | 80—100<br>140—160<br>180—200  | 2.—<br>5.—<br>7.—  | 18.—<br>45.—<br>65.— |
| " <b>glauca elegans</b> (hort.), locker bezweigte Pyramide mit kurzen, dicht um die Zweige gestellten, silberig schimmernden Blättern    | 100—120<br>130—150<br>160—180 | 6.—<br>8.—<br>10.— | 55.—<br>75.—<br>90.— |

**Sciadopitys** (S. & Z.), Schirmtanne.

|  |   |                                     |                                |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| " <b>verticillata</b> (S. & Z.), japanische Sch.; in der Jugend schwach wachsende Art mit wagerecht abstehenden, schirmförmigen Ästen. Die langen, dunkelgrünen Blätter sind gleichmäßig sternförmig geordnet; wertvolle, unter den Koniferen einzig dastehende Form . | 40—50<br>60—70<br>80—90<br>130—150<br>170—180 | 5.50<br>8.—<br>12.—<br>20.—<br>30.— | 50.—<br>75.—<br>110.—<br>180.— |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|

**Sequoia** (Endl.), Sequoia.

|   |   |                              |              |
|---|---|------------------------------|--------------|
| " <b>gigantea</b> (Torr.), Riesen-S., Wellingtonie, Mammutbaum; ein herrlicher Baum, regelmäßige, spitze Pyramiden bildend, kommt, da er riesenhafte Größe erreicht, nur als Einzelpflanze zur vollen Geltung; verlangt in der Jugend geschützten Standort ( <u>siehe Abbildung</u> ) . | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—180 | 5.50<br>7.50<br>15.—<br>25.— | 50.—<br>70.— |
|---|---|------------------------------|--------------|

**Taxodium** (Rich.), Sumpf-Zypresse.

|   |         |      |      |
|---|---------|------|------|
| " <b>distichum</b> (Rich.), zweizeilige S.; besonders schöner Baum aus Nordamerika, welcher feuchten Boden verlangt und vorzugsweise an den Ufern von Gewässern Verwendung findet . | 90—110  | 3.50 |      |
| " <b>pendulum elegans</b> (Carr.), hübsche Form, mit besonders leichter, zierlich überhängender Bezweigung . . . . .  | 120—150 | 5.50 | 50.— |

**Taxus** (Tourn.), Eibenbaum.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| " <b>baccata</b> (L.), gemeiner E. Schöner Baum, in der Landschaft durch gefälligen Wuchs und dunkelgrüne Färbung sehr wirkungsvoll, zumal im Winter und wenn er mit roten Früchten dicht besetzt ist. Eine der wenigen Koniferen, welche sich im Schatten gut entwickeln. Beliebt zur Bildung von Hecken .<br>Geschorene Pyramiden 50—100% teurer. | 60—70<br>80—90<br>100—120<br>130—150<br>160—180<br>190—210 | 2.20<br>3.60<br>5.50<br>9.—<br>15.—<br>20.— | 20.—<br>32.—<br>50.—<br>80.—<br>140.—<br>180.— |
|---|--|---|--|





*Sequoia gigantea* (Torr.)

Taxus,

|  | Höhe<br>cm  | 1 Stück<br>M.                       | 10 St.<br>M.                            |
|--|---|-------------------------------------|---|
| " <b>baccata adpressa</b> (Carr.), sehr abweichende Form von unregelmäßigem Wuchs, mit auffallend kurzen, grünen Blättern .  | 40—50<br>60—70<br>80—100<br>190—210               | 3.—<br>4.—<br>6.—<br>20.—           | 27.—<br>36.—<br>55.—                    |
| " " <b>aur.-var.</b> (hort.), interessant durch die bei jungen Trieben goldgelb gezeichneten Blätter . . . . .   | 60—70<br>80—90<br>100—120<br>160—180              | 4.50<br>7.—<br>10.—<br>20.—         | 40.—<br>65.—<br>90.—<br>180.—           |
| " " <b>cuspidata</b> (Carr.), charakteristische, japanische Form mit aufstrebenden Ästen, gedrungenem, ungleichmäßigem Wuchs, und dunkelgrünen Blättern . . . . .  | 100—120<br>130—150<br>160—180<br>190—210          | 6.—<br>10.—<br>15.—<br>20.—         | 55.—<br>90.—<br>140.—                   |
| " " <b>Dovastoni</b> (Carr.), vorzügliche, dekorative Form, namentlich, wenn die stark überhängenden Äste reich mit Früchten besetzt sind . . . . .<br>Wildgewachsene Büsche, passend für Felspartien,<br>60—70 cm breit                   | 100—120<br>60—80                                  | 6.—<br>4.—                          | 55.—<br>36.—                            |
| " " <b>elegantissima</b> (hort.), eine an den jungen Trieben lebhaft goldgelbe Form, die auch später heller gefärbt bleibt . . .   | 60—70<br>80—90<br>100—120<br>130—150              | 4.50<br>7.50<br>12.—<br>15.—        | 40.—<br>70.—<br>110.—<br>140.—          |
| " " <b>erecta</b> (Loud.), Säulenform mit zahlreichen, schlanken, aufrechten Ästen, feinen, aufstrebenden Zweigen und dunkelgrünen Blättern . . . . .  | 80—90<br>100—120<br>130—150<br>160—180            | 4.—<br>6.—<br>10.—<br>15.—          | 36.—<br>55.—<br>90.—<br>140.—           |
| " " <b>expansa</b> (Carr.), niederliegender Strauch mit lang ausgestreckten Zweigen, die sich wenig vom Boden erheben . .  | 60—70<br>80—100                                   | 6.—<br>10.—                         | 55.—<br>90.—                            |
| " " <b>fastigiata</b> (Loud.), siehe Abbildung. Irländischer oder Säulene., auffallende, schwarzgrüne, schmale Säule von langsamem Wuchs; für regelmäßige Gärten und für Gräber sehr zu empfehlen, verlangt geschützten Standort . . . . . | 80—90<br>100—120<br>130—150<br>160—180<br>190—200 | 5.—<br>6.50<br>12.—<br>20.—<br>25.— | 45.—<br>60.—<br>110.—<br>180.—          |
| " " <b>fastigiata aurea</b> (Stand.), eine Form der Säuleneibe, von fast goldgelber Färbung, mit grün gezeichneten Blättern .  | 130—150   | 12.—                                | 110.—                                   |
| " " <b>fastigiata aur.-var.</b> (hort.), hübsche, schwachwüchsige Form, von auffallender, goldbunter, sehr beständiger Färbung; für Farbengärten und regelmäßige Anlagen sehr zu empfehlen .   | 80—90<br>100—120<br>130—150<br>160—170<br>180—190 | 5.—<br>6.50<br>12.—<br>15.—<br>18.— | 45.—<br>60.—<br>110.—<br>130.—<br>160.— |
| " " <b>pyramidalis</b> (hort.), eine üppig wachsende, harte, pyramidale Form mit dichter, schwarzgrüner Bezweigung . . . . .   | 100—130   | 6.—                                 | 55.—                                    |
| " " <b>Washingtoni</b> (hort.), unregelmäßig gedrungen wachsende Pflanze mit goldbronzeener, auch im Winter konstanter Färbung<br>80—90 cm breit<br>100—120 " "  | 80—90<br>100—120                                  | 6.—<br>10.—                         | 55.—<br>90.—                            |

Thuya (Tourn.), Lebensbaum.

|  |  |                            |                              |
|--|--|----------------------------|------------------------------|
| " <b>gigantea</b> (Nutt.), siehe Abbildung. Riesen-L.; majestätischer, pyramidaler Baum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diese schöne Art doppelt wertvoll macht . . . . . | 100—120<br>130—150                       | 3.50<br>5.—                | 32.—<br>45.—                 |
| " " <b>atrovirens</b> (hort.), schöne, schlank wachsende Form mit dunkelgrüner, glänzender Belaubung, verdient die weiteste Verbreitung . . . . .  | 110—130<br>140—160                       | 4.50<br>6.50               | 40.—<br>60.—                 |
| " " <b>aurescens</b> (hort.), Form von ausgeprägt gelber, beständiger Färbung, empfehlenswerte Gruppenpflanze . . . . .  | 100—120<br>130—150<br>160—180<br>190—210 | 3.—<br>4.50<br>7.—<br>10.— | 27.—<br>40.—<br>65.—<br>90.— |





*Taxus baccata fastigiata* (Loud.)

# Thuya,

|  | Höhe<br>cm                                     | 1 Stück<br>M.                     | 10 St.<br>M.                         |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| " <b>gigantea aur.-var.</b> (hort.), goldbunte, lebhaft wachsende, zierliche Form, deren Färbung am schönsten bei jungen Zweigen hervortritt . . . . .   | 100—120<br>140—160<br>180—200                  | 3.50<br>5.—<br>10.—               | 32.—<br>45.—<br>90.—                 |
| " <b>occidentalis</b> (L.), abendländischer L.; häufig in unsern Gärten vertreten, wird zu Schuß- und Deckpflanzungen verwendet und läßt sich durch Beschneiden zu jeder Form, besonders zu schönen Pyramiden und dichten Hecken ziehen; durchaus widerstandsfähig . . . . . | 70—90<br>100—130<br>140—170<br>180—210         | 1.—<br>1.50<br>2.50<br>5.—        | 9.—<br>13.—<br>22.—<br>45.—          |
| " " <b>aur.-var.</b> (hort.), goldbunte, beständige, sehr schöne Form, bildet geschlossene Pyramiden; sehr wirkungsvoll . . . .  | 110—130<br>140—160<br>170—200                  | 3.50<br>5.—<br>8.—                | 32.—<br>45.—<br>75.—                 |
| " " <b>Bodmeri</b> (hort.), sehr eigenartige Konifere von pyramidalem, lockerm Wuchs mit auffallend dicken, vierseitigen Zweigen und dichtstehenden, schuppenförmigen Blättern .   | 100—120<br>140—160<br>170—190<br>200—220       | 3.—<br>4.50<br>7.—<br>10.—        | 27.—<br>40.—<br>65.—                 |
| " " <b>Columbia</b> (hort.), im Gegensatz zu andern, bunten Thuya-Arten tritt bei dieser die auffallend weißbunte Färbung am lebhaftesten im Winter hervor . . . . .   | 90—100<br>110—130<br>140—160<br>170—190        | 3.50<br>4.50<br>6.—<br>8.—        | 32.—<br>40.—<br>55.—<br>75.—         |
| " " <b>compacta</b> (hort.), sehr schöne Kugelform, mit lockerer, leichter Bezweigung . . . . .  | 50—60<br>70—80<br>80—100                       | 2.—<br>3.—<br>4.—                 | 18.—<br>27.—<br>36.—                 |
| " " <b>Ellwangeriana</b> (hort.), bildet zierliche, dicht bezweigte, gedrungene Pyramiden; zu Einzel- und Vorpflanzungen, auch zum Gräberschmuck als eine der wertvollsten, harten Lebensbaumformen sehr zu empfehlen . . . . .  | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—200        | 2.—<br>3.—<br>4.50<br>8.—         | 18.—<br>27.—<br>40.—<br>75.—         |
| " " <b>globosa</b> (hort.), besonders schöne, { 40 cm breit<br>regelmäßige Kugelform mit feinen, dicht 50 " "<br>gedrängten Zweigen 80—100 " "   | 40<br>50<br>80—100                             | 2.50<br>3.50<br>10.—              | 23.—<br>32.—                         |
| " " <b>Hoveyi</b> (hort.), empfehlenswerte, zierliche und beliebte Form von eirundem, gedrungenem Bau und hellgrüner Färbung; in rauen Lagen bester Ersatz für die kompakten, empfindlichen Biota-Sorten . . . . .   | 50—60<br>70—80<br>90—110<br>120—140<br>150—170 | 1.50<br>2.20<br>3.—<br>4.—<br>6.— | 14.—<br>20.—<br>27.—<br>36.—<br>55.— |
| " " <b>lutea</b> (hort.), pyramidal wachsende, dunkelgelbe, auch im Winter hübsch gefärbte Form . . . . .  | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>180—200        | 2.50<br>3.50<br>6.—<br>8.—        | 23.—<br>32.—<br>55.—<br>75.—         |
| " " <b>Ohlendorffii</b> (Beißn.), [Syn. Th. occ. Späthi P. Smith], eine ganz eigentümliche, teils mit fadenförmigen und auch monströsen Zweigen besetzte Form; unregelmäßig, jedoch geschlossen gebaut . . . . .   | 40—50  | 4.—                               |                                      |
| " " <b>recurva nana</b> (hort.), dichtbezweigte Kugelform mit übergebogenen oder gedrehten Zweigspitzen . . 30—40 cm breit<br>40—50 " "  | 30—40<br>40—50                                 | 2.80<br>4.—                       | 25.—<br>36.—                         |
| " " <b>recurvata</b> (hort.), eigentümliche, gedrungene Pyramidenform; Zweige dichtstehend, oft mit gedrehten Spitzen . . .  | 70—90<br>100—120<br>130—150<br>170—190         | 2.50<br>3.50<br>5.—<br>7.—        | 23.—<br>32.—<br>45.—<br>65.—         |
| " " <b>Riversii</b> (hort.), gedrungene, pyramidale Pflanze von gellichem Grün, regelmäßig wachsend; sehr beliebte Gruppenpflanze . . . . .  | 100—120<br>130—150<br>160—180<br>190—210       | 2.80<br>4.50<br>6.—<br>8.—        | 25.—<br>40.—<br>55.—<br>75.—         |
| " " <b>Rosenthalii</b> (Ohlend.), bildet eine glänzend dunkelgrüne Säulenform, äußerst wertvoll, weil sie auch im Winter ihre lebhaft grüne Farbe behält . . . . .   | 60—80<br>160—180                               | 2.50<br>8.—                       |                                      |
| " " <b>umbraculifera</b> (C. Neder), äußerst schöne, saftiggrüne Kugelform mit konstanter Färbung . . . . . 50—60 cm breit<br>70—80 " "  | 50—60<br>70—80                                 | 3.50<br>5.50                      | 32.—<br>50.—                         |





*Thuya gigantea* (Nutt.)

# Thuya,

|  | Höhe<br>cm                               | 1 Stück<br>M.              | 10 St.<br>M.                 |
|--|--|----------------------------|------------------------------|
| " <b>occidentalis Vervaeneana</b> (hort.), pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelber, auch im Winter goldbronzeartiger — nicht krankhaft bunter — Färbung . . . . .  | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—190  | 2.50<br>3.50<br>5.—<br>7.— | 23.—<br>32.—<br>45.—<br>65.— |
| " " <b>viridis</b> (hort.), schöne, schlank aufstrebende, dicht und fein bezweigte, dunkelgrüne Form . . . . .   | 100—120                                  | 3.50                       | 32.—                         |
| " " <b>Wagneriana</b> (Fröbel), bildet schlank aufstrebende, schmal-ovale Säulen . . . . .   | 40—50<br>60—70                           | 2.—<br>3.50                | 18.—<br>32.—                 |
| " " <b>Wareana</b> (hort.), gedrungene Pyramide mit breiffächerförmigen, steifen, zusammengedrückten Zweigen; einer unser wertvollsten, harten Lebensbäume, für jeden Boden und jede Lage empfehlenswerte Gruppenpflanze . . . . .     | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—190  | 3.—<br>4.—<br>5.50<br>8.50 | 27.—<br>36.—<br>50.—<br>80.— |
| " " <b>Wareana globosa</b> (hort.), gedrunge wachsende Form der vorigen mit dünneren Zweigen . . . . .   | 120—140<br>150—170                       | 4.50<br>6.—                | 40.—<br>55.—                 |
| " " <b>Wareana lutescens</b> (Hesse), Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und dem gedrunge Bau der Stammform . . . . .   | 110—130<br>140—160<br>170—190            | 4.—<br>5.50<br>8.50        | 36.—<br>50.—<br>80.—         |
| " <b>Standishi</b> (Carr.), Standish's L.; wildwachsender Baum, welcher vorzüglich in lockern Gruppen Verwendung findet . . . . .  | 230—260                                  | 10.—                       | 90.—                         |
| <b>Thuyopsis</b> (S. & Z.), Hiba.  |  |                            |                              |
| " <b>dolabrata</b> (S. & Z.). Echte H., beilblättriger Lebensbaum; majestätischer, japanischer Baum mit pyramidalem Wuchs und schönem, glänzendem Grün; Zweige zweizeilig, zusammengedrückt, panzerartig durch die Blätter bedeckt . . | 60—70<br>80—90<br>100—120                | 4.—<br>5.50<br>8.—         | 36.—<br>50.—<br>75.—         |
| " " <b>variegata</b> (hort.), ähnlich der Stammart mit vereinzelt weißbunten Zweigspitzen . . . . .  | 80—90<br>140—160                         | 6.—<br>12.—                | 55.—<br>110.—                |
| <b>Tsuga</b> (Carr.), Hemlockstanne, Schierlingstanne.   |  |                            |                              |
| " <b>canadensis</b> (Carr.), kanadische H.; schöne, zierliche Konifere mit leichter im Bogen überhängender Bezweigung; allgemein als Zierbaum geschätzt . . . . .  | 100—120<br>130—150<br>160—180<br>190—210 | 3.—<br>4.50<br>6.50<br>9.— | 27.—<br>40.—<br>60.—<br>80.— |
| " " <b>microphylla</b> (hort.), schwach und regelmäßig wachsender Baum mit auffallend kurzen, feinen Blättern . . . . .  | 190—200                                  | 20.—                       |                              |
| " <b>caroliniana</b> (Engelm.), Karolina-H.; schöne widerstandsfähige Art mit locker stehenden Zweigen und hellgrünen, unterseits silberweißen Blättchen . . . . .   | 50—70                                    | 4.—                        | 36.—                         |
| " <b>diversifolia</b> (Maxim.), verschiedenblättrige H.; sehr seltene, reizende Pflanze von kegelförmigem Wuchs mit leichter Bezweigung und glänzend dunkelgrüner Belaubung . . . . .  | 80—90<br>100—120<br>130—150              | 6.—<br>8.—<br>12.—         | 55.—<br>75.—<br>110.—        |
| " <b>Pattoniana</b> (Engelm.), Pattons H.; pyramidaler Baum von zierlichem Wuchs mit schlanken weichhaarigen Zweigen und hellgrüner Belaubung; sollte seines hohen Wertes wegen nur als Einzelpflanze Verwendung finden . . . . .      | 70—80<br>90—110<br>120—140               | 6.50<br>10.—<br>16.—       | 60.—<br>90.—<br>150.—        |
| " " <b>argentea</b> (Engelm.), ähnlich der vorstehenden mit weißbraunen oder silbergrauen Blättern; sie steht an Schönheit und Färbung der Blautanne kaum nach . . . . .   | 70—80<br>90—110<br>120—140               | 7.50<br>12.—<br>18.—       | 70.—<br>110.—<br>170.—       |



# Solitärkoniferen

## und extra starke Gruppenpflanzen

Sortenbeschreibung siehe Seite 37—61

Erklärung: S = Solitär G = Gruppenpflanze

|  | Höhe in cm      |                 |                 |                   |                    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|  | 200—220<br>à M. | 230—260<br>à M. | 270—300<br>à M. | 310—350<br>à M.   | 360—400<br>à M.    |
| <i>Abies brachyphylla</i> . . . . .            |                 |                 |                 | G 30.—            |                    |
| „ <i>concolor</i> . . . . .                    | S 25.—          | S 30.—          | S 40.—          | G 30.—            | G 40.—             |
| „ „ <i>var. lasiocarpa</i> . . . . .           |                 |                 | S 40.—          |                   |                    |
| „ <i>grandis</i> . . . . .                     |                 | S 18.—          | S 25.—          |                   | S 40.—             |
| „ <i>nobilis glauca</i> . . . . .              | G 25.—          | G 30.—          |                 |                   |                    |
| „ <i>Nordmanniana</i> . . . . .                |                 |                 | G 30.—          | G 40.—            | G 50.—             |
| <i>Cedrus atlantica</i> . . . . .              | S 20.—          | S 25.—          | S 35.—          |                   |                    |
| „ <i>Deodara</i> . . . . .                     | S 20.—          |                 |                 |                   |                    |
| „ <i>Libani</i> . . . . .                      |                 | S 25.—          | S 35.—          | S 50.—            | S 60.—             |
| <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> . . . . .      | S 10.—          | S 15.—          | S 20.—          |                   |                    |
| „ <i>Laws. albo spica</i> . . . . .            | S 12.—          |                 | S 30.—          |                   |                    |
| „ „ <i>Alumi</i> . . . . .                     |                 |                 | S 30.—          |                   |                    |
| „ „ <i>arg.-var.</i> . . . . .                 |                 |                 | S 30.—          |                   |                    |
| „ „ <i>aurea</i> . . . . .                     |                 | S 25.—          |                 |                   |                    |
| „ „ <i>darleyensis</i> . . . . .               | S 15.—          |                 |                 |                   |                    |
| „ „ <i>erecta glauca</i> . . . . .             |                 |                 | S 30.—          |                   |                    |
| „ „ <i>glauca</i> . . . . .                    |                 |                 |                 | G 30.—            |                    |
| „ „ <i>Silver Queen</i> . . . . .              | S 15.—          | S 20.—          |                 |                   |                    |
| „ „ <i>versicolor</i> . . . . .                |                 | S 25.—          | S 35.—          |                   |                    |
| „ „ <i>Westermanni</i> . . . . .               |                 | S 25.—          | G 25.—          |                   |                    |
| „ <i>obtusa lycopodioides</i> . . . . .        | G 10.—          |                 |                 |                   |                    |
| „ <i>pisifera</i> . . . . .                    |                 | S 15.—          | S 25.—          | S 35.—            | S 40.—             |
| „ „ <i>aurea</i> . . . . .                     | S 18.—          |                 |                 |                   |                    |
| „ „ <i>filifera</i> . . . . .                  | S 20.—          | S 25.—          | S 35.—          |                   |                    |
| „ „ <i>plumosa</i> . . . . .                   | S 12.—          | S 18.—          | S 25.—          | G 30.—            | G 40.—             |
| „ „ „ <i>aurea</i> . . . . .                   | S 14.—          | S 20.—          | S 25.—          | G 35.—            | G 45.—             |
| „ „ „ <i>squarrosa</i> . . . . .               |                 | G 18.—          | G 25.—          | G 30.—            |                    |
| <i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .          |                 |                 |                 | G 20.—            | G 30.—             |
| „ „ <i>elegans</i> . . . . .                   |                 | S 20.—          |                 |                   |                    |
| <i>Ginkgo biloba</i> . . . . .                 | S 12.—          | S 18.—          |                 |                   |                    |
| <i>Juniperus chinensis arg.-var.</i> . . . . . | G 15.—          | G 18.—          |                 |                   |                    |
| „ <i>virginiana</i> . . . . .                  | G 12.—          | G 15.—          | G 20.—          |                   |                    |
| „ „ <i>aurea elegans</i> . . . . .             |                 |                 | G 20.—          |                   |                    |
| „ „ <i>elegantissima</i> . . . . .             |                 |                 | S 30.—          |                   |                    |
| „ „ <i>tripartita</i> . . . . .                | S 20.—          |                 |                 |                   |                    |
| <i>Libocedrus decurrens</i> . . . . .          | S 20.—          | S 25.—          | S 30.—          | S 35.—            | S 40.—             |
| <i>Picea ajanensis</i> . . . . .               | S 25.—          | S 30.—          | G 35.—          | G 40.—            | G 50.—             |
| „ <i>alba coerulea</i> . . . . .               |                 | G 10.—          | G 15.—          |                   | G 30.—             |
| „ <i>Alcockiana</i> . . . . .                  |                 |                 | G 30.—          |                   |                    |
| „ <i>excelsa Clanbrasiliana</i> . . . . .      |                 | S 35.—          |                 |                   |                    |
| „ „ <i>erecta</i> . . . . .                    | S 12.—          | S 15.—          | S 25.—          |                   |                    |
| „ <i>excelsa inversa</i> . . . . .             | S 15.—          | S 18.—          | S 25.—          | S 30.—            |                    |
| „ <i>orientalis</i> . . . . .                  | S 15.—          | S 20.—          |                 |                   | G 40.—             |
| „ <i>pungens glauca</i> . . . . .              | S 50.—          | S 60.—          | S 80.—          | G 80.—<br>S 120.— | G 100.—<br>S 150.— |

|   | Höhe in cm      |                 |                   |                   |                 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | 200—220<br>à M. | 230—260<br>à M. | 270—300<br>à M.   | 310—350<br>à M.   | 360—400<br>à M. |
| <i>Picea pungens Kosterii</i> . . . . .   | S 55.—          | S 70.—          | G 75.—<br>S 100.— | G 85.—<br>S 120.— |                 |
| „ <i>sitkaënsis</i> . . . . .             |                 | G 12.—          |                   |                   |                 |
| <i>Pinus excelsa</i> . . . . .            |                 |                 |                   |                   | G 30.—          |
| „ <i>Laricio austriaca</i> . . . . .      |                 |                 |                   | G 25.—            |                 |
| „ <i>parviflora</i> . . . . .             |                 |                 | S 40.—            |                   |                 |
| „ <i>silvestris</i> . . . . .             |                 |                 | G 15.—            |                   |                 |
| <i>Pseudolarix Kaempferii</i> . . . . .   | S 12.—          | S 20.—          |                   |                   |                 |
| <i>Sequoia gigantea</i> . . . . .         |                 | S 40.—          |                   |                   | S 100.—         |
| <i>Taxus baccata</i> . . . . .            | S 25.—          |                 |                   |                   |                 |
| „ „ <i>Dovastoni</i> . . . . .            |                 |                 | S 40.—            |                   |                 |
| „ „ <i>erecta</i> . . . . .               | S 20.—          |                 |                   |                   |                 |
| „ „ <i>fastigiata</i> . . . . .           |                 | S 35.—          |                   |                   |                 |
| „ „ „ <i>aur.-var.</i> . . . . .          | S 25.—          |                 |                   |                   |                 |
| <i>Thuja gigantea aurescens</i> . . . . . |                 | S 16.—          | S 25.—            |                   |                 |
| „ „ <i>aur.-var.</i> . . . . .            | S 15.—          |                 | S 25.—            |                   |                 |
| „ <i>occidentalis</i> . . . . .           |                 | G 8.—           | G 15.—            |                   |                 |
| „ „ <i>aur.-var.</i> . . . . .            | S 10.—          | S 16.—          | S 25.—            |                   |                 |
| „ „ <i>Bodmeri</i> . . . . .              |                 |                 |                   | G 25.—            |                 |
| „ „ <i>Columbia</i> . . . . .             |                 | S 18.—          |                   |                   |                 |
| „ „ <i>Ellwangeriana</i> . . . . .        | S 12.—          | S 18.—          | S 25.—            |                   |                 |
| „ „ <i>Riversii</i> . . . . .             |                 | S 15.—          | S 20.—            |                   |                 |
| „ „ <i>Rosenthalii</i> . . . . .          |                 |                 | G 25.—            |                   |                 |
| „ „ <i>Vervaeneana</i> . . . . .          | S 12.—          | S 18.—          |                   |                   |                 |
| „ „ <i>Wareana globosa</i> . . . . .      |                 | G 20.—          |                   |                   |                 |
| „ „ „ <i>lutescens</i> . . . . .          | S 12.—          |                 |                   |                   |                 |
| „ <i>Standishi</i> . . . . .              |                 | G 10.—          | G 20.—            |                   |                 |
| <i>Tsuga canadensis</i> . . . . .         | S 10.—          | S 15.—          | S 20.—            |                   |                 |
| „ <i>diversifolia</i> . . . . .           | S 30.—          |                 |                   |                   |                 |





# Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen (mit Erdballen).



*Buxus sempervirens* (L.)

**Anmerkung:** Die mit \* bezeichneten Arten gedeihen am besten in Moorboden. In Ermangelung desselben empfiehlt es sich, der Pflanzerde bis zur Hälfte Torfmull beizumischen. Preis pro Ballen (1 Zentner) 2 Mark; größere Partien billiger.

**Andromeda** (Thbg.), *Andromeda*, siehe auch *Leucothoë*.

\* „ **aponica** (Thbg.), japanische A.; seltener, kleiner Strauch mit zierlicher, glänzendgrüner Belaubung und im Mai erscheinenden, weißen Blütenrispen . . . . .

**Aukuba** (Thbg.), *Aukube*.

\* „ **aponica** (Thbg.), japanische A., immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, großen, gelbgefleckten Blättern . . . . .

\* „ „ **viridis** (hort.), ähnlich der vorstehenden mit frischgrünen Blättern . . . . .

**Azalea** (L.), *Azalee*.

\* „ **mollis** siehe *Rhododendron sinense* . . . . .

\* „ **pontica** siehe *Rhododendron flavum* . . . . .

**Berberis** (L.), *Berberitze*, *Mahonie*.

„ **Aquifolium** (Pursh.), gemeine M., zierender, harter, immergrüner Strauch mit gelben Blütentrauben und blauen Beeren. Die Blätter färben sich im Herbst malerisch dunkelrot . . . . .

„ **japonica Bealei** (hort.), ähnlich der vorstehenden mit bedeutend größern, steiftacheligen, gelblichen Blättern und wohlriechenden Blütenglöckchen . . . . .

„ **Neubertii** (Lem.); Neuberts B., halbimmergrüner Strauch mit stark bewaffneten Blättern . . . . .

„ **rotundifolia** (Dipp.), ziemlich stark wachsend, mit immergrünen, runden Blättern . . . . .

**Buxus** (L.), *Buxbaum*.

„ **arborescens**, locker wachsende Art mit grünen und leicht gelb gerandeten Blättern . . . . .

„ **sempervirens** (L.), gemeiner B.; siehe Abbildung, bekannte Art, mit immergrünen, lederartigen, glänzenden Blättern. Vorzügliche Schattenpflanze, unempfindlich gegen Rauch und Staub; geschorene Pyramiden 50% teurer

„ „ **Hochstämme**, s. Abbild., Kronendurchmesser 35—40 cm .

„ „ „ „ 35—40 „ .

„ „ „ „ 35—40 „ .

„ „ „ „ 40 „ .

„ „ „ „ 40 „ .

„ „ „ „ 60 „ .

„ „ „ „ **extra starke**, je nach Höhe und Durchm. 15—25 M.

„ „ **Kugelformen** . . . . . ca. 20—30 cm breit

„ „ „ 30—40 „ „

„ „ „ 30—40 „ „

„ „ „ 40—50 „ „

„ „ „ 60—70 „ „

„ „ „ 70—80 „ „

„ „ „ 70—80 „ „

„ „ **geschnittene Figuren** je nach Form a 20.— bis 40.— M.

„ „ **arg.-marg.** (hort.), schöne Form mit weißbunter Belaubung

„ „ **aureo** (hort.), schwach wachsend mit goldgelben Blättern

„ „ **Kugelformen** . . . . . ca. 30—40 cm breit

| Höhe<br>cm | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|------------|---------------|--------------|
|            | 2.—           | 18.—         |
| 30—40      | 1.50          | 14.—         |
| 50—60      | 2.20          | 20.—         |
| 70—80      | 4.—           | 36.—         |
| 90—110     | 6.—           | 55.—         |
| 50—60      | 1.80          | 16.—         |
| 60—70      | 2.50          | 23.—         |
|            | 2.—           | 18.—         |
|            | 2.50          | 23.—         |
|            | 0.50          | 4.50         |
|            | 1.50          | 14.—         |
|            | 0.60          | 5.—          |
|            | 1.20          | 11.—         |
| 100—120    | 4.—           | 36.—         |
| 150—170    | 7.—           | 65.—         |
| 80—90      | 3.50          | 32.—         |
| 100—110    | 5.50          | 50.—         |
| 120—130    | 7.50          | 70.—         |
| 140—150    | 10.—          | 90.—         |
| 20—30      | 5.50          | 50.—         |
| 40—50      | 6.—           | 55.—         |
| 60—70      | 7.—           | 65.—         |
| 70—80      | 8.50          | 80.—         |
| 80—90      | 10.—          | 90.—         |
| 70—80      | 12.—          | 110.—        |
| 20—30      | 3.50          | 32.—         |
| 30—40      | 4.50          | 40.—         |
| 40—50      | 5.—           | 45.—         |
| 50—60      | 8.—           | 75.—         |
| 70—80      | 10.—          | 90.—         |
| 80—90      | 15.—          | 140.—        |
| 90—100     | 20.—          | 180.—        |
| 80—100     | 5.—           | 45.—         |
| 50—60      | 3.—           | 27.—         |
| 70—80      | 4.50          | 40.—         |
| 90—110     | 8.—           | 75.—         |
| 30—40      | 5.—           | 45.—         |





Osmanthus Aquifolium (S. & Z.)

Buxus

- „
 

sempervirens Handworthi (hort.), aufrecht wachsend mit gedrängt stehenden, großen Blättern . . . . .
- „
 

„ latifolia (hort.), Blätter groß und dickfleischig . . . . .
- „
 

„
 

var. suffruticosa (L.),
 Zwerg-B.; zu Einfassungen
 usw. geeignet. (Ein Gebund
 reicht für 3–5 m)

|                |         |
|----------------|---------|
| 1 Gebund . . . | 1.20 M. |
| 10 „ . . .     | 11.— „  |
| 100 „ . . .    | 100.— „ |
| 1000 „ . . .   | 900.— „ |

| Höhe<br>cm | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|------------|---------------|--------------|
| 90–100     | 4.50          | 40.—         |
| 110–130    | 7.—           | 65.—         |
| 140–160    | 12.—          | 110.—        |
| 90–100     | 4.50          | 40.—         |
| 110–130    | 7.—           | 65.—         |
| 140–160    | 12.—          | 110.—        |
| 200–220    | 20.—          | 180.—        |





|  | Höhe<br>cm   | 1 Stück<br>M.                              | 10 St.<br>M.                           |
|--|--|--|--|
| <b>Magnolia</b> (L.), Magnolie. Bekanntster Strauch mit großen, tulpenförmigen, schon vor den Blättern erscheinenden Blüten, welche in den verschiedensten Färbungen sehrzierend wirken.                                   |  |  |  |
| „ <b>Alexandrina</b> (hort.), Blume weiß mit zartrosa . . . . .  | 110—130<br>140—160<br>170—190<br>200—250                       | 4.—<br>6.—<br>10.—<br>15.—                 | 36.—<br>55.—<br>90.—<br>140.—          |
| „ <b>Lenneana</b> (hort.), langsam wachsende Form, Blume violett-rot .   | 100—120<br>130—150<br>180—220                                  | 4.50<br>6.50<br>15.—                       | 40.—<br>60.—<br>140.—                  |
| „ <b>obovata</b> (Thbg.), rotblühende M.; kleiner bis mittelhoher Busch mit fast roten Blüten . . . . .  | 80—100<br>100—120  | 5.—<br>6.50                                | 45.—<br>60.—                           |
| „ „ <b>amabilis</b> (hort.), Blüte weiß, in rahmgelb übergehend . .  | 80—100<br>120—140  | 4.—<br>6.—                                 | 36.—<br>55.—                           |
| „ <b>Soulangeana</b> (hort.), Blüte weiß mit rot verwaschen, äußerst dankbar blühend; bildet schöne Pyramiden . . . . .  | 110—130<br>140—160<br>170—190<br>200—220<br>230—250<br>260—320 | 4.—<br>5.50<br>8.—<br>12.—<br>20.—<br>25.— | 36.—<br>50.—<br>75.—<br>110.—<br>180.— |
| <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Magnolia Soulangeana nigra.</b>      <u>Selten!</u><br/> dunkelrot blühend, sehr großblumig, 70—90 cm M. 6.— </div>                           |  |  |  |
| „ <b>stellata fl. pl.</b> (hort.), prächtige, überreich blühende Zwergart mit reinweißen, sternförmigen, gefüllten Blumen. <u>Selten!</u> . . . . .  | 70—80  | 6.—  | 55.—                                   |
| <b>Mespilus</b> , siehe Pyracantha.  |  |  |  |
| <b>Osmanthus</b> (Lour.), Osmanthus.   |  |  |  |
| „ <b>Aquifolium</b> (S. & Z.); stechpalmenblättriger O.; schwach wachsender Strauch mit hülsenähnlichem Laub, sehr empfehlenswerte Schattenpflanze, siehe Abbildung . . . . .  | 80—90<br>100—110<br>120—140                                    | 3.50<br>4.50<br>6.—                        | 32.—<br>40.—<br>55.—                   |
| <b>Phillyrea</b> (L.), Steinlinde.   |  |  |  |
| * „ <b>Vilmoriniana</b> (Boiss. & Bal.), Vilmorins St. immergrüne, schwach wachsende, ziemlich harte Dekorationspflanze mit länglichen, glänzenden Blättern und kugelförmigem Wuchs . . . . .                              | 40—50<br>50—60<br>70—90  | 1.50<br>2.—<br>3.50                        | 14.—<br>18.—<br>32.—                   |
| <b>Phoebe</b> (Lindl.), Glanzmehlbeere.  |  |  |  |
| „ <b>glabra</b> (Maxm.) kahle G.; sparrigwachsender Strauch mit großen, gezähnten Blättern . . . . .   | 40—50<br>60—70   | 1.50<br>2.50                               | 14.—<br>23.—                           |
| <b>Pernetia</b> (Gaudich), Torfmyrte.  |  |  |  |
| * „ <b>mucronata</b> (Gaudich), stachelspitzige T.; kleiner, immergrüner, reich verzweigter Strauch mit scharfen Blättchen und weißen, glockenförmigen Blümchen. Für sonnigen Standort bei geschützter Lage . . . . .      |  | 2.—  | 18.—                                   |
| <b>Prunus</b> (L.), Kirschlorbeer.   |  |  |  |
| „ <b>Laurocerasus</b> (Tourn.), gemeiner K., herrlicher, immergrüner Strauch mit glänzenden, grünen Blättern; eignet sich besonders zur Zwischenpflanzung in Koniferengruppen und gedeiht vorzüglich im Schatten . . . . . | 50—60<br>70—90<br>100—120<br>130—150<br>160—180                | 1.50<br>2.—<br>3.—<br>4.—<br>6.—           | 14.—<br>18.—<br>27.—<br>36.—<br>55.—   |
| „ „ Kronenbäumchen . . . . . Stammhöhe   | 70—90  | 6.—  | 55.—                                   |
| „ „ <b>Schipkaensis</b> (Spth.), Blätter lanzettförmig, dunkelgrün . .   | 50—60<br>80—100  | 3.—<br>4.50                                | 27.—<br>40.—                           |
| „ <b>lusitanica</b> (L.), portugiesischer K.; mit schwärzlich grünen, lorbeerähnlichen Blättern . . . . .  | 80—100<br>110—130<br>140—160<br>170—190                        | 3.—<br>4.50<br>6.—<br>10.—                 | 27.—<br>40.—<br>55.—<br>90.—           |
| „ Büsche wildgewachsen . . . . .   | 40—50<br>60—80<br>90—110                                       | 1.50<br>2.50<br>3.50                       | 14.—<br>23.—<br>32.—                   |

**Pyracantha** (Roem.), Feuerdorn

„ **coccinea** (Roem.), [Cotoneaster Pyracantha, Spach., Mespilus Pyracantha, Poir.], gemeiner F.; immergrüner, dorniger Strauch mit weißen Blütenrispen, sehrzierend durch die leuchtendroten Beeren . . . . . in Töpfen

1.50 14.—

**Rhododendron** (L. & G.-Don.), Alpenrose, Azalee

„ **canadense** (Zab.), kanadische Felsenrose. Blüht im April vor dem Erscheinen der Blätter violettrosa . . . . .

2.— 18.—

„ **catawbiense** (Mchx.), Catawba-A.; kräftig wachsende Art mit schönen, dunkelgrünen Blättern; in großen Dolden lilablühend, winterhart . . . . .

2.— 18.—

stärkere

2.80 25.—

extra starke

5.— 45.—

„ **Cunninghami** (hort.), gedrunen, wachsender Strauch mit glänzend grünen Blättern, Blüten locker stehend, leicht rosa . . . . .

2.30 20.—

stärkere

2.50 28.—

extra starke

3.— 45.—

„ **ferrugineum** (A.), rostfarbige A., klein bleibender Strauch mit dicken, lederartigen Blättern, Dolde vielblütig, rosa bis rot . . . .

2.50 23.—

„ **flavum** (C.-Don.) [Azalea dontica L.], pontische Azalee. Blüten einfach und gefüllt in reichhaltiger Farbmischung. Sorten mit Namen . . . . .

2.50 20.—

„ **hybridum**, veredelte Alpenrosen in prachtvollen Sorten und verschiedener Farbmischung von weiß, rosa bis dunkelrot. Diese herrlichen Varietäten bilden einen schönen Schmuck unserer Anlagen und können überall Verwendung finden, sowohl als Einzel-, wie auch als Gruppenpflanzen . . . . .

schwächere  
stärkere  
extra starke

2.50 23.—

3.— 27.—

6.— 55.—

„ **Jacksoni** (hort.), niedriger, gedrunen wachsender Strauch mit unterseits braunen Blättern und leicht rosafarbenen Blüten im Mai

2.50 23.—

„ **myrtifolium** (Sch. & K.), myrtenblättrige A., blüht im Juli in kleinen, rosafarbenen, dichtgedrängten Dolden . . . . .

2.50 23.—

„ **ponticum** (L.), pontische A., kräftig wachsender Strauch mit glänzenden, lederartigen Blättern und blauen Blütendolden . . . .

schwächere  
stärkere  
extra starke

2.— 18.—

2.50 23.—

5.— 45.—

„ **praecox** (Carr.), frühblühende A.; hübscher, gedrunener Strauch mit hellgrünen, ca. 4 cm langen Blättern und bläulich karminfarbenen, trichterförmigen Blüten im März-April . . . . .

2.50 23.—

„ **sinense** (Sweet) [Azalea mollis, Bl.], beliebt durch ihre ansehnlichen, goldgelben bis orange- oder fleischroten Blumen, sehr reichblühend . . . . .

2.— 18.—







*Acer platanoides globosum* (Nich.)



# AUBHÖLZER

Zusammengestellt nach der neuesten Laubholz-Benennung von  
**L. Beissner**, Kgl. Garteninspektor in Bonn-Poppelsdorf,  
**E. Schelle**, Kgl. Universitätsgärtner in Tübingen und  
**H. Zabel**, Kgl. Gartenmeister a. D. in Gotha. :: ::

## Preise für Sträucher bzw. Pyramiden nach unserer Wahl:

|  | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. | 1000 St.<br>M. |
|--|--------------|---------------|----------------|
| Ziersträucher, 3—4 jährig . . . . .                                    | 3.50         | 30.—          | 275.—          |
| Vorsträucher und bessere Ziersträucher . . . . .                       | 4.50         | 40.—          | 350.—          |
| Ziersträucher, einschließlich buntblättriger und Veredlungen . . . . . | 6.50         | 60.—          | 550.—          |
| Starke Sträucher, 150—200 cm hoch . . . . .                            | 5.50         | 50.—          | 450.—          |
| Baumartige Gehölze, 200—300 cm hoch . . . . .                          | 7.50         | 70.—          | 650.—          |

Allee- und Zierbäume . . . siehe Seite 109

Hängebäume . . . . . siehe Seite 122

Zierhalbstämme . . . . . " " 108

Schlingpflanzen . . . . . " " 125

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe<br>der Blätter               | Art und Zeit<br>der Blüte | Wuchs, erreichbare<br>Höhe; Bemerkungen                                | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|---|---------------------------|--|----------------------------|
| <b>Acanthopanax</b> (Dcne und Planch.) Stach.-Krautwurz                           |   |                           |  |                            |
| „ <b>pentaphyllum</b> (Marsh.),<br>fünfblättr. St., Japan . . .                   | fünffachlig, gefingert<br>glänzend grün     | —                         | aufrecht, stachelig,<br>1,50—2 m, für Gruppen                          | 0.70                       |
| „ <b>ricinifolium</b> (Dcne u. Pl.)<br>rizinusblättr. St., Japan                  | groß, fächerförmig                          | —                         | sehr stachelig, 2,50—3 m<br>Solitär                                    | 1.20                       |
| <b>Acer</b> (L.) Ahorn  |   |                           |  |                            |
| „ <b>campestre</b> (L.), Feld-A.,<br>Europa . . . . .                             | dreilappig, grün                            | —                         | sparrig. Rinde bei ält.<br>Zweig korkig, f. Schatt.<br>Hecken, Gruppen | 0.40                       |
| „ <b>colchicum</b> , siehe laetum.  |   |                           |  |                            |
| „ <b>dasycarpum</b> (Ehrh.),<br>Silb.-A., Südamerika                              | groß, unterseits<br>silberweiß              | —                         | stark, aufrecht, Holz<br>bräunlich, für Gruppen                        | 0.60                       |
| „ „ <b>Wieri</b> siehe Trauer-<br>bäume   |   |                           |  |                            |
| „ <b>Ginnala</b> (Max.), asiat. A.  | tief, dreilappig                            | —                         | feinzweigig, 1,50—2 m,<br>für Gruppen                                  | 0.60                       |
| „ <b>laetum rubrum</b> (Kirch.)<br>Südeuropa . . . . .                            | dunkelrot                                   | —                         | mittelstark, Holz eigen-<br>artig neßähn. überzog.                     | 0.70                       |
| „ „ <b>viride</b> (Hesse)   | glänzend grün                               | —                         | do.  | 0.70                       |
| „ <b>monspessulanum</b> (L.),<br>dreil. A., Mitteleuropa,<br>Nordafrika . . . . . | lederartig,<br>dreilappig                   | —                         | sparrig, mittelhoch,<br>für Gruppen                                    | 0.70                       |
| „ <b>Negundo</b> (L.), Eschen A.<br>Florida . . . . .                             | grün, fünfteil., regel-<br>mäßig dreilappig | —                         | mittelst., aufrecht, jung.<br>Holz glänzend grün,<br>für Gruppen       | 0.40                       |
| „ „ <b>arg.-var.</b> (Bon.) .   | weißbunt                                    | —                         | für Gruppen u. Solitär   | 1.—                        |
| „ „ <b>aur.-var.</b> (Kirch.) .   | gelbbunt                                    | —                         | do.  | 1.—                        |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei  
Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter                               | Art und Zeit der Blüte                     | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen  | Sträucher 1 Stück M. |
|--|--|--|---|----------------------|
| <b>Acer Negundo Odessanum</b> (Th. Rothe) . . . . .                                | goldgelb, Blattstiele und Zweigspitz. rot                | —  | mittelstark, f. Gruppen   | 1.—                  |
| „ <b>palmatum</b> (Thbg.) Fäch.-A., Japan . . . . .                                | fünf- bis siebenlap., anfangs schön rötlich, später grün | —  | bis 2 m hoch, feinzweig., zum Teil häng., für Gruppen                           | 0.80                 |
| „ <b>atropurpureum</b> (v. Htte.) . . . . .  | dunkelrot  | —  | schwach, Solitär u. für Gruppen, sehr effektiv. (in Töpfen)                     | 2.50                 |
| „ <b>pennsylvanicum</b> (L.), Pennsylvan.-A., Kanada .                             | rund, gezähnt, grün                                      | —  | mittelst., Rinde auffall. weiß gestreift, f. Grupp.                             | 1.—                  |
| „ <b>pictum</b> (Thbg.), mand-schurisch.-A. . . . .                                | hautartig, grün, junge Triebe rot, meist siebenlappig    | —  | mittelhoch, f. Gruppen  | 0.60                 |
| „ <b>platanoides</b> (L.), Spitz-A. Europa . . . . .                               | glänzend grün  | —  | stark, für Gruppen  | 0.40                 |
| „ „ <b>globosum</b> (Nich.), Kugel-A. . . . .<br>siehe Abbildung                   | glänzend grün  | —  | gedrungen, pyramidal, sehr effektiv. als Solitär breite Pyramiden ca. 3 cm hoch | 5.—                  |
| „ „ <b>Reitenbachii</b> (Nich.) .  | bräunlich-rot, groß                                      | —  | stark, für Gruppen und Solitär  | 1.20                 |
| „ „ <b>Schwedleri</b> (C. Koch)  | junge Blätt. blutrot, später bräunl.-grün                | —  | stark   | 1.20                 |
| „ <b>Pseudoplatanus</b> (L.) Berg.-A., Mittel- und Südeuropa . . . . .             | groß, dunkelgrün abgestumpft                             | —  | stark, für Gruppen  | 0.40                 |
| „ „ <b>albo-var.</b> (Loud.) . .   | zierlich, weiß marmoriert                                | —  | mittelstark für Gruppen und Solitär   | 1.50                 |
| „ „ <b>atropurpureum</b> (Späth) . . . . .   | unterseits dunkelrot                                     | —  | stark   | 1.50                 |
| „ „ <b>Leopoldi</b> (Lem.) . .   | rot und weißbunt bes. junge Triebe                       | —  | mittelstark   | 1.50                 |
| „ „ <b>Worléei</b> (Ohlend.) .   | zuerst goldgelb später lichtgrün                         | —  | do.   | 1.50                 |
| „ <b>tataricum</b> (L.), tatar.-A.   | herzf., längl., grün                                     | —  | ziemlich hoch   | 0.50                 |
| <b>Aesculus</b> (L.), Roßkast., Pavia  |  |  |   |                      |
| „ <b>Hippocastanum</b> (L.), gemeine R. . . . .                                    | 5—7 teilig, grün   | große weiße Dolden, Mai-Juni               | stark, pyramidal, für Gruppen   | 0.40                 |
| „ „ <b>fl.-pl.</b> (hort.), gefüllt-blühende R. . . . .                            | 5—7 teilig, grün   | Dolden größer, schön gefüllt               | trägt keine Früchte, daher besond. wertvoll                                     | 1.50                 |
| „ <b>lutea</b> (Wgh.), [P. flava Mch.] gelbblühende P., Pennsylvanien . . . . .    | fächerförmig, zart gerippt, grün                         | gelbliche, ziemlich große Dolden, Mai-Juni | mittel, für Gruppen   | 1.50                 |
| „ <b>parviflora</b> (Walt.), [P. macrostachia D. C.], kleinblütige P., Nordamerika | zartgrün   | schöne, weiße Rispen, Juli-August          | unregelmäßig, für Gruppen   | 1.50                 |
| <b>Ailantus</b> (Desf.), Götterbaum  |  |  |   |                      |
| „ <b>glandulosa</b> (Desf.), echt. G., China, Japan . . . .                        | unpaarig gefiedert, grün, weich behaart, bis 1 m lang    | rispenförmig, grünlich-weiß, Juni          | stark, breitkronig für Gruppen in der Jugend empfindlich                        | 0.80                 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter             | Art und Zeit der Blüte              | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                             | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Akebia</b> siehe Schlingpflanz.  |  |                                     |  |                            |
| <b>Alnus</b> (Gärtn.), Erle . . .   |  |                                     |  |                            |
| „ <i>cordata</i> (Desf.), herzblättrige E., Kaukasus .                        | pergamentartig, glänzend grün          | —                                   | klein bis mittelhoch, für Gruppen, in der Jug. frostempfindlich  | 0.60                       |
| „ <i>glutinosa</i> (Gärtn.), Schwarz-E., Europa                               | rundlich, gezähnt, grün                | —                                   | stark, Holz klebrig, für feuchte Stellen                         | 0.40                       |
| „ „ <i>laciniata imperialis</i> (Desf.) . . . . .                             | ungl. geschl. grün                     | —                                   | mittel, für Gruppen  | 0.80                       |
| „ <i>incana</i> (Willd.), Weiß-E. Europa . . . . .                            | eiförmig, graugrün, behaart            | —                                   | stark, für Gruppen an feuchten Stellen                           | 0.40                       |
| „ „ <i>laciniata</i> (hort.) . .  | zierlich geschl. grün                  | —                                   | ziemlich stark, für Gruppen                                      | 0.80                       |
| <b>Amelanchier</b> (Med.), Felsenbirne  |  |                                     |  |                            |
| „ <i>alnifolia</i> (Nutt.), erlenblättrige F. . . . .                         | lederartig, rundlich, grün             | weiße Trauben, Ende Mai             | mittelstark, 3—4 m hoch  | 0.50                       |
| „ <i>Botryapium</i> (D.C.), länglichblättrige F. . .                          | graufilzig, behaart, später dunkelgrün | weiße Traub. 5-8 cm lang. April-Mai | breit, 4—6 m hoch, schön. Blütenstrauch                          | 0.50                       |
| „ <i>canadensis</i> (Med.), kanadische F. . . . .                             | rundlich, grün, schön rot im Herbst    | langtraubig, weiß, April-Mai        | stark, Zweige überhäng., Blütenstrauch                           | 0.60                       |
| „ <i>florida</i> (Lindl.), Oregon F. . . . .                                  | graufilzig, behaart, dunkelgrün        | weiße Trauben, April-Mai            | ca. 4—5 m hoch, Blütenstrauch                                    | 0.50                       |
| „ <i>oligocarpa</i> (Roem.), wenigfrüchtige F. . . .                          | lederartig, elliptisch grün            | gestielt zu 2 bis 4, weiß, April    | schwachwachsender Busch, bis 2 m hoch                            | 1.20                       |
| „ <i>ovalis</i> (Borkh.), ovalblättrige F. . . . .                            | lederartig, rundoval                   | weiße Trauben                       | aufrecht, 5—6 m hoch   | 0.60                       |
| „ <i>vulgaris</i> (Mnch.) gemeine F., Mitteleuropa . . . .                    | rundoval                               | weiße Trauben, April-Ma             | 1,50-2 m, Blütenstrauch  | 0.50                       |
| <b>Amorpha</b> (L.), Bastardindigo  |  |                                     |  |                            |
| „ <i>fruticosa</i> (L.), gemeiner B., Nordamerika . . .                       | gefiedert, grün                        | violettblau, Juli-August            | stark, unförmig, 2-3 m hoch, für Gruppen                         | 0.40                       |
| <b>Ampelopsis</b> s. Schlingpflanz.   |  |                                     |  |                            |
| <b>Amygdalus</b> (L.), Mandel, Pfirsich                                       |  |                                     |  |                            |
| „ <i>nana georgica</i> (Ser.), georgische Zwerg-M., Südeuropa, Asien . . .    | schmal, graugrün                       | rosarote Pfirsichblüten im Mai      | niedrig, bis 1 m hoch, Vorstrauch                                | 1.20                       |
| „ <i>Persica rosea</i> pl. (hort.) gefülltblühende Pf. .                      | hellgrün                               | groß, rosa, gefüllt, April-Mai      | zieml. stark, effektiv Gruppenstrauch                            | 1.40                       |
| „ „ <i>atropurpurea</i> (hort.)   | schmal, dunkelrot                      | einfach, rosa, April-Mai            | schwach, Zweige rot, empfehl. für Gruppen                        | 1.40                       |
| <b>Andromeda</b> siehe immergrüne Gehölze                                     |  |                                     |  |                            |
| <b>Aralia</b> (L.), Aralie  |  |                                     |  |                            |
| „ <i>chinensis</i> var. <i>mandschurica</i> (R. & M.), chinesische A. . . . . | gefiedert, bis 1 m lang, stachelig     | große, weiße Rispen, September      | unregelm. baumartig, Holz stark stachelig dekorat. Einzelpflanze | 1. —                       |
| <b>Aristolochia</b> s. Schlingpfl.  |  |                                     |  |                            |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter                                       | Art und Zeit der Blüte                     | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen  | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|--|--|---|----------------------------|
| <b>Aronia</b> (Pers.)Zwerg-Vogelb.                                     |  |  |   |                            |
| „ <b>floribunda</b> (Spach.) purpurfrüchtige Z., Nordamerika . . . . . | klein, gezähnt, grün im Herbst schön rot färbend                 | weiße Doldentraub. im Mai, Früchte weinrot | mittelhoch bis 2 m, für Gruppen   | 0.50                       |
| <b>Artemisia</b> (L.), Eberraute                                       |  |  |   |                            |
| „ <b>Abrotanum</b> (L.), gemeine E., Südeuropa . . . . .               | fast fadenförmig, fiederblättr., dunkelgrün, starkwürzig duftend | —  | 0,50-1 m hoch, buschig, Vorstrauch  | 0.40                       |
| <b>Aukuba</b> } siehe immer-   |  |  |   |                            |
| <b>Azalea</b> } grüne Gehölze  |  |  |   |                            |
| <b>Baccharis</b> (L.), Kreuzstrauch                                    |  |  |   |                            |
| „ <b>halimifolia</b> (L.), meldenblättr. K., Südamerika . .            | graugrün, schmal, länglich                                       | weiße Blütenköpfchen, September            | 1,50—2 m hoch, für Gruppen  | 0.40                       |
| <b>Berberis</b> (L.), Berberitze, Sauerdorn, Mahonie . .               |  |  | siehe auch immergrüne Gehölze   |                            |
| „ <b>Aquifolium</b> (Pursh.), gemeine M. . . . .                       | groß, lederartig, glänzend grün                                  | gelbe Trauben, Mai                         | 1m hoch, ausgezeichnet für Schatten u. Hecken                                       | 0.50                       |
| „ <b>buxifolia nana</b> (hort.), buxbaumblättr. B., Chile              | lederartig, dunkel, immergrün                                    | goldgelb, Mai auffallend,                  | bis 0,50 m hoch, Holz stachelig, Vorstrauch, für Hecken                             | 0.60                       |
| „ <b>concinna</b> (Hook.) niedliche B., Himalaja . . .                 | gekräuselt, oberseits frischgrün                                 | goldgelb                                   | niedrig bleibend, 30—40 cm  | 1.—                        |
| „ <b>Darwinii</b> (Hook.), Darwins S., Chile . . . . .                 | klein, glänzend lederartig                                       | goldgelb, Mai-Juni stark duftend           | bis 1 m hoch, dornig, Vorstrauch, bei starker Kälte zu schützen                     | 0.80                       |
| „ <b>japonica Bealei</b> } siehe immer-                                |  |  |   |                            |
| „ <b>Neubertii</b> } gr. Geh.  |  |  |   |                            |
| „ <b>spatulata</b> (Schräd.)   | länglich, schmal, wenig gezähnt                                  | goldgelbe Trauben                          | starkwachsend, ca. 2 m hoch   | 0.50                       |
| „ <b>stenophylla</b> (Mast), schmalblättr. B. . . . .                  | sehr klein, schmal, dunkelgrün                                   | goldgelb, Mai, sehr reichblühend           | ca. 1 m hoch, zierlich überhängende, dornige Zweige, empfehlensw. Vorstrauch        | 1.—                        |
| „ <b>Thunbergii</b> (D.C.), Thunbergs B., Japan . . . . .              | klein, grün, schön rote Herbstfärbung                            | bläßgelb, Mai-Juni                         | 0,50—1 m hoch, breit dornig, Vorstrauch   | 0.60                       |
| „ <b>vulgaris</b> (L.), gemeine B., Europa, Asien . . . .              | gezähnt, grün, im Herbst rötlich                                 | hellgelb, Mai-Juni später rote Beeren      | 1,50—2 m hoch, stark dornig, für Gruppen  | 0.40                       |
| „ „ <b>atropurpurea</b> (hort.)  | dunkelrot  | do.  | 1,50 m hoch, dornig, sehr beliebt f. Gruppen  | 0.50                       |
| <b>Betula</b> (L.), Birke  |  |  |   |                            |
| „ <b>alba</b> (L.), Weiß-B., Europa                                    | herzförmig, früh belaubt   | —  | stark, Zweige meist hängend, bei ältern Exemplar. weiße Rinde, für Gruppen, Solitär | 0.50                       |
| „ <b>excelsa</b> (Ait.), Hohe B. .                                     | breitherzförmig, dicht, weich behaart                            | —  | ziemlich hoher Baum, bräunlichweiße Rinde, für Gruppen                              | 0.80                       |
| „ <b>papyracea</b> (Ait.)Papier-B. Nordamerika . . . . .               | groß, grün   | —  | Rinde b. ältern Bäumen blend.weiß, starkwachs. für Gruppen, Solitär                 | 0.60                       |
| „ <b>verrucosa</b> (Ehrh.)Hänge-Weiß-B., Europa . .                    | herzförmig   | —  | stark, teils hängend, für Gruppen   | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter              | Art und Zeit der Blüte                            | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                               | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|---|---|--|----------------------------|
| <b>Betula</b>  |   |   |  |                            |
| „ <i>verrucosa elegans laciniata</i> (hort.) . . . .               | tief eingeschnitten                     | —   | schwach, etwas häng., sehrzierl. Solitärbaum                       | 1.50                       |
| „ „ <i>elegans Youngi</i><br>siehe Trauerbäume                     |   |   |  |                            |
| „ „ <i>fastigiata</i> (hort.) . .                                  | grün, gleich der Art                    | —   | pyramidal, für regelmäßige Gärten                                  | 2.50                       |
| <b>Bignonia</b> siehe <i>Tecoma</i><br>unter Schlingpflanzen       |   |   |  |                            |
| <b>Broussonetia</b> (Vent.), Papier-Maulbeerbaum                   |   |   |  |                            |
| „ <i>papyrifera</i> (Vent.), echter P., China, Japan . . . .       | groß, sehr verschiedenartig gelappt     | —   | hoher Strauch, Zweige hellgrau behaart, für Gruppen                | 0.50                       |
| <b>Buddleia</b> (L.) <i>Buddleia</i>                               |   |   |  |                            |
| „ <i>Hemsleyana</i> (Koehne) .                                     | breitlanzettlich, filzig, grün          | bläulilafarb. Blütenähren, Juni-August            | breiter Busch 2—2½ m hoch  | 0.70                       |
| „ <i>japonica</i> (Hemsl.), japanische B. . . . .                  | lanzettförmig                           | lange, lilafarbene Blütenrispen, Juni bis Sept.   | mittelstark, korkige Rinde, für Gruppen                            | 0.50                       |
| „ <i>variabilis</i> (Hemsl.), veränderliche B. . . . .             | lanzettförmig, filzig                   | wie vorstehende                                   | stark  | 0.70                       |
| <b>Buxus</b> s. immergr. Gehölze                                   |   |   |  |                            |
| <b>Calycanthus</b> (L.), Gewürzstrauch                             |   |   |  |                            |
| „ <i>floridus</i> (L.), wohlriechender G., Südamerika . .          | oval, zugespitzt, frischgrün            | braun, erdbeerartig duftend, Juni-Juli            | 1—1,50 m, empfehlenswerter Zierstrauch                             | 0.60                       |
| <b>Caragana</b> (Lam.), Erbsenstrauch                              |   |   |  |                            |
| „ <i>arborescens</i> (Lam.) baumartiger E., Sibirien               | 4—5 paarige, schön frischgrüne Blättch. | gelb, Mai   | 4—5 m, leicht dornige Zweige, für Gruppen                          | 0.40                       |
| „ „ <i>pendula</i> s. Trauerb.                                     |   |   |  |                            |
| „ <i>Chamlagu</i> (Lam.), chinesischer E. . . . .                  | oval, verkehrt eiförmig, grün           | trüb gelb, nach dem Aufblühen bräunlich-rot, Juni | dorniger Strauch, überhängende dünne Zweige, 1—1,50 m hoch         | 1.—                        |
| „ <i>jubata</i> (Poir.), mähenartiger E., Sibirien . . .           | dichtstehend, zottig behaart            | rötlich-weiß, April-Mai                           | 1—1,50 m, buschig, dicht behaarte, br. Zweige, eigenartig; Solitär | siehe Halbst.              |
| „ <i>microphylla</i> (Lam.) kleinblättr. E., Sibirien . . .        | paarig gefiedert, klein                 | hellgelb, Mai, sehr reichblühend                  | niedrig, überhängend, Vorstrauch                                   | 1.—                        |
| „ <i>pygmaea arenaria</i> (Dipp.)                                  | schmal, grün                            | braungelb, im Mai                                 | aufrecht, schwach  | siehe Halbst.              |
| „ <i>spinosa</i> (D. C.), dorniger E., Sibirien . . . . .          | grün, länglich, dichtstehend            | hellgelb, Mai                                     | ca. 1 m hoch, stark dornig, Vorstrauch                             | 1.—                        |
| <b>Carpinus</b> (L.), Hainbuche                                    |   |   |  |                            |
| „ <i>Betulus</i> (L.), gemeine H. Europa<br>s. auch Heckenpflanzen | herzförmig, ungleich gesägt             |   | hoch, vorzügl. Unterholz, eine der besten Heckenpflanzen           | 0.40                       |
| „ „ <i>fastigiata</i> (hort.) . .                                  | do.                                     |   | pyramidal, für Schatten u. regelmäßige Gärten                      | 2.50                       |
|  |   |   | schwächere   | 1.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                                      | Art und Zeit der Blüte                                       | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen   | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|---|--|--|----------------------------|
| <b>Carpinus</b>   |   |  |  |                            |
| „ <i>Betulus pendula</i> (hort.)                              | wie die gewöhnliche Weißbuche                                   |  | Zweigspitz. leicht überhängend, Pyramiden 2—2½ m hoch                          | 1.80                       |
| <b>Carya</b> (Nutt.), Bitternuß                               |   |  |  |                            |
| „ <i>amara</i> (Nutt.), bittere B., Amerika . . . . .         | lang gefiedert  |  | stark, breitkronig, für größere Gruppen, Blätter leiden leicht von Nachfrösten | 1.50                       |
| <b>Caryopteris</b> (Bge.), Bartblume                          |   |  |  |                            |
| „ <i>Mastacanthus</i> (Schauer) chinesische B. . . . .        | hellgrün, behaart, länglich                                     | Blütendolden blau, wohlriech. Juli-Sept.                     | ½ m hoch, empfehlenswerter Herbstblüher, Vorstrauch                            | 0.50                       |
| <b>Castanea</b> (Mill.), Kastanie                             |   |  |  |                            |
| „ <i>vesca</i> (Gärtin.), Edel-K., Südeuropa . . . . .        | grün, groß, gleichmäßig gezähnt                                 | Frucht genießbar   | ziemlich stark, in der Jugend empfindlich                                      | 1.—                        |
| „ „ <i>arg.-var.</i> (hort.) . .                              | weißbunt  |  | schwach  | 1.50                       |
| „ „ <i>heterophylla</i> (hort.)                               | grün, teils fadenförmig, teils unregelmäßig tief eingeschnitten |  | schwach, Solitär   | 2.50                       |
| <b>Catalpa</b> (Scop.), Trompetenbaum                         |   |  |  |                            |
| „ <i>bignonioides</i> (Walt.), gemeiner T., Nordamerika       | grün, sehr groß, herzförmig                                     | sehr große Rispen, weißl., innen gelb gefleckt u. rot punkt. | stark, für Gruppen   | 0.50                       |
| „ „ <i>aurea</i> (hort.) . . . .                              | goldgelb, groß, herzförmig                                      |  | kleinkronig, gelb. Holz, für Gruppen, Solitär                                  | 1.20                       |
| „ <i>hybr. atropurpurea</i> (hort.) . . . . .                 | groß, herzförmig, schwärzlichrot                                |  | ziemlich stark, Solitär  | 1.50                       |
| „ <i>Kaempferi</i> (S. & Z.), japanischer T. . . . .          | grün, herzförmig bis dreilappig                                 | grünl. weiße Rispen, Juni                                    | i.d. Jugend starkwachs., für Gruppen   | 0.50                       |
| „ <i>speciosa</i> (Ward.) prächtig. T., Nordamerika . . . . . | do.   | große, grünl. weiße Rispen, Juni                             | stark, für Gruppen   | 0.60                       |
| <b>Ceanothus</b> (L.), Säckelblume                            |   |  |  |                            |
| „ <i>americanus</i> (L.), gemeine S., Kanada . . . . .        | grün, eiförmig  | weiße, lockere Rispen, Juli-Sept.                            | ca. 1 m, buschiger Vorstrauch  | 0.80                       |
| „ <i>hybr. „Marie Simon“</i> (S. L. frères) . . . . .         | do.   | hell, rosafarbig, Juli-Sept.                                 | do.  | 0.80                       |
| „ <i>hybr. roseus</i> (hort.) . .                             | grün, zierlich  | rosa, Juli-Sept.   | do.  | 0.80                       |
| „ <i>maximus</i> , „Gloire de Versailles“ (S. L. frères) . .  | grün, fein gezähnt, ziemlich groß                               | himmelblaue, große Rispen, Juli-Sept.                        | 1 m, sparrig, Vorstrauch gut für Binderei; bei starker Kälte z. schützen       | 1.50                       |
| <b>Celtis</b> (L.), Zürgelbaum                                |   |  |  |                            |
| „ <i>occidentalis</i> (L.), nord-amerikanischer Z. . . . .    | grün, lanzettförmig   | —  | mittelstark überhäng. für Gruppen  | 1.—                        |
| <b>Cephalanthus</b> (L.), Knopfb-lume                         |   |  |  |                            |
| „ <i>occidentalis</i> (L.) gemeine K., Amerika . . . . .      | glänzend grün, länglich oval                                    | schöne, weiße, langgestielte Blütenköpfchen, Juli-Aug.       | kompakt, bis 1,50 m, für Gruppen   | 0.60                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                                    | Art und Zeit der Blüte  | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen  | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|---|---|---|----------------------------|
| <b>Cercidiphyllum</b> (S. u. Z.)<br>Judasbaumblatt                |   |   |   |                            |
| „ <b>japonicum</b> (S. u. Z.),<br>japanisches J. . . . .          | rund bis rund oval,<br>beim Austreiben<br>braunrot, spät grün | —   | ziemlich stark, pyrami-<br>dal, für Gruppen   | 0.80                       |
| <b>Cercis</b> (L.), Judasbaum                                     |   |   |   |                            |
| „ <b>Siliquastrum</b> (L.) europ. J.                              | breit rundlich, grün  | violettrosa Trauben<br>April-Mai                                | mittelhoch, f. Gruppen,<br>frostepfänglich  | 1.—                        |
| <b>Chaenomeles</b> (Lindl.),<br>Scheinquitte                      |   |   |   |                            |
| „ <b>japonica</b> (Lindl.),<br>japanische Sch. . . . .            | glänzend grün   | feuerrot, Mai   | klein bis mittelhoch,<br>dornig und sparrig,<br>empfehlenswerter<br>Blütenstr., eignet sich<br>für Hecken | 0.40                       |
| „ „ <b>Sorten mit Namen</b> .                                     | do.   | weiß, gelb, dunkel-<br>rot, teils gefüllt, Mai                  | do.   | 0.70                       |
| „ <b>Maulei</b> (Laval.) . . . .                                  | do.   | zinnoberrot   | do.   | 0.50                       |
| <b>Chionanthus</b> (L.), Schnee-<br>blume                         |   |   |   |                            |
| „ <b>virginica</b> (L.), virginische<br>Sch. . . . .              | oval, glänzend grün   | weiße Rispen, Juni  | mittelhoch, für Gruppen<br>Solitär  | 1.—                        |
| <b>Citrus</b> (L.), Zitrone                                       |   |   |   |                            |
| „ <b>trifoliata</b> (L.), drei-<br>blättrige Z., apan .           | hellgrün  | weiß, Mai-Juni, die<br>Frucht reift hier<br>nicht               | niedrig, sparrig und<br>dornig, Vorstrauch,<br>verlangt Winterschutz                                      | 2.50                       |
| <b>Cladrastis</b> (Rafin.), Gelbholz                              |   |   |   |                            |
| „ <b>lutea</b> (K. Koch) (Virgilia<br>lutea, Mchx.), amerikan. G. | hellgrün gefiedert  | weiße Blüten-<br>trauben, Juni                                  | stark, für Gruppen  | 0.80                       |
| <b>Clematis</b> siehe Schling-<br>pflanzen und Stauden            |   |   |   |                            |
| <b>Clethra</b> (L.), Clethra                                      |   |   |   |                            |
| „ <b>alnifolia</b> (L.) erlenblättrige<br>C., Nordamerika         | grün, fein gezähnt  | weiße, 10—15 cm<br>lange Rispen,<br>August-Sept.                | schwach, ca. 1 m hoch,<br>Vorstrauch f. Schatten  | 0.50                       |
| <b>Colutea</b> (L.), Blasenhülle                                  |   |   |   |                            |
| „ <b>arborescens</b> (L.), baum-<br>artige B., Mitteleuropa .     | grün, fein gefiedert  | goldgelb, Mai-Sept.<br>Fruchthülse, eigen-<br>artig aufgeblasen | 2—3 m hoch,<br>für Gruppen  | 0.40                       |
| „ <b>orientalis</b> (Mill.), rot-<br>blühende B., Südeuropa .     | graugrün  | braunrot, Mai-Sept.   | mittelstark,<br>für Gruppen   | 0.60                       |
| <b>Cornus</b> (L.), Hartriegel,<br>Kornelkirsche, Benthämie       |   |   |   |                            |
| „ <b>alba</b> (Wngh.), weißer H.                                  | grün, unterseits<br>silberig                                  | weiße Kopfblüte,<br>Mai-Juni, Beeren<br>bläulich weiß           | mittelst., Holz rotbraun,<br>für Gruppen, Schatten  | 0.40                       |
| „ „ <b>arg.-var.</b> (hort.) . .                                  | weißbunt  | do.   | mittelst., Holz rotbraun,<br>für Gruppen, Solitär   | 0.80                       |
| „ „ <b>flaviramea</b> (Späth) .                                   | graugrün  | do.   | mittelstark, besonders<br>interessant undzierend<br>durch die hellgelben<br>Zweige im Winter              | 0.60                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter           | Art und Zeit der Blüte                          | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                                  | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| <b>Cornus</b>   |                                      |   |   |                            |
| " <b>alba</b> Späthi (Wittm.) . .                             | gelb gerandet bis goldgelb           | weiße Kopfblüte, Mai-Juni, Beeren bläulich weiß | schwach. Vorstrauch, Solitär  | 1.—                        |
| " <b>alternifolia</b> (L.), wechselblättrige H. . . . .       | rundlich grün                        | große weiße Scheindolde, Juni                   | mittelstark, Holz bräunlich, hängend, für Gruppen, Schatten           | 0.50                       |
| " <b>Baileyi</b> (Coul. u. Evans), Bailey's H., Nordamerika   | grün, wollig behaart                 | weiße Kopfblüte, Mai Beeren bläulich weiß       | stark, für Gruppen, Schatten  | 0.60                       |
| " <b>femina</b> (Mill.), steifästiger H., Virginien . . . . . | länglich, grün                       | weiß, Mai-Aug.                                  | 2—3 m hoch, Holz braungelb, f. Gruppen, Schatten                      | 0.80                       |
| " <b>florida</b> (L.), Blumen B., Neu-England . . . . .       | grün, wellig, auffall. rote Herbstf. | weißrötlich, sternf. bis 6 cm groß              | mittelhoch, Holz braunrot, f. Gruppen, Schatten                       | 0.60                       |
| " " <b>fl. rubro</b> (hort.) . .                              | do.                                  | rot, sternförmig                                | mittelhoch, Holz braunrot, Solitär, neuere Sorte empfehlenswert       | 1.20                       |
| " <b>glabrata</b> (Benth.), kahler H., Oregon . . . . .       | grün                                 | weiß, Juni, Beeren bläulich-weiß                | mittelstark, feinzweigig, für Gruppen, Schatten                       | 0.50                       |
| " <b>mas</b> (L.), gemeine K., Europa, Orient . . . . .       | hellgrün                             | hellgelb, März-April Frucht rot, genießb.       | stark, sparr., f. Gruppen empfehlensw. f. Lauben, Hecken und Schatten | 0.50                       |
| " <b>paniculata</b> (L. Hér.), rispenblütiger H., Kanada      | lanzettförmig, grün                  | weiß, Juli                                      | mittelhoch, feinzweig., f. Grupp., Schatt., empfehlenswert für Hecken | 0.45                       |
| " <b>pubescens</b> (Nutt.), weichhaariger H., Oregon . .      | langgestielt, weichhaarig            | mittelgroße, weiße Scheindolden, Juni           | bis 2 m hoch, Holz rötlichbraun, f. Gruppen Schatten                  | 0.50                       |
| " <b>Purpusi</b> (Koehne), Purpusscher H., Ohio . .           | ziemlich groß                        | weiß, Juli                                      | stark, für Gruppen, Schatten  | 0.50                       |
| " <b>sanguinea</b> (L.), gemeiner H., Europa, Orient          | eiförmig, grün                       | weiße Dolden, Juni, Beeren schwarz              | stark, Zweige im Winter rot, für Gruppen, empfehlenswert. Unterholz   | 0.40                       |
| " " <b>arg.-var.</b> (hort.) .                                | weißbunt                             | do.   | do. für Gruppen   | 0.60                       |
| " <b>sericea</b> (L.), seidenhaar. H., Texas . . . . .        | grün                                 | weiße Scheindolden Beeren blaugrau              | mittelstark, f. Gruppen, Schatten                                     | 0.45                       |
| " <b>tatarica</b> (Mill.), tatarisch. H., Sibirien . . . . .  | ziemlich groß, eiförmig behaart      | weiße Dolden, April-Mai                         | ca. 2 m hoch, Zweige braunrot   | 0.40                       |
| " " <b>var. sibirica</b> (Lodd.)                              | groß, oval, grün                     | weiße Dolden, Beeren hellblau                   | mittelst., Holz korallenrot, f. Gruppen, Schatten                     | 0.45                       |
| " " <b>var. sibirica arg.-marg.</b> (hort.) . . . . .         | weißbunt                             | do.   | mittelstark, für Gruppen  | 0.60                       |
| <b>Coronilla</b> (L.), Kronwicke                              |                                      |   |   |                            |
| " <b>Emerus</b> (L.), Kronwickenstrauch, Mitteleuropa .       | grün, feingefiedert                  | hellgelb, Mai-Juli                              | niedrig, Vorstrauch   | 0.60                       |
| <b>Corylus</b> (L.), Hasel, Europa                            |                                      |   |   |                            |
| " <b>Avellana</b> (L.), Wald-H.                               | grün                                 | Frucht genießbar                                | s.a. Obst- u. Alleebäume stark, f. Gruppen, Schatt.                   | 0.40                       |
| " " <b>laciniata</b> (hort.) .                                | zierl. geschl., grün                 | —   | mittelstark, für Gruppen  | 0.80                       |
| " " <b>pendula</b> s. Trauerbäume . . . . .                   |                                      |   |   |                            |

Der Preis ermäßigt sich um 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> bei Abnahme von 10, um 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub> bei Abnahme von 100, um 30<sup>0</sup>/<sub>0</sub> bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter               | Art und Zeit der Blüte                                     | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen   | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|--|--|--|----------------------------|
| <b>Corylus</b>  |  |  |  |                            |
| „ <b>Columna</b> (L.), Baum-H., Südeuropa . . . . .                                   | groß, gezähnt, hellgrün                  | im Alter sehr reichtragend                                 | stark, weißgraue, korkige Rinde, für Gruppen   | 0.60                       |
| „ <b>maxima</b> siehe Obst  |  |  |  |                            |
| „ „ <b>afropurpurea</b> (Dochn.) . . . . .  | groß, dunkelrot                          | großfrüchtig   | mittelstark, für Gruppen Solitär   | 0.75                       |
| <b>Cotoneaster</b> (Med.), Zwergmispel  |  |  |  |                            |
| „ <b>acutifolia</b> (Lindl.), spitzblättr. Z., Dahurien . .                           | klein, glänzend dunkelgrün               | rötl.-weiß, Mai-Juni, Frucht schwarz                       | zieml. hochwachsend, für Gruppen, Schatten empf. für Hecken                            | 0.40                       |
| „ <b>bullata</b> (Bois.) . . . .  | klein, rundlich, aufgeblasen             | Früchte lebhaft rot  | aufrecht wachsend Selten!  | 1.—                        |
| „ <b>disticha</b> (Lange), zweizeilige Z., Himalaja . .                               | kleine Blättchen, im Herbst schön rot    | rötl.-weiß, Mai-Juni, Frucht hellrot                       | schwach, Vorstrauch  | 0.70                       |
| „ <b>Francheti</b> (Bois.) . . .  | Blätter spitz, Zweige filzig             | Blüten rosa, Früchte orangerot                             | bis 1,50 m hoch, überhängend   | 1.—                        |
| „ <b>frigida</b> (Wall.) Hochgebirgs Z., Himalaja . .                                 | grün, obers. dunkel, unterseits behaart  | rötl.weiß, Juni  | mittlst. für Gruppen   | 0.50                       |
| „ <b>horizontalis</b> (Dcne.), wagerechte Z., China .                                 | dunkelgrün, im Herbst rotfärbend         | rosa, Mai-Juni, bes. maler. rote Früchte                   | auf dem Boden liegend sehr gut für Felsen  | 0.70                       |
| „ <b>microphylla</b> (Wall.), kleinblättr. Z., Himalaja                               | sehr klein, grün, lederart.fast immergr. | weiß, Mai-Juni   | do.  | 0.70                       |
| „ <b>nigra laxiflora</b> (Jacq.),   | graugrün                                 | rötl.-weiß, Mai-Juni, Früchte schwarz                      | mittelstark, für Gruppen, Schatten   | 0.45                       |
| „ <b>Pyracantha</b> siehe immergrüne Gehölze  |  |  |  |                            |
| „ <b>Simonsii</b> (hort.) Simons Z., Himalaja . . . . .                               | halbimmergrün                            | rosaweiß, Mai-Juni Früchte mennigrot                       | mittelstark, Gruppen Hecken  | 0.40                       |
| <b>Crataegus</b> (L.), Weißdorn   |  |  |  |                            |
| „ <b>Azarolus</b> (L.), Azaroldorn, Nordafrika . . .                                  | eiförmig, grün                           | weiße Doldentraub. Mai, Frucht groß, beerenf., rötlichgelb | mittelstark, für Gruppen   | 0.80                       |
| „ <b>Carrièrei</b> (Vauvel) Carr. W., Südl. Nordamerika .                             | glänzend grün                            | weiß, ziemlich große Trauben, Frucht gelbbrot, punktiert   | stark, für Gruppen   | 0.80                       |
| „ <b>coccinea</b> (L.), scharlachfrucht. W., Nordamerika                              | breit, eiförmig, grün                    | weiße große Doldentraub., Fr. scharlachrot                 | mittelstark, f. Gruppen Vogelschutzanlage  | 0.60                       |
| „ <b>Crus galli</b> (L.), Hahnenorn, Nordamerika . .                                  | grün, lanzettförmig                      | weiße Doldentraub., Früchte ziegelrot                      | mittelstark, sehr dornig für Gruppen   | 0.70                       |
| „ <b>monogyna</b> (Jacq.) gemeiner einweib. W., Europa, siehe auch Heckenpflanzen . . | drei- bis fünflappig, grün               | do.  | mittelstark, dornig, für Gruppen, Vogelschutzanl., Hecken                              | 0.40                       |
| „ „ <b>fastigiata</b> (hort.) .   | dunkelgrün, dicht belaubt                | weiße Doldentraub. im Mai                                  | schmal, aufrecht, für Grup., gut. Ersatz für Pyram.-Pappeln, wo leßt. vom Winde leiden | 1.—                        |
| „ „ <b>rubra pl.</b> (hort.), gefüllt blüh. Rotdorn .                                 | drei- bis fünflappig, hellgrün           | dunkelrot, gefüllt, Mai, sehr zierend                      | mittelstark, f. Gruppen Solitär  | 0.80                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.





Deutzia crenata alba plena (hort.)

| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter                | Art und Zeit der Blüte               | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen       | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------|
| <b><u>Crataegus</u></b>  |   |                                      |  |                            |
| „ oxyacantha alba plena (hort.), gefülltblühender Weißdorn . . . . . | grün                                      | weiß gefüllt, Mai, im Verblühen rosa | mittelstark, breit, für Gruppen            | 0.80                       |
| „ prunifolia (Pers.), pflaumenblätt. H., Nordamerik.                 | oval, grün lederartig                     | weiß, Mai, Frucht scharlachrot       | mittelstark, f. Gruppen                    | 0.60                       |
| „ sanguinea (Pall.), blutrotfrücht. W., Sibirien .                   | dunkelgrün                                | weiß, Mai                            | mittelst., Zweige sehr dornig, für Gruppen | 0.60                       |
| „ spathulata (Mchx.) spatelblättriger W., Südamerika . . . . .       | feinzweigig, Blätter hellgrün, dreilappig | weiß, Mai-Juni, Früchte korallenrot  | mittelstark                                | 0.80                       |
| <b><u>Cydonia</u> (Juss.) Quitte</b>                                 |   |                                      |  |                            |
| „ japonica s. Chaenomeles  |   |                                      |  |                            |
| „ vulgaris (Pers.) gemeine Q., Europa . . . . .                      | dunkelgrün, unterseits grau, filzig       | zartrosa, Mai Frucht apfelförmig     | mittelstark, f. Gruppen, Vogelschutz       | 0.40                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter  | Art und Zeit der Blüte                | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                      | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Cytisus</b> (L.), Geißklee,<br>Pfriemen Europa   |                             |                                       |   |                            |
| „ <b>Adami</b> siehe Laburnum<br>Adami  |                             |                                       |   |                            |
| „ <b>albus</b> (Link.) [weißer<br>Ginster] weißer Pf., Süd-<br>westeuropa . . . . .       | dunkelgrün                  | weiß, Mai-Juli, sehr<br>reich blühend | bis 1 m hoch,<br>für Gruppen                              | 0.60                       |
| „ <b>alpinum</b> siehe Laburnum<br>alpinum  |                             |                                       |   |                            |
| „ <b>capitatus</b> (Scop.), kopf-<br>blütiger G., Europa . .                              | dreiteilig, grün            | gelbe Blütenköpf-<br>chen, Juni-Juli  | 0,50—1 m hoch,<br>buschig, Vorstrauch                     | 0.60                       |
| „ <b>elongatus</b> (Waldst. und<br>Kit.), langzweigiger G.,<br>Ungarn . . . . .           | do.                         | lange, gelbe Ähren,<br>Mai-Juni       | niedrig, Vorstrauch                                       | 0.60                       |
| „ <b>hirsutus</b> (L.), rauhhaarig.<br>G., Südeuropa . . . . .                            | do., behaart                | gelbe Ähren, Mai-<br>Juni             | 0,50—1 m hoch,<br>Vorstrauch                              | 0.60                       |
| „ <b>Laburnum</b> s. Laburnum<br>vulg.  |                             |                                       |   |                            |
| „ <b>nigricans</b> (L.), schwarzer<br>Trauben-G., Süddeutschl.                            | do.                         | gelbe Ähren, Juni-<br>Juli            | schwach, überhängend<br>Vorstrauch                        | 0.60                       |
| „ <b>purpureus</b> (Scop.), pur-<br>purblütig. G., Mitteleuropa                           | do.                         | rosa violett, Mai                     | niederlieg., Vorstrauch<br>und für Felsengruppen          | 0.60                       |
| „ <b>purpureus incarnatus</b><br>(hort.) . . . . .  | do.                         | heißfleischfarbig,<br>Mai             | do.   | 0.60                       |
| „ <b>scoparius</b> (Lk.), bekannt.<br>Ginster, gemein. Besen-<br>pfieme, Mitteleuropa . . | grün, seidenhaarig          | gelb, Mai                             | ca. 2 m hoch,<br>für Gruppen                              | 0.40                       |
| „ <b>scoparius Andréanus</b><br>(Genista Andréana Puiss.)                                 | do.                         | auffallend braunrot                   | ca. 1,20 m hoch, in<br>Töpfen, für Gruppen<br>und Solitär | 1.50                       |
| <b>Daphne</b> (L.), Seidelbast.   |                             |                                       | siehe auch immergrüne<br>Gehölze                          |                            |
| „ <b>Mezereum</b> (L.), gemeiner<br>S., Europa . . . . .                                  | länglich, grün              | rosa, März                            | bis 1 m hoch,<br>Vorstrauch                               | 1.—                        |
| „ „ <b>fl. albo</b> (hort.) . . .   | do.                         | weiß, März                            | do.   | 1.—                        |
| <b>Desmodium</b> s. Lespedeza   |                             |                                       |   |                            |
| <b>Deutzia</b> (Thbg.), Deutzie   |                             |                                       |   |                            |
| „ <b>crenata</b> (S. & Z.), gekerbte<br>D., China, Japan . .                              | oval, grün, fein-<br>gesägt | weiße Rispen, Juni-<br>Juli           | ziemlich stark, 2,50 m<br>hoch, für Gruppen               | 0.45                       |
| „ „ <b>alba plena</b> (hort.) . .   | do.                         | weiß gefüllt, Juni-<br>Juli           | do.   | 0.45                       |
| „ „ <b>candidissima plena</b><br>(hort.) . . . . .  | do.                         | do.                                   | do.   | 0.45                       |
| „ „ <b>rubra plena</b> . . . .  | do.                         | rot gefüllt, do.                      | do.   | 0.45                       |
| „ „ <b>Pride of Rochester</b><br>(hort.) . . . . .  | do.                         | rot, große Rispen                     | do.   | 0.45                       |
| „ „ <b>Watereri</b> (hort.) . .   | do.                         | rosa Rispen, Juni-<br>Juli            | do.   | 0.45                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter | Art und Zeit der Blüte  | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                     | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|----------------------------|---|--|----------------------------|
| <b>Deutzia</b>   |                            |   |  |                            |
| „ <b>crenata</b> Wellsi (hort.) .                                      | oval, grün, feingesägt     | leicht rosa gef. Rispen   | ziemlich stark, 2,50 m hoch, für Gruppen                 | 0.45                       |
| „ <b>gracilis</b> (S. u. Z.), zierliche D., Japan . . . . .            | schmal, grün, feingesägt   | weiß, glockenförmig in Rispen stehend, Mai                                  | 70—80 cm hoch, Vorstrauch, gut zum Treiben               | 0.45                       |
| „ „ <b>rosea</b> (Lem.) . . . .  | do.                        | rosa, glockenförmig   | 80—100 cm hoch, Vorstrauch                               | 0.50                       |
| „ <b>Lemoinei</b> (Lem.) . . . .                                       | do.                        | weiß, sehr reichblühend, Juni-Juli  | 100—120 cm hoch, empfehlensw. zum Treiben                | 0.50                       |
| „ <b>staminea</b> (R. Br.), schönblüh. D. Himalaja . . . .             | oval, grün, feingesägt     | weißrosa, Juni-Juli   | ziemlich stark für Gruppen                               | 0.45                       |
| <b>Diervilla</b> (Juss.), Weigelie, Dierville                          |                            |   |  |                            |
| „ <b>florida nana fol. var.</b> (hort.) . . . . .                      | gelb-weiß-bunt             | rosa Rispen, Juni   | schwach, Vorstrauch                                      | 0.60                       |
| „ <b>grandiflora</b> Van Houttei (hort.) . . . . .                     | länglich zugespitzt, grün  | dunkelrosa Rispen, Juni   | ziemlich stark, für Gruppen                              | 0.60                       |
| „ <b>intermedia</b> (hort.), (Weigelia amabilis hort.)                 | do.                        | hellrosa Rispen, Juni   | do.  | 0.60                       |
| „ „ <b>alba</b> (hort.), (Weigelia amabilis alba hort.) .              | länglich zugespitzt, grün  | weiße Rispen  | ziemlich stark, für Gruppen                              | 0.60                       |
| „ „ <b>Eva Rathke</b> (hort.) .  | do.                        | dunkelrote Rispen   | sehr schwachwachsend Vorstrauch                          | 0.80                       |
| „ „ <b>Mad. Billard</b> (hort.) .                                      | do.                        | weißrosa Rispen, Juni   | ziemlich stark, für Gruppen                              | 0.60                       |
| „ „ <b>Prés. Duchartre</b> (hort.) . . . . .                           | do.                        | dunkelrote Rispen, Juni   | do.  | 0.60                       |
| „ <b>Kosteriana fol. var.</b> (hort.) . . . . .                        | weiß gerandet              | rosa Rispen, Juni   | mittelstark, für Gruppen                                 | 0.60                       |
| „ <b>sessilifolia</b> (Burk.), sitzblättrige D. . . . .                | länglich, rötlich          | gelb, Juni-Juli   | schwach, Vorstrauch                                      | 0.80                       |
| <b>Elaeagnus</b> (L.), Ölweide   |                            |   |  |                            |
| „ <b>angustifolia</b> (L.), schmalblättr. O., Orient . . . .           | lanzettförmig, graugrün    | bläugelb, Juni-Juli, Frucht silbergrau                                      | stark, sparrig, dornig für Gruppen                       | 0.50                       |
| „ <b>crispa</b> (Thbg.), welligblättrige O., Japan . . . . .           | lanzettförmig, silberweiß  | bläugelb, Juni  | stark, für Gruppen                                       | 0.50                       |
| „ <b>longipes</b> (A. Gray), langstielige O., Japan . . . .            | graugrün                   | weißlich, Mai, Frucht rot, zum Einmachen                                    | mittelstark, für Gruppen                                 | 0.40                       |
| „ <b>pungens</b> siehe immergr. Laubhölzer                             |                            |   |  |                            |
| <b>Evonymus</b> (L.), Spindelbaum                                      |                            |   |  |                            |
| „ <b>alata</b> (K. Koch), korkartig. Sp., Japan, China . . . .         | länglich, grün             | gelbl. weiße Scheindolde, Juni  | mittelhoch; kantige, korkige Rinde, für Gruppen, Solitär | 1.50                       |
| „ <b>europaea</b> (L.), gemeiner Sp., Pfaffenhütchen, Europa . . . . . | lanzettförmig, grün        | gelbl. weiße Scheindolde, Mai, Frucht dreiteilig rot, teils gelbe Umhüllung | mitteistark { f. Gruppen<br>{ Schatten                   | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter           | Art und Zeit der Blüte                        | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen           | Sträucher 1 Stück M. |
|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Evonymus</b>  |                                      |   |  |                      |
| „ <i>jap. radicans</i> s. Schlingpflanzen                        |                                      |   |  |                      |
| <b>Exochorda</b> (Lindl.), Scheinfelsenbirne                     |                                      |   |  |                      |
| „ <i>grandiflora</i> (Lindl.), großblütige Sch., China . . .     | ganzrandig, grün                     | weiße Traubenblüte, Mai                       | bis 2,50 m hoch, für Gruppen                   | 0.80                 |
| <b>Fagus</b> (L.), Rotbuche, Buche                               |                                      |   |  |                      |
| „ <i>silvatica</i> (L.), gemeine R., Europa . . . . .            | glänzend grün                        | —   | stark, baumartig, für Schatten und Hecken      | 0.60                 |
| „ „ <i>asplenifolia</i> (hort.) .                                | farnähnlich, grün                    | —   | schwach, Solitär                               | 2.50                 |
| „ „ <i>pendula</i> siehe Trauerbäume                             |                                      |   |  |                      |
| „ „ <i>purpurea</i> (Ait.), Blutbuche . . . . .                  | dunkelrot, im Spätsommer braunrot    | —   | für baumartige Grupp., Solitär und Hecken      | 2.—                  |
| „ „ <i>purpurea major</i> (hort.), veredelte Blutbuche . . . . . | groß, schwarzrot, im Späts. braunrot | —   | stark, Solitär                                 | 3.50                 |
| „ „ <i>purpurea pendula</i> siehe Trauerbäume                    |                                      |   |  |                      |
| <b>Fontanesia</b> (La Bill.), Fontanesie                         |                                      |   |  |                      |
| „ <i>phillyreoides</i> (La Bill.), steinlindenartige F., Syrien  | eilanzettförmig, grün                | weiße, traubenartige Scheindolde, Juli-August | 1—1,50 m hoch, buschig, für Gruppen            | 0.60                 |
| <b>Forsythia</b> (Vahl.), Forsythie China                        |                                      |   |  |                      |
| „ <i>intermedia</i> (Zbl.) . . .                                 | länglich, dreilappig, grün           | lichtgelb, glockig, April                     | ziemlich stark, für Gruppen                    | 0.50                 |
| „ <i>suspensa</i> (Vahl.), hängende F., China . .                | rundlich, zwei- bis dreilappig, grün | do.   | ziemlich stark, überhängend, do.               | 0.50                 |
| „ „ <i>var. Fortunei</i> (Lindl.)                                | do.                                  | do.   | ziemlich stark, do.                            | 0.50                 |
| „ „ „ <i>aurea var.</i> (hort.) . . . . .                        | schön gelbbunt berandet              | do.   | schwachwachsend                                | 0.50                 |
| „ „ <i>var. Sieboldi</i> (hort.)                                 | eiförmig spitz, grün                 | do. März-April                                | zieml. stark, überhäng. oder niederlieg., do.  | 0.50                 |
| „ <i>viridissima</i> (Lindl.), dunkelgrüne F. . . . .            | lanzettförmig, glänzend grün         | lichtgelb, glockig, Ende April                | mittelstark, für Gruppen                       | 0.50                 |
| <b>Fraxinus</b> (L.), Esche                                      |                                      |   |  |                      |
| „ <i>americana</i> , s. Alleebäume                               |                                      |   |  |                      |
| „ <i>excelsior</i> (L.), gemeine E. Europa . . . . .             | grün, 4—6 paarig                     | weiße Rispen, April-Mai                       | stark, baumart. Grupp. liebt feuchten Standort | 0.40                 |
| „ „ <i>pendula</i> s. Trauerb.                                   |                                      |   |  |                      |
| „ <i>Ornus</i> (L.), gem. Blumen-E., Südeuropa . . . . .         | grün, 2—4 paarig                     | weiße, große Rispen Juni-August               | stark, für baumartige Gruppen                  | 0.60                 |
| <b>Genista</b> (L.), Ginster                                     |                                      |   |  |                      |
| „ <i>alba</i> siehe <i>Cytisus albus</i>                         |                                      |   |  |                      |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.





*Holodiscus discolor* (Max.)

| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter              | Art und Zeit der Blüte  | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                           | Straucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|---|---|--|----------------------------|
| <b>Genista</b>   |   |   |  |                            |
| „ <b>Andréana</b> siehe <i>Cytisus scoparius Andréanus</i>           |   |   |  |                            |
| „ <b>junceae</b> siehe <i>Spartium junceum</i>                       |   |   |  |                            |
| „ <b>tinctoria</b> (L.), Färber-G., Europa . . . . .                 | dunkelgrün                              | gelb, kleine Traub. Juni-Juli, sehr reichblühend                | bis 1 m hoch, für Gruppen                                      | 0.50                       |
| <b>Gleditschia</b> (L.), Gleditschie                                 |   |   |  |                            |
| „ <b>triacanthos</b> (L.), dreidornige G., Nordamerika               | grün, fein gefiedert                    | ca. 5 cm lange, grünl. Trauben, Juni-Juli                       | mittelst., sehr dornig, für Gruppen                            | 0.50                       |
| „ <b>inermis</b> (D. C.), unbewaffnete G. . . . .                    | do.                                     | 4—5 cm lange, grünl. Trauben, Juni-Juli                         | mittelstark, für Gruppen                                       | 0.50                       |
| <b>Glycine</b> siehe Schlingpflanz.                                  |   |   |  |                            |
| <b>Gymnocladus</b> (Lam.)<br>Schusserbaum                            |   |   |  |                            |
| „ <b>dioica</b> (K. Koch) amerikanischer Sch. . . . .                | groß, gefiedert, grün                   | 8-10 cm lange, grünlichweiße Trauben, Mai-Juni                  | mittelstark, do.   | 1.50                       |
| <b>Halesia</b> (L.), Halesie   |   |   |  |                            |
| „ <b>tetraptera</b> (L.), vierflügel. H., Virginien . . . . .        | länglich oval, grün                     | weiß, rötlich angehaucht, glockenf., April-Mai                  | mittelstark, do.   | 0.80                       |
| <b>Halimodendron</b> (Fisch.),<br>Salzstrauch                        |   |   |  |                            |
| „ <b>argenteum</b> (Fisch.), silberhaariger S., Sibirien             | silbergrau                              | violett, Juni-Aug.  | schwach, Vorstrauch  | 1.—                        |
| <b>Hammamelis</b> (L.), Zaubernuß                                    |   |   |  |                            |
| „ <b>virginiana</b> (L.), virginisch. Z., Nordamerika . . . . .      | glänzend grün                           | hellgelbe Blüten, erscheinen i. Herbst beim Abfallen des Laubes | ziemlich stark, für Gruppen                                    | 1.—                        |
| <b>Hedera</b> siehe immergrüne<br>Gehölze u. Schlingpflanz.          |   |   |  |                            |
| <b>Hedysarum</b> (L.), Hahnenkopf                                    |   |   |  |                            |
| „ <b>multijugum</b> (Max.), viel-<br>paariger H., Mongolei . . . . . | lang, feingefiedert,<br>graugrün        | rote Trauben,<br>Juni-Juli                                      | 0,50—1 m hoch,<br>Vorstrauch                                   | 1.—                        |
| <b>Hibiscus</b> (L.), Eibisch  |   |   |  |                            |
| „ <b>syriacus</b> (L.), syrischer E.                                 | dreilappig, grün                        | malvenartig, violett-blau, Juli-Sept.                           | schwach, Vorstrauch,<br>verl. Winterschutz                     | 0.60                       |
| „ „ Sorten mit Namen . . . . .                                       | grün oder bunt                          | in allen Farben,<br>einfach und gefüllt                         | schwach, do.,<br>auch solitär                                  | 0.80                       |
| <b>Hippophaë</b> (L.), Sanddorn                                      |   |   |  |                            |
| „ <b>ramnoides</b> (L.), gemeiner S., Europa . . . . .               | klein, lanzettförmig,<br>silberglänzend | gelbl. weiß, März-April, Frucht rötlich-gelb                    | ziemlich stark, sparrig<br>dornig, für Gruppen,<br>Vogelschutz | 0.45                       |
| <b>Holodiscus</b> (K. Koch), Mehl-<br>beerspiere                     |   |   |  |                            |
| „ <b>discolor</b> (Max.), gemeine M., Nordwestamerika . . . . .      | keilförmig, grün                        | weiß bis hellgelb,<br>lange Rispen,<br>Juli-August              | mittelstark, f. Gruppen<br>siehe Abbildung                     | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.





*Hydrangea paniculata grandiflora* (Sieb.)

| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter           | Art und Zeit der Blüte                                   | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                                | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------|
| <b>Hydrangea</b> (L.), Hortensie   |                                      |  |   |                            |
| „ <b>hortensis</b> }   | länglich, feingesägt,<br>grün        | weiß, später rosa,<br>große Rispen,<br>Juli-Oktober      | schwach, kompakt,<br>Gruppen, Solitär                               | 0.70                       |
| „ „ <b>fol. var</b> }  |                                      |  |   |                            |
| „ <b>paniculata grandiflora</b><br>(Sieb.), rispenblütige H.,<br>Japan siehe Abbildung |                                      |  |   |                            |
| <b>Hypericum</b> (L.), Hartheu, Jo-<br>hanniskraut                                     |                                      |  |   |                            |
| „ <b>calycinum</b> (L.), vielsten-<br>geliges H., Orient . . .                         | länglich, lederartig,<br>immergrün   | Blüten goldgelb,<br>6—8 cm Durchm.,<br>Juni-September    | niedrig, Vorstrauch,<br>zu Einfassungen, ver-<br>langt Winterschutz | 0.50                       |
| „ <b>densiflorum</b> (Pursh.),<br>dichtblühendes H., Nord-<br>amerika . . . . .        | sehr klein, lanzett-<br>förmig, grün | gelbe, kleine Schein-<br>dolden, Juli-Sept.              | niedrig, Vorstrauch   | 0.50                       |
| „ <b>Moserianum</b> (E. André),<br>Mosers H. . . . .                                   | eiförmig, grün                       | goldgelbe Blüten,<br>6—7 cm Durchm.,<br>Juli-September   | niedrig, Vorstrauch,<br>Einfassung, verlangt<br>Winterschutz        | 0.80                       |
| <b>Jasminum</b> (L.), Jasmin   |                                      |  |   |                            |
| „ <b>fruticans</b> (L.), strauch-<br>artiger J., Südeuropa . .                         | dreiteilig, grün                     | gelb, Juni-Juli  | 1—1,50 m hoch,<br>aufrecht, Vorstrauch                              | 0.60                       |
| „ <b>nudiflorum</b> (Lindl.), früh-<br>blühender J., China .                           | eiförmig, dreiteilig,<br>grün        | gelb, vor Entfaltung<br>der Blätter                      | bis 1 m hoch,<br>Vorstrauch   | 0.60                       |
| „ „ <b>aureum</b> (hort.) . . .  | gelbbunt                             | gelb, vor Entfaltung<br>der Blätter                      | Vorstrauch  | 0.80                       |
| „ <b>officinale</b> (L.), echter J.,<br>Asien . . . . .                                | dreipaarig, grün                     | weiß, Juli-August  | schwach, etwas<br>rankend, Vorstrauch                               | 0.60                       |
| <b>Ilex</b> siehe immergrüne Ge-<br>hölze  |                                      |  |   |                            |
| <b>Indigofera</b> (L.), Indigostrauch  |                                      |  |   |                            |
| „ <b>Gerardiana</b> (Wall.)<br>Gerards J., Himalaja . .                                | gefiedert, graugrün                  | bläulich rosa,<br>Traubenblüte,<br>Juni-August           | bis 1 m hoch,<br>Vorstrauch   | 0.50                       |
| <b>Juglans</b> siehe Obst  |                                      |  |   |                            |
| <b>Kalmia</b> siehe immergrüne<br>Gehölze  |                                      |  |   |                            |
| <b>Kerria</b> (D. C.), Kerrie  |                                      |  |   |                            |
| „ <b>japonica</b> (D. C.), japa-<br>nische K. . . . .                                  | eiförmig, scharf<br>gesägt, hellgrün | goldgelb, Mai-Juni                                       | 1—2 m hoch, buschig,<br>für Gruppen                                 | 0.50                       |
| „ „ <b>fl. pl.</b> (hort.), Mauer-<br>röschen . . . . .                                | do.                                  | do., dichtgefüllt  | 1—2 m hoch,<br>Vorstrauch   | 0.50                       |
| „ „ <b>var.</b> (hort.) . . . . .  | weißbunt                             | goldgelb, Mai-Juni                                       | schwach, Vorstrauch   | 0.50                       |
| <b>Koelreuteria</b> (Laxm.), Köl-<br>reuterie . . . . .                                |                                      |  |   |                            |
| „ <b>paniculata</b> (Laxm.), ris-<br>pige K., China . . . . .                          | gefiedert, grün                      | gelbe Rispen,<br>Juli-August                             | mittelstark,<br>für Gruppen   | 0.60                       |
| <b>Laburnum</b> (Grsb.), Goldreg.  |                                      |  | siehe auch Alleebäume   |                            |
| „ <b>Adami</b> (P. & K.), Adams<br>G. . . . .  | dreiteilig,<br>glänzend grün         | meist rot, häufig<br>gelbe u. purpurrote<br>Trauben, Mai | do.   | 1.—                        |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.





Lonicera Morrowii (A. Gray)

| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter   | Art und Zeit der Blüte           | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                                     | Straucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Laburnum</b>  |                              |                                  |  |                            |
| " <b>alpinum</b> (Grsb.), Alp.-G.  | dreiteilig,<br>glänzend grün | lange, gelbe<br>hängende Trauben | stark  | 0.60                       |
| " <b>vulgare</b> (Grsb.), gemein.<br>G., Mitteleuropa . . . .                              | do.                          | do., Mai-Juni                    | siehe auch Alleebäume  | 0.50                       |
| <b>Lspedeza</b> (Mchx.), Busch-<br>klee  |                              |                                  |  |                            |
| " <b>bicolor</b> (Turcz.), zwei-<br>farbiger B., Japan . . .                               | rundlich oval,<br>grün       | rosarote Trauben                 | ziemlich stark,<br>für Gruppen   | 0.80                       |
| " <b>Sieboldi</b> (Miq.), (Desmo-<br>dium penduliflor. Oudem.)<br>Siebolds B., Japan . . . | gefiedert, grün              | rote,<br>lockere Trauben         | Zweige hängend, friert<br>bis an d. Boden zurück,<br>Vorstrauch, Solitär | 0.80                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                             | Art und Zeit der Blüte   | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                            | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|--|--|---|----------------------------|
| <b>Leycesteria</b> (Wall.), Leycest.  |  |  |   |                            |
| „ <b>formosa</b> (Wall.), schöne L. . . . .                                     | frischgrün, eilänglich                                 | dicht, quirlf. bräunl. weiß, schwarze Beeren im August         | verlangt Winterschutz; friert jedes Jahr bis an die Erde zurück | 0.70                       |
| <b>Ligustrum</b> (L.), Rainweide  |  |  |   |                            |
| „ <b>amurense</b> (Carr.) . . .   | länglich, dunkelgrün                                   | weiß, lockere, 4—5 cm lange Rispen                             | aufrecht  | 0.60                       |
| „ <b>japonicum</b> (Thbg.), jap. R.   | lederartig, fast immergrün                             | weiße Rispen, Juni-September                                   | schwach, Vorstrauch   | 0.80                       |
| „ <b>ibota</b> (S. & Z.), Iбота-R., Japan . . . . .                             | klein, oval, grün                                      | weiße Rispen, Juni-Juli  | mittelstark, für Gruppen  | 0.60                       |
| „ „ <b>Regelianum</b> (hort.)   | klein, grün  | weiße Rispen, Juni   | niedrig, breitwachsend Vorstrauch, Felsgrupp.                   | 0.60                       |
| „ <b>obtusifolium</b> (S. u. Z.), stumpfblättr. R., Japan .                     | rundlich, grün   | do.  | mittelstark, sparrig, für Gruppen                               | 0.60                       |
| „ <b>ovalifolium</b> (Hassk.), eiblättr. R., Japan, siehe auch Heckenpflanzen . | groß, eiförmig, fast immergrün                         | do.  | ziemlich stark, für Gruppen, Hecken und Schatten                | 0.50                       |
| „ „ <b>aur.-var.</b> (hort.) . .  | gelbbunt, fast immergrün                               | do.  | schwach, Vorstrauch   | 1.—                        |
| „ <b>sinensis</b> (Lour.), chines. R. . . . .                                   | oval, grün   | weiße, ährenartige Rispen                                      | bis 2 m hoch, feinzweigig, für Gruppen                          | 0.50                       |
| „ <b>vulgare</b> (L.), gemeine R., Europa, siehe auch Heckenpfl. . . . .        | schmal, lanzettförmig, grün                            | weiße Rispen, Frucht schwarz                                   | zieml. stark, f. Gruppen und Schatten                           | 0.40                       |
| „ „ <b>italum</b> (Mill.) . . . .   | halbimmergrün, glänzend                                | weiße Rispen   | auch für Hecken   | 0.50                       |
| <b>Liquidambar</b> (L.), Amberb.  |  |  |   |                            |
| „ <b>styraciflua</b> (L.), storax-liefernd. A., Nordamerika                     | handförmig gelappt grün, färben im Herbste schön rot   | —  | ziemlich stark, korkige Rinde, Solitär extra starke             | 1.50<br>3.—                |
| <b>Liriodendron</b> (L.), Tulpenb.  |  |  | siehe auch Alleebäume   |                            |
| „ <b>Tulipifera</b> (L.), gemeiner T., Amerika . . . . .                        | vierseitig, an der Spitze abgestumpft, grün, hautartig | grünl.gelb, Juli-Aug. die Blüte erscheint erst bei äl. Exempl. | ziemlich stark, Solitär   | 1.50                       |
| „ „ <b>aur.-marg.</b> (hort.) .   | do., gelbbunt  | —  | do.   | 2.50                       |
| <b>Lonicera</b> (L.), Heckenkirsche   |  |  |   |                            |
| „ <b>Caprifolium</b> s. Schlingpfl.   |  |  |   |                            |
| „ <b>chrysantha</b> (Turcz.) [L. Regaliana Kirch.], gelbblühende H., China . .  | eilanzettlich, dunkelgrün                              | gelb, Mai, Frucht rot  | ziemlich stark, für Gruppen                                     | 0.50                       |
| „ <b>coerulea</b> (L.), blaue H., Europa . . . . .                              | länglich oval, grün, lederartig                        | weiß grünl., Mai-Juni Frucht hellblau                          | schwach, Vorstrauch   | 0.50                       |
| „ <b>diversifolia</b> (Wall.), verschiedenblättr. H., Himalaja                  | oval, herz- und eiförmig, grün                         | weiß, Juni, Frucht weiß  | ziemlich stark, für Gruppen                                     | 0.50                       |
| „ <b>Ledebouri</b> (Esch.), Ledebours H., Nordamerika .                         | oval, grün, filzig                                     | gelb bis gelbbrot, Juni-Juli, Frucht rot                       | mittelstark, f. Gruppen   | 0.40                       |
| „ <b>Morrowii</b> (A. Gray), Morrows H., Japan, s. Abbild.                      | eirundlich, oval, grün                                 | weißl. gelb, Mai, Frucht dunkelrot                             | do., breitwachsend  | 0.60                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat                                      | Form und Farbe der Blätter         | Art und Zeit der Blüte                            | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                          | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
| <b>Lonicera</b>   |                                    |   |   |                            |
| „ <i>pileata</i> (Oliv.), China                             | klein, immergrün                   | grünlich,<br>wenig auffällig,<br>Frucht rot       | niedrig, ausgebreitet,<br>für Felsen                          | 0.80                       |
| „ <i>Ruprechtiana</i> (Regel),<br>Ruprechts H., Mandschurei | länglich, lanzett-<br>förmig, grün | weiß, später hellgelb<br>Mai, Frucht<br>orangerot | ziemlich stark, für<br>Gruppen                                | 0.50                       |
| „ <i>tatarica</i> (L.), tatarische H.,<br>Rußland . . . . . | oval, eilänglich,<br>grün          | hellrosa, Mai-Juni,<br>Frucht rot                 | do.   | 0.50                       |
| „ „ <i>alba grandiflora</i><br>(hort.) . . . . .            | do.                                | weiß, größer wie<br>vorige, Mai-Juni              | do.   | 0.50                       |
| „ „ <i>speciosa</i> (Carr.) . .                             | do.                                | dunkelrosa,<br>Mai-Juni                           | do.   | 0.50                       |
| „ <i>tibetica</i> (Bur. u. Franch.)                         | länglich-lanzettlich               | Juli-Aug., lila                                   | bis 1,50 m, teils<br>niederliegend                            | 0.60                       |
| „ <i>Xylosteum</i> (L.), gemeine<br>H., Europa . . . . .    | eirundlich, grün                   | weißl. gelb, Mai-Juni<br>Frucht dunkelrot         | ziemlich stark, für<br>Gruppen, Schatten<br>Vogelschutzanlage | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



*Philadelphus coronarius* (L.)



*Spiraea Vanhouttei* (Briot.)

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter | Art und Zeit der Blüte  | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                         | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|----------------------------|---|--|----------------------------|
| <u>Lycium</u> (L.), Bocksdorn<br>„ <i>halimifolium</i> (Mill.), gemeiner B., China . . .  | lanzettförmig, hellgrün    | rötlich, den ganzen Sommer blühend, Frucht rot                          | mittelstark, sparrig, dornig, für Felsen, Vogelschutzanlagen | 0.45                       |
| <u>Maclura</u> (Nutt.), Osagedorn<br>„ <i>aurantiaca</i> (Nutt.), orangefarbiger O. . . .   | glänzendgrün               | unscheinbar   | Zweige grün, meist dornig                                    | 1.—                        |
| <u>Magnolia</u> siehe immergr.<br>Gehölze   |                            |   |  |                            |
| <u>Mahonia</u> siehe Berberis   |                            |   |  |                            |
| <u>Malus</u> (Juss.), Apfel, Kirsch-<br>apfel<br>„ großfrüchtige Sorten<br>siehe Obst (Kirschäpfel)<br>„ <i>baccata</i> (Borkh.), Beeren-<br>apfel, China . . . . . | breit oval, grün           | weiße, zieml. große Doldentrauben, Mai, Frucht erbsengroß, scharlachrot | mittelstark, f. Gruppen<br>siehe Allee- und Trauerbäume      | 1.20                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                    | Art und Zeit der Blüte   | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                             | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|---|--|--|----------------------------|
| <b>Malus</b>  |   |  |  |                            |
| „ <b>floribunda</b> (Sieb.), reichblühender K., Japan . . .                     | länglich, lanzettlich, grün                   | karminrote Doldentraube, später rosa, Früchte gelblichgrün, erbsengroß | mittelstark, f. Gruppen, überhängend, Mai-Juni                   | 1.20                       |
| „ <b>Scheideckeri</b> (Späth) . . .   | eiförmig, grün                                | zart, rötlich, gefüllt, Mai-Juni                                       | mittelstark, für Gruppen Solitär, empfehlenswert für Treibereien | 1.20                       |
| „ <b>Toringo</b> (Sieb.), Toringo-A., Japan . . . . .                           | dreilappig, zieml. tief eingeschnitten, grün  | hellrosa Doldentrauben, Frucht gelb, erbsengroß                        | mittelstark, überhängend, für Gruppen                            | 1.20                       |
| <b>Mespilus</b> s. immergr. Gehölze   |   |  |  |                            |
| <b>Morus</b> (Juss.), Maulbeerbaum  |   |  | siehe auch Alleebäume  |                            |
| „ <b>alba</b> (L.), weißer M., China . . .                                      | oval bis herzförmig, ungleich gelappt, grün   | grünlich weiße Ähren, Mai, Frucht rötlich weiß                         | mittelstark, für Gruppen   | 0.50                       |
| „ <b>nigra</b> siehe Obstbäume  |   |  |  |                            |
| <b>Myrica</b> (L.), Wachsmyrte  |   |  |  |                            |
| „ <b>asplenifolia</b> (L.), farnblättrige W., Nordkarolina . . .                | lang, schmal, fiederlappig, grün              | lange, bräunliche Käpchen, April-Mai                                   | niedrig, buschig, Vorstrauch                                     | 1.—                        |
| „ <b>cerifera</b> (L.), südliche W., Nordamerika . . . . .                      | ganzrandig, glänzend grün                     | do.  | do.  | 0.70                       |
| <b>Osmanthus</b> siehe immergr. Gehölze.  |   |  |  |                            |
| <b>Ostrya</b> (Scop.), Hopfenbuche  |   |  |  |                            |
| „ <b>virginiana</b> (C. Koch), amerikanische H. . . . .                         | eilänglich, herzförmig, grün                  | gelblich grün, 4—5 cm lange Käpchen                                    | mittelstark, für Gruppen   | 0.80                       |
| <b>Paeonia</b> (L.), Pfingstrose  |   |  | siehe auch Stauden   |                            |
| „ <b>arborea</b> (Donn.), baumartige P., China . . . . .                        | doppelt dreizählig, grün                      | reinweiß, rosa bis dunkelrot, Mai-Juni                                 | 0,50—1 m hoch, Solitär, in Töpfen                                | 2.50                       |
| <b>Parrotia</b> (C.A.Mey.), Parrotie  |   |  |  |                            |
| „ <b>persica</b> (C. A. Mey.), persische P. . . . .                             | rundoval, hellgrün, rotbraun gerandet         | gelbliche, köpfchenart. Ähr., erschein. b. Ausbruch d. Blätter         | mittelstark, Solitär   | 2.—                        |
| <b>Paulownia</b> (S. u. Z.) Paulown.  |   |  |  |                            |
| „ <b>tomentosa</b> (K. Koch), filzige P., Japan . . . . .                       | enorm groß, breit herzförmig, ganzrandig grün | lila, Mai-Juni, blüht i. kalten Lagen selten                           | stark, Einzelpflanze   | 1.20                       |
| <b>Pavia</b> siehe Aesculus.  |   |  |  |                            |
| <b>Periploca</b> siehe Schlingpflanzen.   |   |  |  |                            |
| <b>Phellodendron</b> (Rup.), Korkbaum   |   |  |  |                            |
| „ <b>amurense</b> (Rup.), mandchurischer K. . . . .                             | groß, unpaar. gefied. grün, stark duftend     | blüht sehr selten  | ziemlich stark, korkige Rinde, für Gruppen                       | 0.60                       |
| <b>Philadelphus</b> (L.), [Wilder Jasmin] Pfeifenstrauch . . .                  |   |  |  |                            |
| „ <b>coronarius</b> (L.), gemeiner Pf., Mitteleuropa, siehe Abbildung . . . . . | eiförm., gesägt, grün                         | weiße, 5—11 blütige Trauben, Juni                                      | ziemlich stark, für Gruppen                                      | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 100% bei Abnahme von 10, um 200% bei Abnahme von 100, um 300% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                            | Art und Zeit der Blüte                     | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                   | Sträucher 1 Stück M. |
|---|---|--|--|----------------------|
| <b>Philadelphus</b>   |   |  |  |                      |
| " aureus (hort.) . . .  | eiförmig, gesägt, goldgelb                            | weiße, 5—11 blütige Trauben, Juni          | schwach, Vorstrauch                                    | 0.50                 |
| " dianthiflorus plenus (hort.) . . . . .                                | eiförmig, gesägt, grün                                | weiß, gefüllt, Juni                        | mittelstark, für Gruppen                               | 0.60                 |
| " nanus (Dipp.) Zwerg Pf.   | breit, eiförmig, grün                                 | weiß, blüht sehr selt.                     | niedrig, buschig, Vorstrauch                           | 0.50                 |
| " Falconeri (Sarg.) . . .   | eilanzettlich   | sternart., schneew., stark duftend         | überhäng., ca. 2 m hoch, sehrzierend                   | 0.80                 |
| " Gordonianus (Lindl.), Gordons Pf. . . . .                             | eilanzettförmig, grün                                 | weiß, 5—9 blütige Trauben, Juli            | ziemlich stark, für Gruppen                            | 0.50                 |
| " grandiflorus (Wild.), großblütiger Pf. . . . .                        | breit, eiförmig, grün                                 | weiß, 3—5 blütige Trauben, Juni            | do.  | 0.50                 |
| " inodorus (L.), geruchloser Pf. . . . .                                | do.   | do.  | do.  | 0.50                 |
| " Lemoinei erectus (Lem.)   | klein, eiförmig, grün                                 | weiß, reichblühend, Juni-Juli              | schwach, aufrecht, Vorstrauch                          | 0.50                 |
| " erectus grandiflorus  | eilanzettlich   | sehr groß, reichblühend                    | aufrecht, bis 1,50 m hoch                              | 0.70                 |
| " ochroleucus (Lem.) [Manteau d'hermine] .                              | klein, eiförmig, grün                                 | weiß, dichtgefüllt, reichblüh., Juni-Juli  | schwach, Vorstrauch                                    | 0.60                 |
| " pubescens (Lois.), weiß-grau behaarter Pf. . . .                      | groß, grün, unterseits weiß filzig                    | weiß, 3—5 blütige Trauben, Juni-Juli       | stark für Gruppen                                      | 0.50                 |
| " Satsumi (Sieb.), Satsuma Pf., Japan . . . . .                         | eiförmig grün   | weiße, 5 blüt. Traub. Juni-Juli, geruchlos | mittelstark, für Gruppen                               | 0.50                 |
| " Zeyheri (Schräd.) . . .   | groß, hellgrün  | sehr groß, stark duftend, Juni             | stark  | 0.50                 |
| <b>Physocarpus</b> (Camb.), Blasenspiere                                |   |  |  |                      |
| " opulifolius (Max.) schneeballblättrige Bl., Nordamerika . . . . .     | eiförmig, stark eingeschnitten, grün                  | weiße Doldentraub., Juni                   | stark für Gruppen                                      | 0.50                 |
| " luteus (hort.) . . . .  | goldgelb  | do.  | mittelstark, für Gruppen                               | 0.60                 |
| <b>Pirus</b> salicifolia s. Trauerb.                                    |   |  |  |                      |
| <b>Platanus</b> (L.), Platane   |   |  | siehe auch Alleebäume                                  |                      |
| " occidentalis (L.), amerikanische P.                                   | groß, seicht gelappt, bucht. gezähnt, grün            | —  | stark, baumart. Grupp.                                 | 0.60                 |
| <b>Polygonum</b> siehe Schlingpflanzen und Stauden .                    |   |  |  |                      |
| <b>Populus</b> (L.), Pappel . . .                                       |   |  | siehe auch Alleebäume                                  |                      |
| " alba (L.), [P. alba nivea hort.] Weiß- oder Silber-P., Europa . . . . | drei- u. fünf lapp, gezähnt, weiß, filzig             | —  | stark, für Gruppen                                     | 0.50                 |
| " pyramidalis (Bnge.) Pyramiden-Silb.-P., Asien                         | drei b. fünf lappig, tief eingeschnitten, weiß filzig | —  | ziemlich stark, für Gruppen, bildet monumentale Säulen | 1.50                 |
| " balsamifera (L.), Balsam-P., Nordamerika . . . .                      | groß, breithertzförm. grün                            | unscheinbare Käpchen                       | stark, kantige, klebrige Zweig., baumart. Grupp.       | 0.50                 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter                                 | Art und Zeit der Blüte  | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                 | Sträucher 1 Stück M. |
|--|--|---|--|----------------------|
| <b>Populus</b>   |  |   |  |                      |
| „ <i>canadensis</i> (Mnch.), kanadische P., Nordamerika                                | rund eiförmig, grün  | unscheinbare Käpchen  | stark, baumartige Gruppen                            | 0.40                 |
| „ „ <i>aurea</i> (v. Geert) . .  | gelb   | do.   | ziemlich stark, baumartige Gruppen                   | 1.—                  |
| „ <i>nigra</i> var. <i>pyramidalis</i> (Spach.), Pyramiden P., italienische P. . . . . | eiförmig, grün   | do.   | stark, baumartige Gruppen, bilden monumentale Säulen | 0.60                 |
| „ <i>suaveolens</i> (Loud.), wohlriechende P., China                                   | dunkelgrün, unterseits weißlich grau                       | do.   | ziemlich stark, für Gruppen                          | 0.60                 |
| <b>Potentilla</b> (L.), Fünffingerstr.   |  |   |  |                      |
| „ <i>fruticosa</i> (L.), gemeiner F., Europa, Asien . . .                              | klein, fünfteilig, grün                                    | gelbe Doldentraub, Mai-August   | bis 1 m hoch, buschig, Vorstrauch                    | 0.40                 |
| <b>Prunus</b> (L.), Kirsche, Pflaume   |  |   |  |                      |
| „ <i>avium</i> (L.), Vogelkirsche  | länglich oval, gekerbt, hellgrün                           | weiß, 2—4 blütig, April-Mai   | siehe auch Alleebäume stark, für Gruppen             | 0.40                 |
| „ „ <i>fl. pl.</i> (hort.), gefüllt-blühende K. . . . .                                | oval, grün   | weiß, gefüllt, April-Mai  | mittelstark, für Gruppen                             | 1.20                 |
| „ <i>caproniana</i> pend. siehe Trauerbäume  |  |   |  |                      |
| „ <i>Chamaecerasus globosa</i> (hort.) . . . . .                                       | schmal, glänzend grün                                      | weiß, klein, April  | schwach, bildet kugelig. Krone, für Gruppen          | siehe Halbst.        |
| „ <i>japonica glandulosa fl. albo pl.</i> (hort.) . . .                                | lanzettlich, grün  | weiß, gefüllt, April  | schwach, Vorstrauch                                  | 1.—                  |
| „ „ <i>glandulosa fl. roseo pl.</i> (hort.) . . . . .                                  | do.  | rosa gefüllt, April   | do., verlangt geschütz. Standort                     | 1.—                  |
| „ <i>intermedia semperflorens</i> (Ehrh.), Allerheiligen-K. . . . .                    | eiförmig, gekerbt, glänzend grün                           | weiß, den ganzen Sommer blühend, trägt im Septemb. kleine, rote Kirsch. | schwach, etwas überhängend, für Gruppen              | siehe Halbst.        |
| „ <i>Laurocerasus</i> } siehe immergrün, Gehölze                                       |  |   |  |                      |
| „ <i>Lusitanica</i> }  |  |   |  |                      |
| „ <i>Mahaleb</i> (L.), gemeine Steinweichsel, Europa .                                 | länglich, eirund, grün                                     | weiße, lock. Traub. April, kleine, schwarzrote Kirsch.                  | stark für Gruppen, Vogelschutzanlage                 | 0.40                 |
| „ <i>Myrobalana</i> (L.), Kirsch-Pf., Europa . . . . .                                 | eilanzettförmig, gekerbt, grün                             | weiß, März-April  | do.  | 0.40                 |
| „ „ <i>purpurea</i> (Späth.), [Prun. <i>Pissardii</i> Carr.], Blut-Pf. . . . .         | dunkelrot  | weißrosa, April kirschengr. rote Fr.                                    | stark, für Gruppen, Solitär                          | 1.—                  |
| „ „ <i>Purpusi</i> (Hesse) . .   | dunkelrot, gelb und rosa durchwirkt                        | weiß, April   | mittelstark, Solitär                                 | 1.20                 |
| „ <i>Padus</i> (L.), gemeine Trauben-K., Europa . .                                    | länglich, dunkelgrün                                       | weiße Trauben, Mai  | ziemlich stark, für Gruppen, Schatten                | 0.50                 |
| „ <i>pumila</i> (L.), kanadische K., Nordamerika . . . . .                             | lanzettförmig, bläul. dunkelgrün, unterseits weißlich grün | weiße, 2—4blütige Dolden, April   | bis 1 m hoch, Vorstrauch                             | 0.60                 |
| „ <i>serotina</i> (Ehrh.), spät-blühende Traub.-K., Östl. Nordamerika . . . . .        | lanzettförm., glänz. grün, lederartig                      | weiße Trauben, Mai  | stark, für Gruppen, Schatten, Vogelschutzanlage      | 0.40                 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter  | Art und Zeit der Blüte   | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                       | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|---|--|--|----------------------------|
| <b>Prunus</b>   |   |  |  |                            |
| " <b>serrulata</b> Hisakura (hort.), Japan Neuheit!           | schmal, länglich, stark gesägt, grün                                | lebhaftrosa, bis 5 cm breit, halbgefüllt, in Büscheln, überhängend     | mittelstark, Blütenstrauch, herrliche Einzelpflanze        | 1.50                       |
| " <b>spinosa</b> (L.), Schlehe, Schwarzdorn, Europa . .       | klein, eiförmig, gekerbt, grün                                      | weiß, dicht besät, April-Mai   | ziemlich stark, sparrig, dornig, für Gruppen. Vogelschutz  | 0.40                       |
| " <b>triloba fl. pl.</b> (hort.), gefülltblühende Mandel-K. . | länglich, gekerbt, hellgrün   | rosa, dicht gefüllt, ähnl. kleinen Rosen, April-Mai, sehr reichblühend | schwach, Vorstrauch, vorzüglich zum Treiben                | 1.—                        |
| <b>Ptelea</b> (L.), Lederblume                                |   |  |  |                            |
| " <b>trifoliata</b> (L.), gemeine L., Mittelamerika . . . .   | gefiedert, glänzend grün  | grünlichweiße Dolentrauben, Juni                                       | mittelstark, f. Gruppen                                    | 0.60                       |
| " <b>aurea</b> (Behnsch) . .                                  | gelb, gefiedert   | do.  | do.  | 1.—                        |
| <b>Pterocarya</b> (Kth.), Flügelnuß                           |   |  |  |                            |
| " <b>caucasica</b> (C. A. Mey) kaukasische F. . . . .         | sehr groß, gefiedert, grün  | walzenförmige Käpchen, Mai   | stark, f. Gruppen, leidet sehr durch Spälfrost             | 1.—                        |
| " <b>sorbifolia</b> (S.&Z.), vogelbeerblätter. F., Japan . .  | etwas schmalere, grüne Blätter                                      | do.  | do.  | 1.—                        |
| <b>Quercus</b> (L.), Eiche                                    |   |  |  |                            |
| " <b>Cerris</b> (L.), Zerr.-E., Orient, Südeuropa . . .       | tief eingeschnitten, grün, filzig behaart                           | —  | siehe auch Alleebäume stark, für Gruppen                   | 1.50                       |
| " <b>coccinea</b> (Wangh.), Scharlach-E., Nordamerika . .     | tief fiederspaltig gelappt, grün, färben im Herbst schön rot        | —  | ziemlich stark, für Gruppen                                | 1.50                       |
| " <b>palustris</b> (Dur.), Sumpfscharlach-E., Nordamerika     | breitlänglich, tief fiederspaltig, grün, Herbstfärbung scharlachrot | —  | stark, für baumartige Gruppen                              | 1.—                        |
| " <b>pedunculata</b> (Ehrh.), Stiel-E., Europa . . .          | gekerbt, grün   | —  | stark, für Baumgruppen, Waldanlagen                        | 0.80                       |
| " <b>Concordia</b> (hort.) . .                                | goldgelb  | —  | schwach, für Gruppen, Solitär                              | 2.50                       |
| " <b>fastigiata</b> (Lam.) . .                                | gekerbt, grün   | —  | ziemlich stark, schmal, Solitär, bildet monumentale Säulen | 2.50                       |
| " <b>fol. arg.-pictis</b> (hort.)                             | teils grün, teils ganz weiß, teils weiß gefleckt                    | —  | ziemlich stark, für Gruppen, Solitär                       | 2.—                        |
| " <b>fol. maculatis</b> (hort.)                               | gelblich weiße Spitzen oder gelblich weiß gefleckt                  | —  | ziemlich stark, für Gruppen, Solitär                       | 2.—                        |
| " <b>nigricans</b> (hort.) . .                                | junge Blätt. dunkelrot, später bräunlich                            | —  | do.  | 2.—                        |
| " <b>pectinata</b> (hort.) . .                                | kammartig eingeschnitten, grün                                      | —  | ziemlich stark, für Gruppen, Solitär                       | 2.—                        |
| " <b>pendula</b> s. Trauerb.                                  |   |  |  |                            |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                        | Art und Zeit der Blüte  | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                                      | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|---|---|---|----------------------------|
| <b>Quercus</b>  |   |   |   |                            |
| „ <b>pedunculata rubicunda</b> (hort.) . . . . .                            | blutrot, bläulich schimmernd                      | —   | ziemlich stark, für Gruppen, Solitär                                      | 2.—                        |
| „ <b>rubra</b> (L.), amerikan. Rot-E. . . . .                               | groß, hellgrün, im Herbst schön rot               | —   | sehr stark, für baumartige Gruppen  | 1.—                        |
| <b>Rhamnus</b> (L.), Kreuzdorn, Faulbaum, Wegdorn                           |   |   |   |                            |
| „ <b>alaternus</b> immergrüner W. . . . .                                   | steif, lederartig, immergrün                      | weißlichgrün, Mai-Juni  | sparrig, schwach  | 0.60                       |
| „ <b>catartica</b> (L.), gemeiner W., Europa . . . . .                      | oval, grün  | weißlichgrün, 3—6 gebüschelt, Mai-Juni Beeren schwarz                   | mittelstark, meist dornig, für Gruppen, Schatten, Vogelschutz             | 0.40                       |
| „ <b>Frangula</b> (L.), gemeiner F., Europa . . . . .                       | rund, grün  | Blüten wie vorige, Beeren violett-schwarz                               | ziemlich stark, weiß punktierte Rinde, für Gruppen, Schatten, Vogelschutz | 0.40                       |
| „ <b>imerefina</b> (Koehn.), kaukasischer W. . . . .                        | 12—15 cm lang, hellgrün                           | —   | schwach, Vorstrauch   | 0.80                       |
| „ <b>Purshiana</b> (D. C.), Pursh. F., Mittelamerika . . . . .              | breit oval, lederartig, grün                      | weiß, 3—8 blütige Dolden  | ziemlich stark, für Gruppen   | 0.80                       |
| <b>Rhododendron</b> s. immergrüne Gehölze                                   |   |   |   |                            |
| <b>Rhodotypus</b> (S. u. Z.), Scheinkerrie                                  |   |   |   |                            |
| „ <b>kerrioides</b> (S. u. Z.), japanische Sch. . . . .                     | eiförmig, hellgrün                                | weiß, Mai, Steinbeere schwarz   | schwach, Vorstrauch   | 0.45                       |
| <b>Rhus</b> (L.), Sumach, Perückenstrauch                                   |   |   |   |                            |
| „ <b>Cotines</b> (L.), gemeiner P., Südeuropa . . . . .                     | rund, ganzrandig, grün                            | grünlich weiße, große, federige Rispe                                   | mittelstark, f. Gruppen   | 0.50                       |
| „ <b>glabra</b> (L.), kahler S. . . . .                                     | groß, gefiedert, grün, färben im Herbst schön rot | gelblich weiß, weich, scharlachrot, behaart, Juli-August, dichte Rispen | ziemlich stark, für Gruppen   | 0.80                       |
| „ „ <b>laciniata</b> (Carr.) . . . . .                                      | do., tief eingeschnitten                          | do.   | schwach, Vorstrauch   | 1.—                        |
| „ <b>typhina</b> (L.), Hirschkolben S. . . . .                              | groß, gefiedert, grün, rote Herbstfärbung         | do.   | ziemlich stark, wollige Rinde, für Gruppen                                | 0.80                       |
| <b>Ribes</b> (L.), Johannisbeere, Stachelbeere                              |   |   |   |                            |
| „ <b>alpinum</b> (L.), Alpen-J., Europa . . . . .                           | klein, dreilappig, grün                           | grünl. weiße Traub., Mai  | schwach, Vorstrauch, vorzüglich für Schatten                              | 0.50                       |
| „ <b>arboreum</b> (hort.) . . . . .   | fast wie Stachelbeere                             | grünlich-weiß   | dorniger Strauch, Beeren schwarz  | 0.60                       |
| „ <b>aureum</b> (Purs.), schwarzfrüchtige Goldtraube, Nordamerika . . . . . | tief dreilappig, grün                             | gelbe Trauben, April-Mai, schwarze eßbare Beeren                        | stark, für Gruppen, Schatten  | 0.40                       |
| „ <b>floridum</b> (L'Hérit.), reichblütige J., Nordamerika . . . . .        | drei- bis fünflappig, grün, färben im Herbst rot  | grünlich weiße Trauben, schwarze Beeren                                 | mittelstark, f. Gruppen   | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter | Art und Zeit der Blüte                     | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                      | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|----------------------------|--|---|----------------------------|
| <b>Ribes</b>  |                            |  |   |                            |
| „ <b>Gordonianum</b> (Lem.)   | tief, dreilappig, grün     | rötlich gelbe Trauben                      | mittelstark, unregelmäßig, etwas überhängend, für Gruppen | 0.50                       |
| „ <b>nigrum aureum</b> (hort.)                                      | gelbbunt                   | unansehnlich                               | mittelstark   | 0.50                       |
| „ <b>sanguineum</b> (Pursh.), rotblühende J., Nordamerika . . . . . | drei- bis fünflappig, grün | rote Trauben, April, blaue Beeren          | mittelstark, für Gruppen                                  | 0.50                       |
| „ „ <b>albidum</b> (Pax.), weißblühende J. . . . .                  | do.                        | weiße Trauben, April                       | do.   | 0.50                       |
| „ „ <b>atrorubens</b> (hort.)                                       | do.                        | dunkelrote Trauben                         | do.   | 0.50                       |
| „ „ <b>fl. pl.</b> (hort.) . . . .                                  | do.                        | schön gefüllt                              | do.   | 0.50                       |
| <b>Robinia</b> (L.), Robinie  |                            |  | siehe auch Alleeabäume                                    |                            |
| „ <b>dubia decaisneana</b> (hort.) . . . . .                        | unpaarig gefiedert, grün   | rosafarbene, hängende Trauben, Juni        | stark, für Gruppen  | 1.—                        |
| „ <b>hispida</b> (L.), borstige R., Nordamerika . . . . .           | do.                        | do. sehr reichblühend                      | mittelstark, steifborstig behaart, Vorstrauch             | 1.—                        |
| „ <b>inermis</b> s. Rob. Pseudac. umbraculifera                     |                            |  |   |                            |
| „ <b>neomexicana</b> (A. Gray), neumexikanische R. . .              | gefiedert, grün, filzig    | rosarote, hängende Trauben, Juni-Aug.      | stark, dornig, baumartige Gruppen                         | 1.—                        |
| „ <b>Pseudacacia</b> (L.), gemeine R., östl. Ver. Staaten . . . . . | unpaarig gefiedert, grün   | weiße, hängende Traube, Mai-Juni           | stark, dornig, f. Gruppen Waldpflanzung                   | 0.40                       |
| „ „ <b>angustifolia</b> (hort.), feinzweigige R. . . . .            | klein, gefiedert, grün     | weiße Traube, Juni-Aug.                    | schwach, feinzweigig, kugelig, für Gruppen, Solitär       | 1.—                        |
| „ „ <b>aurea</b> (hort.) . . . .                                    | gefiedert, gelb            | do.  | schwach, für Gruppen, Solitär                             | 1.—                        |
| „ „ <b>Bessoniana</b> (hort.)                                       | gefiedert, grün            | do.  | stark, kugelförmig, baumartige Gruppen                    | 1.—                        |
| „ „ <b>pendula</b> siehe Trauerbäume                                |                            |  |   |                            |
| „ „ <b>pyramidalis</b> (Petř u. Kirch) . . . . .                    | unpaarig gefiedert, grün   | weiß                                       | ziemlich stark, schmal, für Gruppen, Solitär              | 1.—                        |
| „ „ <b>semperflorens</b> (hort.)                                    | do.                        | weiße häng. Traub., Juni-Sept., reichblüh. | stark, dornig, baumartige Gruppen                         | 1.—                        |
| „ „ <b>umbraculifera</b> (D. C.), Kugelakazie . . . . .             | do.                        | —  | schwach, kugelig, für Gruppen                             | 1.—                        |
| „ <b>viscosa</b> (Vent.), klebrige R., Nordamerika . . . . .        | do.                        | rosafarb. hängende Trauben, Juni-Aug.      | ziemlich stark, Rinde klebrig, baumartige Gruppen         | 1.—                        |
| <b>Rosa</b> siehe Rosen   |                            |  |   |                            |
| <b>Rubus</b> (L.), Himbeere, Brombeere                              |                            |  |   |                            |
| „ <b>canadensis</b> (L.), kanadische B. . . . .                     | ziemlich groß, fünfzählig  | weiß bis rosa, Frucht schwarz              | ca. 3 m hoch  | 0.80                       |
| „ <b>fruticosus fl. albo pl.</b> (hort.) . . . . .                  | 3—5 zählig, grün           | weiß, gefüllt, Juni-Aug.                   | zieml. stark, kriechend, f. Felsen u. Böschungen          | 1.—                        |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                                       | Art und Zeit der Blüte  | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen  | Straucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|--|---|---|----------------------------|
| <b>Rubus</b>  |  |   |   |                            |
| „ <b>fruticosus fl. roseo pl.</b><br>(hort.) . . . . .                          | 3—5 zählig, grün   | rosa, gefüllt,<br>Juni-Aug.                                   | zieml. stark, kriechend,<br>f. Felsen u. Böschungen                                 | 1.—                        |
| „ <b>idaeus</b> (L.), gemeine H.,<br>nördl. gemäßigte Zone . .                  | gefiedert, grün  | weiße Doldentraub.,<br>Mai-Juni, Frucht rot                   | mittelstark,<br>für Böschungen  | 0.40                       |
| „ <b>odoratus</b> (L.), wohl-<br>riechende H., Northwest-<br>amerika . . . . .  | fünflappig, rundlich,<br>grün                                    | hellrosa, behaart,<br>Juni-August,<br>Frucht rot              | 1—1,50 m hoch, für<br>Gruppen   | 0.50                       |
| „ <b>phoenicolasius</b> (Max.)<br>rotborstige H., Japan . .                     | dunkelgrün, unter-<br>seits silbergrau,<br>filzig                | hellrosa Dolden-<br>trauben, Frucht<br>gelblichrot            | mittelstark, über-<br>hängend, für Gruppen  | 1.—                        |
| „ <b>sorbifolius</b> (Max.), Erd-<br>beerhimbeere . . . . .                     | gefiedert, grün  | weiß, Juli-Aug.,<br>Frucht scharlachrot,<br>genießbar         | Halbstaude, treibt Aus-<br>läufer, Vorstrauch, für<br>Gruppen und Ein-<br>fassungen | 0.40                       |
| „ <b>vulgaris</b> (W. & N.), ge-<br>meine B., Europa . . . .                    | grün, unterseits<br>graugrün                                     | weiße Trauben, Juni<br>Frucht schwarz                         | stark, dornig,<br>kriechend, f. Böschung,<br>Vogelschutz                            | 0.40                       |
| <b>Salix</b> (L.), Weide . . . . .  |  |   | siehe Trauer- u. Allee-<br>bäume  |                            |
| „ <b>alba vitellina britzensis</b><br>(Späth.) . . . . .                        | lanzettförmig, grün,<br>unterseits hellgrün                      | —   | mittelstark, Zweige rot,<br>für Gruppen, Teich-<br>ränder                           | 0.60                       |
| „ „ <b>vitellina pendula</b> . .  | do.  | —   | stark, gelbe, über-<br>hängende Zweige, für<br>Gruppen, Teichränder                 | 0.50                       |
| „ <b>babylonica</b> (L.), Trauer-<br>W., China, Japan . . . .                   | lanzettförmig, grün,   |   | ziemlich stark, über-<br>hängend, für Gruppen,<br>Teichränder                       | 0.70                       |
| „ <b>caprea</b> (L.), Sahl-W.,<br>Europa, Asien . . . . .                       | oval, feingezähnt,<br>grün, filzig                               | zahlreiche weiße<br>und gelbe Käpchen<br>im Frühjahr          | stark, für Gruppen,<br>Teichränder  | 0.40                       |
| „ „ <b>pendula</b> . . . . .  |  |   | siehe Trauerbäume   |                            |
| „ <b>daphnoides</b> (Vill.), Reif-<br>W., Europa . . . . .                      | lanzettförmig, grün,<br>unterseits blaugrün                      | weißgelbe Käpchen   | stark, Zweige weiß<br>bereift, für Gruppen  | 0.40                       |
| „ <b>purpurea pendula</b><br>(hort.), amerikanische<br>Trauer-W. . . . .        | schmal lanzettlich,<br>hellgrün                                  | —   | mittelstark, über-<br>hängend, für Fels-<br>gruppen                                 | 0.50                       |
| „ <b>repens rosmarinifolia</b><br>(W. Koch), rosmarinblättr.<br>Weide . . . . . | schmal, lanzett-<br>förmig, grün, unter-<br>seits silberglänzend | —   | schwach, Vorstrauch   | 0.60                       |
| <b>Sambucus</b> (L.), Hollunder   |  |   |   |                            |
| „ <b>canadensis</b> (L.), kana-<br>disch. H. . . . .                            | unpaarig gefiedert,<br>hellgrün                                  | weiße, flache Schein-<br>dolden, Beere rot,<br>später schwarz | stark, für Gruppen,<br>Schatten   | 0.40                       |
| „ „ <b>maxima</b> (Hesse) . .   | hellgrün   | auffallende<br>30—40 cm große<br>Blütendolden                 | stark   | 0.60                       |
| „ <b>Ebulus</b> (L.), Zwerg-H. .  | unpaarig gefiedert,<br>grün                                      | weißlichrote Schein-<br>dolden, duftend,<br>Beeren rot        | ca. 1 m hoch, bis an<br>die Erde zurück-<br>frierend, für Gruppen                   | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                       | Art und Zeit der Blüte                            | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen             | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|--|---|--|----------------------------|
| <b>Sambucus</b>   |  |   |  |                            |
| " <b>nigra</b> (L.), schwarzer H., Europa, Asien . . .                            | unpaarig gefiedert, grün                         | gelblichweiß, Juni, Beeren schwarz                | stark, für Gruppen, Schatten, Vogelschutz        | 0.40                       |
| " " <b>fl. roseo pl.</b> (hort.) .  | do.  | weißrosa, gefüllte Scheindolden, Juni             | mittelstark, f. Gruppen                          | 0.40                       |
| " " <b>fol. luteis</b> (hort.) . .  | grün austreibend, später goldgelb                | gelblichweiß, Beeren schwarz                      | do.  | 0.40                       |
| " " <b>fol. var.</b> (hort.) . . .  | unpaarig gefiedert, weiß oder gelbbunt           | do.   | do.  | 0.40                       |
| " " <b>fructu albo</b> (Burgst.)  | grün, gefiedert                                  | Beeren weiß                                       | mittelstark                                      | 0.50                       |
| " " <b>laciniata</b> (hort.) . .  | grün, eingeschlißt                               | Beeren schwarz                                    | mittelstark, f. Gruppen                          | 0.40                       |
| " " <b>pyramidalis</b> (hort.) .  | grün, gefiedert, dichtsiehend                    | do.   | mittelstark, pyramidal, für Gruppen              | 0.50                       |
| " " <b>var. pulverulentis albis</b> (hort.) . . . . .                             | weißpunktiert                                    | weiß, Mai   | mittelstark                                      | 0.50                       |
| " <b>racemosa</b> (L.) gemeiner Trauben-H., Europa, Sibirien . . . . .            | grün, gefiedert                                  | weiße Rispen, Mai Beeren scharlachrot             | stark, für Gruppen Schatten, Vogelschutz         | 0.40                       |
| " " <b>laciniata</b> (D. Koch) .  | grün, fein geschlißt                             | do.   | ziemlich stark, für Gruppen                      | 0.60                       |
| " " " <b>aurea</b> (hort.) . . .  | zierlich geschlißt, goldgelb                     | do.   | mittelstark, f. Gruppen, Halbschatten            | 1.20                       |
| <b>Shepherdia</b> (Nutt.), Büffelbeere  |  |   |  |                            |
| " <b>argentea</b> (Nutt.), Silber-B., Kolorado . . . . .                          | schmal länglich, graugrün, unterseits silberweiß | klein, gelblich, erscheinen vor den Blättern      | ziemlich stark, für Gruppen                      | 1.—                        |
| <b>Sophora</b> (L.), Sophore  |  |   |  |                            |
| " <b>japonica</b> (L.), japan. S.   | gefiedert, grün                                  | gelblichweiße, lange Rispen, Juni-Juli            | mittelstark, Holz frischgrün, für Gruppen        | 0.50                       |
| " " <b>pendula</b> sieh. Trauerb.   |  |   |  |                            |
| <b>Sorbaria</b> (A. Braun), Fieder-Spierstrauch                                   |  |   |  |                            |
| " <b>Lindleyana</b> (Max.) (Spi-raea Lindleyana Wall.), Lindleys F., Himalaja . . | groß, unpaarig gefiedert, grün                   | weiße Rispen, Juli                                | mittelstark, für Gruppen                         | 0.50                       |
| " <b>sorbifolia</b> (A. Braun), gemeiner F., Nordostasien                         | unpaarig gefiedert, grün                         | weiße Risp., Jun-Juli                             | do.  | 0.50                       |
| <b>Sorbus</b> (L.), Vogel-, Mehl- oder Elsbeere, Eberesche                        |  |   | siehe auch Alleebäume                            |                            |
| " <b>americana</b> (Marsh.), amerikanische E. . . . .                             | gefiedert, fein gesägt, grün                     | weiße Doldentraub., Mai-Juni, Frucht scharlachrot | mittelstark, gedrun-gen, dickzweigig, f. Gruppen | 1.—                        |
| " <b>Aria</b> (Crantz), gemeine M., Europa, Asien . . . .                         | länglich eirund, graugrün, unterseits silberweiß | weiße Doldentraub., Mai                           | mittelstark, für Gruppen                         | 0.70                       |
| " " <b>lutescens</b> (hort.) . . .  | länglich eiförmig, silberweiß, filzig            | do.   | mittelstark, pyramidal, für Gruppen, Solitär     | 1.—                        |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat                                      | Form und Farbe der Blätter                      | Art und Zeit der Blüte                             | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                        | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|---|--|---|----------------------------|
| <b>Sorbus</b>   |   |  |   |                            |
| " <b>aucuparia</b> (L.), Eberesche, Europa, Sibirien        | gefiedert, grün                                 | weiße Doldentrauben, Frucht rot                    | stark, für Gruppen, Vogelschutz                             | 0.40                       |
| " " <b>fructu luteo</b> (hort.)                             | unpaarig gefiedert, hellgrün                    | weiße Dolden, Mai-Juni, Frucht gelb                | fast stark, für baumartige Gruppen                          | 1.—                        |
| " " <b>moravica</b> (Zengerl.), süße, eßbare E., Mähren     | do.   | do., Frucht eßbar, wird zu Einmachzwecken verwandt | fast stark, für Gruppen                                     | 1.—                        |
| " " <b>pendulasiehe</b> Trauerb.                            |   |  |   |                            |
| " <b>domestica</b> (L.), Speierling . . . . .               | grün, gefiedert, unterseits weißfilz.           | weiß. Dolden, Frucht gelbrot, eßbar                | schwach   | 1.—                        |
| " <b>scandica</b> (Fries.), nordische M., Europa            | tiefgelappt, filzig, grün, unterseits hellgrau  | weiße Doldentraub., Mai, Frucht gelblich braunrot  | mittelstark, f. Gruppen                                     | 1.—                        |
| <b>Spartium</b> (L.). Pfrieme                               |   |  |   |                            |
| " <b>junceum</b> (L.). Besenpfrieme, Südeuropa . . .        | meist ohne Blätter                              | gelb, einfach, Juni-September                      | bis 1 m hoch, binsenähnliche, laubgrüne Zweige, für Gruppen | 0.80                       |
| <b>Spiraea</b> (L.), Spierstrauch                           |   |  |   |                            |
| " <b>albiflora</b> (Miq.), weißblühender Sp., Japan . .     | länglich lanzettförmig, grün, ungleich gesägt   | weiße Dolden, Juli-August                          | schwach, Vorstrauch   | 0.40                       |
| " <b>arguta</b> (Zab.), scharfgezählter Sp. . . . .         | klein, grün, scharf gesägt                      | weiß, Mai, außergerwöhnlich reichblühend           | do.   | 0.60                       |
| " <b>arifolia</b> siehe <i>Holodiscus</i>                   |   |  |   |                            |
| " <b>bella</b> (Sims.), schöner Sp.                         | lanzettförmig, grün, unterseits graugrün        | rosa Doldentrauben, Juni-Juli                      | ziemlich stark, für Gruppen                                 | 0.45                       |
| " <b>cantonensis</b> (Lour.), Cantonscher Sp., China, Japan | länglich, ungleich gesägt, grün                 | weiße Trauben, Juni                                | schwach, friert häufig stark zurück, Vorstrauch             | 0.40                       |
| " " <b>lanceata</b> (Zab.) . . .                            | do.   | weiß, gefüllt                                      | schwach, Vorstrauch   | 0.50                       |
| " <b>Douglasii</b> (Hook.), Douglas Sp. . . . .             | schmal, eilängl., hellgrün, unterseits weißgrau | rosa, lange, dichte Rispen, Juli-Aug.              | ziemlich stark, für Gruppen                                 | 0.40                       |
| " <b>japonica atrosanguinea</b> (hort.) . . . . .           | lanzettförmig, grün                             | dunkelrote Doldentrauben, Juni-Juli                | ziemlich stark, junge Zweige dunkelrot, für Gruppen         | 0.40                       |
| " " <b>macrophylla</b> (Sim. L. fr.) . . . . .              | sehr groß, hellgrün und gelblich rot            | rosa Doldentrauben, Juni-Juli                      | mittelstark, f. Gruppen                                     | 0.40                       |
| " <b>Lindleyana</b> s. <i>Sorbaria</i>                      |   |  |   |                            |
| " <b>Menziesii Billardii</b> (Bill.)                        | schmal, länglich, ungleich gesägt, grün         | rosa, dichtblütige Rispen, Juni-Juli               | do.   | 0.40                       |
| " " <b>Triumphans</b> (hort.) .                             | do.   | purpurrosa, do.                                    | do.   | 0.40                       |
| " <b>nudiflora</b> (Zab.), nacktblütige Sp. . . . .         | eilanzettförmig, gesägt, grün                   | weißlichrosa, Juni, reichblühend                   | do.   | 0.70                       |
| " <b>opulifolia</b> } siehe                                 |   |  |   |                            |
| " " <b>aurea</b> } <i>Physocarpus</i>                       |   |  |   |                            |
| " <b>pruinosa</b> (hort.) . . . .                           | graugrün  | hellrosa, Juli                                     | stark, 2 m hoch   | 0.50                       |
| " <b>prunifolia fl. pl.</b> (hort.)                         | klein, glänzend grün                            | weiß, dicht gefüllt, April-Mai                     | schwach, Vorstrauch   | 0.60                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter                            | Art und Zeit der Blüte                                    | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen              | Sträucher 1 Stück M. |
|--|---|---|---|----------------------|
| <b>Spiraea</b>   |   |   |   |                      |
| " <i>pumila atrorosea</i> (Zab.), (Sp. Bum. Anth. Waterer)                         | lanzettl., grün, öfter gelblich weißbunt              | dunkelrote Doldentrauben, Juni-Juli                       | schwach, Vorstrauch                               | 0.50                 |
| " " <i>Bumalda</i> (Zab.) . . .  | do.   | hellrot, do.  | do.   | 0.40                 |
| " " <i>Froebelii</i> (Froeb.) . .  | lanzettlich grün                                      | hellrot, do   | do.   | 0.40                 |
| " <i>salicifolia</i> (L.), weidenblättrige Sp., Europa . .                         | schmal, lanzettförmig, grün                           | hellrosa Rispen, Juni-Juli                                | mittelstark, für Gruppen                          | 0.40                 |
| " <i>Thunbergii</i> (Sieb.), Thunbergs Sp., China, Japan .                         | schmallineal, klein, grün                             | weiß, sehr reichblühend, früher wie andere <i>Spiraea</i> | schwach, Vorstrauch                               | 0.50                 |
| " <i>tristis</i> (Zab.), unansehnlicher Sp. . . . .                                | lanzettförmig, gesägt, grün                           | weißrosa, Mai-Juni  | mittelstark, Zweige etwas hängend, f. Grupp.      | 0.40                 |
| " <i>Vanhouttei</i> (Briot.), Van Houttes Sp. . . . .                              | eiförmig, gekerbt, grün                               | weiße Doldentraub., sehr reichblühend                     | mittelstark, für Gruppen                          | 0.40                 |
| <b>Staphylea</b> (L.), Pimpernuß   |   |   |   |                      |
| " <i>colchica</i> (Stev.), kaukasische P. . . . .                                  | fünfteilig, grün                                      | weiße, hängende Trauben, Mai, Samenkapsel sehr auffällig  | mittelstark, für Gruppen                          | 0.70                 |
| " <i>pinnata</i> (L.), gemeine P., Mitteleuropa . . . . .                          | do.   | weiß, etwas kleiner blühend                               | do.   | 0.50                 |
| <b>Stephanandra</b> (S. & Z.), Kranzspiere   |   |   |   |                      |
| " <i>incisa</i> (Zab.), (S. flexuosa S. & Z.), eingeschnittene K., Japan . . . . . | fiederlappig, eingeschnitten, grün                    | weiße, zusammengesetzte Trauben, Juni                     | bis 1 m hoch, leicht überhängend, Vorstrauch      | 0.60                 |
| <b>Symphoricarpus</b> (Juss.), Schneebeere   |   |   |   |                      |
| " <i>occidentalis</i> (Hook.), westliche Sch., Nordamerika                         | oval bis länglich, dunkel blaugrün, unterseits heller | rötlich weiße, hängende Ähren, Juni-Juli, Beeren weiß     | schwach, leicht überhängend, Vorstrauch, Schatten | 0.50                 |
| " " <i>Heyeri</i> (Dieck), Heyers Schneeb. . . . .                                 | hellgrün, unterseits weißbläulich grün                | lebhaftrosa, hängende Ähren, Juli-Aug., Beeren weiß       | schwach, Vorstrauch, Schatten                     | 0.50                 |
| " <i>orbiculatus</i> (Mch.), kreisblättr. Sch., Kanada . .                         | rundlich, eiförmig, grün                              | blaßrosa, August-Sept., Beeren klein, dunkelrot           | 1 m hoch, buschig, Vorstrauch, Schatten           | 0.40                 |
| " <i>racemosa</i> (Mch.), gemeine Sch., Nördl. Amerika                             | rundlich oval, bläulich dunkelgrün, unterseits heller | hellrote Ähren, Juli-Sept., Beeren weiß, kirschengroß     | mittelstark, buschig, für Gruppen, Schatten       | 0.40                 |
| <b>Syringa</b> (L.), Flieder   |   |   |   |                      |
| " <i>chinensis</i> (Wild.), chinesischer F. . . . .                                | länglich, spitz, grün                                 | hellviolette Rispen, Mai-Juni                             | schwach, oft überhängend, Vorstrauch              | 0.70                 |
| " <i>Emodi</i> (Wall.), Emodi F., Himalaja . . . . .                               | eilänglich, lederartig, grün                          | lilaweiße Rispen, Juni                                    | mittelstark, gedungen, für Gruppen                | 0.70                 |
| " <i>Josikaea</i> (Jacq. f.), ungarischer F. . . . .                               | lanzettlich, dunkelgrün, unterseits weißlich graugrün | dunkelviolette, lange, schmale Rispen, Juni               | mittelstark, für Gruppen                          | 0.70                 |
| " <i>persica</i> (L.), persischer F.   | eilanzettlich, grün                                   | rosa Rispen, Mai  | schwach, etwas sparrig, Vorstrauch                | 0.70                 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Name, Autor und Heimat                                      | Form und Farbe der Blätter    | Art und Zeit der Blüte                   | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen          | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| <b>Syringa</b>  |                               |  |   |                            |
| " <b>Rothomagensis</b> siehe chinensis                      |                               |  |   |                            |
| " <b>vulgaris</b> (L.), gemeiner F.                         | länglich,herzförmig grün      | lila Rispen, Mai-Juni                    | ziemlich stark, für Grupp., Blütenstrauch     | 0.50                       |
| " " <b>alba</b> (Dietr.), gemeiner, weißblühender F. . . .  | do.                           | weiße Rispen, Mai-Juni                   | do.   | 0.60                       |
| " " <b>alba grandiflora</b> (hort.) . . . . .               | do.                           | do., größer wie vorige                   | do.   | 1.—                        |
| " " <b>Andenken a. L. Späth</b> (Späth) . . . . .           | do.                           | dunkelrote Rispen                        | do., zum Treiben                              | 1.—                        |
| " " <b>Charles X</b> (hort.) . . . .                        | do.                           | violette Rispen                          | do.   | 1.—                        |
| " " <b>fl. pl. Alphonse Lavallée</b> (Lem.) . . . . .       | do.                           | bläulichrosa, gefüllt                    | ziemlich stark, für Grupp., Blütenstrauch     | 1.—                        |
| " " <b>fl. pl. Charles Joly</b> (Lem.) . . . . .            | do.                           | dunkelrot, gefüllt                       | do.   | 1.20                       |
| " " <b>fl. pl. Mad. Abel Châtenay</b> (Lem.) . . . . .      | do.                           | weiß, gefüllt, mittelgroße Rispen        | do.   | 1.—                        |
| " " <b>fl. pl. Mad. Casimir Perrier</b> (Lem.) . . . . .    | do.                           | do.                                      | do., zum Treiben                              | 1.—                        |
| " " <b>fl. pl. Mad. Lemoine</b> (Lem.) . . . . .            | do.                           | weiße, große, dichte Rispen              | ziemlich stark                                | 1.—                        |
| " " <b>fl. pl. Michel Buchner</b> (Lem.) . . . . .          | do.                           | lila, dicht gefüllt                      | do.   | 1.—                        |
| " " <b>fl. pl. Président Grévy</b> (Lem.) . . . . .         | do.                           | lilarosa Rispen, sehr groß und breit     | do.   | 1.—                        |
| " " <b>fl. pl. Tournefort</b> (Lem.) . . . . .              | do.                           | hellrötlich lila, dichte gefüllte Rispen | do.   | 1.—                        |
| " " <b>Frau Bertha Dammann</b> (L. Späth) . . . .           | do.                           | weiße, sehr große Rispen                 | do.   | 1.—                        |
| " " <b>Marie Legraye</b> (van Htte.) . . . . .              | do.                           | weiße große Rispen                       | do., zum Treiben                              | 1.—                        |
| <b>Tamarix</b> (L.), Tamariske .                            |                               |  |   |                            |
| " <b>chinensis</b> (Lour.), chinesische T. . . . .          | lebhaft grün, schuppenförmig  | rosa Ähren, Mai-Juni                     | mittelstark, für Gruppen                      | 0.50                       |
| " " <b>plumosa</b> (hort.) . . . .                          | do, dicht geschlossen         | do.                                      | do.   | 0.60                       |
| " <b>gallica</b> (L.), fünf männige T., Südeuropa . . . . . | blaugrau-grün, schuppenförmig | rosa Ähren, Mai-Juli                     | do.   | 0.50                       |
| " <b>hispida aestivalis</b> (hort.)                         | hellgrün                      | lebhaft karminrot, Juli                  | die Zweige sind überreich mit Blüten bedeckt  | 1.—                        |
| " <b>Odessana</b> (Stev.), russische T., Odessa . . . . .   | graugrün, schuppenförmig      | rosa Ähren, Juni-August                  | mittelstark, für Gruppen                      | 0.50                       |
| " <b>tetrandra</b> (Pal.) viermännige T. . . . .            | lebhaft grün                  | hellrosa, Ende Mai                       | stark, bis 5 m hoch                           | 0.60                       |
| <b>Tecoma</b> s. Schlingpflanzen                            |                               |  |   |                            |
| <b>Teucrium</b> (L.), Gamander                              |                               |  |   |                            |
| " <b>Chamaedrys</b> (L.), gemein. G., Europa, Nordasien .   | immergrün                     | rot, reichblühend, Juni-September        | niedrig. Busch, für Felsgruppen, Einfassungen | 0.50                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> bei Abnahme von 10, um 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub> bei Abnahme von 100, um 30<sup>0</sup>/<sub>0</sub> bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



*Ulmus montana fastigiata* (hort.)



*Populus nigra* var. *pyramidalis*.



| Name, Autor und Heimat  | Form und Farbe der Blätter                               | Art und Zeit der Blüte                     | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen                                      | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|---|--|--|---|----------------------------|
| <b>Tilia</b> (L.), Linde  |  |  | siehe auch Alleebäume   |                            |
| „ <b>alba</b> siehe Trauerbäume   |  |  |   |                            |
| „ <b>americana</b> (L.), Schwarz-<br>Linde . . . . .                        | sehr groß, gezähnt,<br>herzförmig                        | —  | für baumartige<br>Gruppen   | 1.—                        |
| „ <b>argentea</b> s. <b>tomentosa</b>                                       |  |  |   |                            |
| „ <b>dasystyla</b> siehe <b>rubra</b><br><b>euchlora</b>                    |  |  |   |                            |
| „ <b>grandifolia</b> (Ehrh.), groß-<br>blättrige L., Mitteleuropa           | breiteiförmig, grün                                      | grünlichgelb, Juni                         | stark, pyramidal, für<br>baumartige Gruppen                               | 0.70                       |
| „ <b>intermedia</b> s. <b>vulgaris</b>                                      |  |  |   |                            |
| „ <b>parvifolia</b> (Ehrh.), klein-<br>blättrige L., Europa . . .           | kreisrund bis breit-<br>eiförmig, gekerbt,<br>dunkelgrün | grünlich gelb,<br>reichblühend             | unregelmäßig, für<br>Gruppen, Hecken und<br>Lauben                        | 0.80                       |
| „ <b>rubra euchlora</b> (C.Koch),<br>Krim.-L. . . . .                       | tiefgrün, glänzend                                       | grünlichgelb, Juli                         | zieml. stark, f. Gruppen,<br>Hecken und Lauben                            | 1.—                        |
| „ <b>tomentosa</b> (Mnch.), un-<br>garische Silber-L. . . .                 | groß, weißfilzig   | weißlich, Juli                             | für baumartig. Gruppen<br>pyramidal                                       | 1.—                        |
| „ <b>vulgaris</b> (Hayne), groß-<br>blättr. holländische L.                 | breiteiförmig  | grünlich, Juni-Juli                        | stark, für Gruppen  | 0.70                       |
| <b>Ulex</b> (L.), Stechginster  |  |  |   |                            |
| „ <b>europaeus</b> (L.), gemeiner<br>Stechg. . . . .                        | stechende Blatt-<br>stiele                               | goldgelb, Mai                              | sparrig, dornig,<br>schwach wachsend,<br>in Töpfen                        | 0.80                       |
| <b>Ulmus</b> (L.), Ulme, Rüster   |  |  | siehe auch Allee- und<br>Trauerbäume                                      |                            |
| „ <b>americana</b> siehe Alleeb.  |  |  |   |                            |
| „ „ <b>aurea</b> (hort.) . . . .  | breiteiförmig, scharf<br>gesägt, goldgelb                | —  | stark, für Gruppen  | 1.20                       |
| „ <b>campestris</b> (L.), Feld-U.,<br>Europa . . . . .                      | eiförmig, grün   | —  | stark, korkige Rinde,<br>für baumartig. Gruppen                           | 0.50                       |
| „ „ <b>monumentalis</b> (Rinz)  | eiförmig, grün   | —  | mittelstark, fast<br>kugelig, für Gruppen                                 | 1.20                       |
| „ „ <b>umbraculifera</b>  |  |  | siehe Alleebäume  |                            |
| „ <b>glabra corylifolia pur-<br/>purea</b> (hort.) . . . .                  | eiförmig, dunkelrot                                      | —  | ziemlich stark, für<br>Gruppen  | 1.20                       |
| „ „ <b>vegeta</b> (Loud.), Hun-<br>tingdon od. Chichester<br>Ulme . . . . . | hellgrün   | —  | stark, baumartige<br>Gruppen  | 1.20                       |
| „ <b>montana Dampieri Wre-<br/>dei</b> (hort.) . . . . .                    | goldgelb   | —  | schwach, pyramidal,<br>Solitär  | 1.80                       |
| „ „ <b>fastigiata</b> (hort.),<br>Exeter-U. s. Abbildung                    | dunkelgrün,<br>charakteristisch die<br>Zweige umgebend   | —  | ziemlich stark, dick-<br>triebzig, baumart., bildet<br>monumentale Säulen | 1.80                       |
| „ „ <b>lutescens vanHouttei</b><br>(hort.) . . . . .                        | eiförmig, goldgelb                                       | —  | ziemlich stark, für<br>Gruppen, Solitär                                   | 1.50                       |
| „ „ <b>superba</b> (hort.) . . .  | sehr groß,<br>glänzend grün                              | —  | stark, baumartig  | 1.20                       |
| <b>Viburnum</b> (L.), Schneeball  |  |  |   |                            |
| „ <b>americanum</b> (Mill.),<br>amerikanischer Sch. . .                     | eiförmig,<br>dreilappig, grün                            | weiße Scheindold.,<br>Mai-Juni, Beeren rot | 1,50—2 m hoch, für<br>Gruppen   | 0.60                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Name, Autor und Heimat   | Form und Farbe der Blätter                      | Art und Zeit der Blüte                   | Wuchs, erreichbare Höhe; Bemerkungen           | Sträucher<br>1 Stück<br>M. |
|--|---|--|--|----------------------------|
| <b>Viburnum</b>  |   |  |  |                            |
| " <b>dentatum</b> (L.), gezähnt-blättr. Sch., Nordamerika      | eilänglich, stark gezähnt, hellgrün             | weiß, Juni-Juli, Beeren schwarz          | mittelstark, für Gruppen                       | 0.60                       |
| " <b>Lantana</b> (L.), wolliger Sch., südl. Europa, Orient     | groß, dunkelgrün, unterseits grau, stark filzig | weiß, Mai-Juni, Beeren schwarz           | mittelstark, f. Gruppen, Schatten              | 0.40                       |
| " <b>Lentago</b> (L.), krausstielig. Sch., Kanada . . . . .    | eiförmig, meist wellig, grün                    | weiß, Juli, Beeren schwarzblau, bereift  | mittelstark, für Gruppen                       | 0.70                       |
| " <b>Opulus</b> (L.), gemeiner Sch., Europa . . . . .          | eirund, dreilappig, grün                        | weiß, Mai, Beeren rot                    | mittelstark, f. Gruppen, Schatten, Vogelschutz | 0.40                       |
| " " <b>pygmaeum</b> (hort.) . . . . .                          | grün  | gelbl.-weiß, Mai-Juni                    | gedrungen, sehr schwach                        | 0.70                       |
| " " <b>sterile</b> (Schmidt), gefüllter Sch. . . . .           | do.   | weiße, kugelige Scheind., Mai-Juni       | mittelstark, für Gruppen                       | 0.60                       |
| " <b>tomentosum</b> (Thbg.), filz. Sch., Japan, China          | eiförmig, grün, gerippt                         | weiße Scheindold., Mai-Juni              | 1—2 m hoch, breit, für Gruppen                 | 1.—                        |
| " " <b>sterile</b> (hort.) (V. pl-<br>catum hort.) . . . . .   | do.   | weiße, kugelförm. Scheindolden, Mai-Juni | do.  | 1.20                       |
| <b>Vinca</b> , siehe Schlingpflanzen                           |   |  |  |                            |
| <b>Virgilia</b> , siehe Cladrastis                             |   |  |  |                            |
| <b>Weigelia</b> , siehe Diervilla                              |   |  |  |                            |
| <b>Xanthoceras</b> (Bge.), Gelb-<br>holz                       |   |  |  |                            |
| " <b>sorbifolia</b> (Bge.), eber-<br>eschenblättr. G., China . | gefiedert, grün                                 | weiße, große Trauben, Mai-Juni           | schwach, Vorstrauch                            | 1.20                       |



DAHS, REUTER & CO.  
JÜNGSFELD.

Viburnum tomentosum sterile (hort.)



### Ein Sortiment schöner, buntblättriger Gehölze.

|                                  |                                 |                             |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Acer in Sorten                   | Fagus silv. purpurea u. major   | Quercus ped. fol. arg.-var. |
| Amygdalus Persica atropurp.      | Ligustrum ovalifol. aur.-var.   | " " nigricans               |
| Berberis vulgaris atropurpurea   | Philadelphus coronarius aur.    | Sambucus nigra fol. luteis  |
| Catalpa bignonioides aurea       | Physocarpus opulifolius luteus  | " " " var.                  |
| Cornus in Sorten                 | Populus alba u. alba pyramidal. | Sorbus Aria lutescens       |
| Corylus maxima atropurpurea      | Prunus Myrobalana purpurea      | Ulmus in Sorten             |
| Diervilla florida nana fol. var. | Ptelea trifoliata aurea         |                             |
| Elaeagnus in Sorten              | Quercus ped. Concordia          |                             |

### Ein Sortiment schöner Blütensträucher.

|                             |                            |                        |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Amelanchier in Sorten       | Genista tinctoria          | Malus in Sorten        |
| Amygdalus Persica rosea pl. | Hedysarum multijugum       | Philadelphus in Sorten |
| Berberis Darwinii           | Hibiscus in Sorten         | Prunus in Sorten       |
| Calycanthus floridus        | Holodiscus discolor        | Ribes in Sorten        |
| Ceanothus in Sorten         | Hydrangea panic. grandifl. | Robinia in Sorten      |
| Chaenomeles in Sorten       | Hypericum in Sorten        | Rubus odoratus         |
| Clethra alnifolia           | Jasminum in Sorten         | Sorbaria in Sorten     |
| Crataegus fl. pl. in Sorten | Indigofera Gerardiana      | Spiraea in Sorten      |
| Cytisus in Sorten           | Kerria in Sorten           | Syringa in Sorten      |
| Deutzia in Sorten           | Laburnum in Sorten         | Staphylea in Sorten    |
| Diervilla in Sorten         | Lespedeza Sieboldii        | Viburnum in Sorten     |
| Exochorda grandiflora       | Ligustrum sinensis         | Xanthoceras sorbifolia |
| Forsythia in Sorten         | Lonicera in Sorten         |                        |

### Gehölze mit roter Herbstfärbung.

|                               |                                  |                       |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Acer Ginnala                  | Cotoneaster horizontalis         | Quercus coccinea      |
| Amelanchier canadensis        | " Simonsii                       | " palustris und rubra |
| Amygdalus nana georgica       | Diervilla florida nana fol. var. | Rhus in Sorten        |
| Aronia floribunda             | Evonymus europaea                | Ribes floridum        |
| Berberis Aquifolium           | Liquidambar styraciflura         | Viburnum americanum   |
| " Thunbergii                  | Parrotia persica                 | " Opulus              |
| Cornus tatarica var. sibirica | Pyracantha coccinea              |                       |

### Empfehlenswerte Schattensträucher.

|                            |                       |                            |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Buxus in Sorten            | Ligustrum ovalifolium | Phillyrea Vilmoriniana     |
| Carpinus Betulus           | " Regelianum          | Rhamnus in Sorten          |
| Clethra alnifolia          | " vulgare             | Rhododendron ponticum      |
| Cornus, alle grünen Sorten | Lonicera Ledebouri    | Ribes alpinum              |
| Corylus Avellana           | " Xylosteum           | Rubus odoratus             |
| Cotoneaster in Sorten      | Mespilus germanica    | Sambucus nigra             |
| Cydonia vulgaris           | Osmanthus Aquifolium  | " racemosa                 |
| Evonymus europaea          | Prunus Laurocerasus   | Symphoricarpos orbiculatus |
| Fagus sylvatica            | " Padus               | " racemosa                 |
| Fontanesia phillyreoides   | " serotina            | Syringa vulgaris           |
| Ilex in Sorten             | " virginiana          | Viburnum Lantana           |

# Gehölze zur Anlage von Zierhecken und Lauben.

|                           |                                  |                              |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Acanthopanax pentaphyllum | Crataegus coccinea               | Myrica asplenifolia          |
| Acer campestre            | " monogyna                       | Osmanthus Aquifolium         |
| Berberis Aquifolium       | " " rubra pl.                    | Philadelphus coronar. aureus |
| " buxifolia nana          | Diervilla florida nana fol. var. | " " nanus                    |
| " vulgaris atropurpurea   | Fagus silvatica                  | Platanus occidentalis        |
| Buxus arborescens         | " " purpurea                     | Prunus Myrobalana purpurea   |
| " sempervir. und Hand-    | Forsythia suspensa und           | Rubus sorbifolius            |
| worthei                   | viridissima                      | Spiraea albiflora            |
| Carpinus Betulus          | Gleditschia triacanthos          | " pumila atrorosea           |
| Caryopteris Mastacanthus  | Hedera arborea                   | " " Froebelii                |
| Chaenomeles japonica      | Hippophaë rhamnoides             | Syringa chinensis            |
| Cornus mas                | Hydrangea paniculata grandifl.   | " vulgaris                   |
| " paniculata              | Hypericum calycinum              | Teucrium Chamaedrys          |
| " sanguinea               | Kerria japonica fl. pl.          | Tilia parvifolia             |
| Corylus Avellana          | Ligustrum ovalifolium            | " rubra euchlora             |
| " Columna                 | " sinensis und                   | Ulmus campestris             |
| " maxima atropurpurea     | vulgare                          | " montana fastigiata         |
| Cotoneaster Simonsii      | Malus Scheideckeri               |                              |

# Gehölze für Vogelschutzanlagen.

|                      |                         |                            |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Berberis Aquifolium  | Evonymus europaea       | Ribes aureum               |
| " vulgaris           | Gleditschia triacanthos | " nigrum                   |
| Carpinus Betulus     | Hippophaë rhamnoides    | Rubus idaeus               |
| Chaenomeles japonica | Ligustrum vulgare       | " vulgaris                 |
| Cornus alba          | Lonicera Ledebouri      | Sambucus nigra             |
| " mas                | " Xylosteum             | " racemosa                 |
| " sanguinea          | Lycium halimifolium     | Sorbus aucuparia           |
| Corylus Avellana     | Mespilus germanica      | " scandica                 |
| Cotoneaster Simonsii | Philadelphus coronarius | Symphoricarpos orbiculatus |
| Crataegus Carrièrei  | Prunus Mahaleb          | " racemosa                 |
| " coccinea           | " Myrobalana            | Viburnum americanum        |
| " monogyna           | " serotina              | " Lantana                  |
| Cydonia vulgaris     | " spinosa               | " Opulus                   |
| Deutzia crenata      | Rhamnus Frangula        |                            |





# Zier-Halbstämme

Sortenbeschreibung siehe Seite 71—105.

|  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| <i>Acanthopanax ricinifolium</i> . . . . .                 | 1.50          | 14.—         | <i>Laburnum vulgare</i> . . . . .                            | 1.30          | 12.—         |
| <i>Acer campestre</i> . . . . .                            | 1.30          | 12.—         | <i>Ligustrum ovalifolium</i> aur.-var. . . . .               | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>Negundo</i> . . . . .                                 | 1.30          | 12.—         | <i>Liriodendron Tulipifera</i> . . . . .                     | 2.—           | 19.—         |
| „ „ <i>arg.-var.</i> . . . . .                             | 1.50          | 14.—         | <i>Malus baccata</i> . . . . .                               | 1.30          | 12.—         |
| „ „ <i>aur.-var.</i> . . . . .                             | 1.50          | 14.—         | „ <i>floribunda</i> . . . . .                                | 1.30          | 12.—         |
| „ „ <i>Odessanum</i> . . . . .                             | 1.50          | 14.—         | „ <i>Scheideckeri</i> . . . . .                              | 1.30          | 12.—         |
| „ <i>platanoides</i> Reitenbachi . . . . .                 | 1.50          | 14.—         | <i>Morus alba</i> . . . . .                                  | 1.80          | 17.—         |
| „ „ <i>Schwedleri</i> . . . . .                            | 1.50          | 14.—         | <i>Paulownia tomentosa</i> . . . . .                         | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>Pseudoplatanus albo-var.</i> . . . .                  | 1.50          | 14.—         | <i>Populus alba</i> . . . . .                                | 1.30          | 12.—         |
| „ „ <i>atropurpureum</i> . . . . .                         | 1.50          | 14.—         | „ „ <i>pyramidalis</i> . . . . .                             | 1.80          | 17.—         |
| „ „ <i>Leopoldi</i> . . . . .                              | 1.50          | 14.—         | „ <i>canadensis aurea</i> . . . . .                          | 1.50          | 14.—         |
| „ „ <i>Worléei</i> . . . . .                               | 1.50          | 14.—         | „ <i>nigra</i> var. <i>pyramidalis</i> . . . . .             | 1.30          | 12.—         |
| <i>Amygdalus Persica rosea</i> pl. . . . .                 | 2.—           | 19.—         | <i>Prunus avium</i> fl. pl. . . . .                          | 1.50          | 14.—         |
| „ „ <i>atropurpurea</i> . . . . .                          | 2.—           | 19.—         | „ <i>Chamaecerasus globosa</i> . . . . .                     | 1.50          | 14.—         |
| <i>Aralia chinensis</i> var. <i>mandschurica</i> . . . . . | 1.50          | 14.—         | „ <i>japonica glandulosa</i> fl. albo pl. . . . .            | 1.50          | 14.—         |
| <i>Betula papyracea</i> . . . . .                          | 1.20          | 10.—         | „ „ „ fl. roseo pl. . . . .                                  | 1.50          | 14.—         |
| <i>Caragana Chamlagu</i> . . . . .                         | 1.50          | 14.—         | „ <i>intermedia semperflorens</i> . . . . .                  | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>jubata</i> . . . . .                                  | 1.50          | 14.—         | „ <i>Myrobalana purpurea</i> . . . . .                       | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>microphylla</i> . . . . .                             | 1.50          | 14.—         | „ <i>triloba</i> fl. pl. . . . .                             | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>pygmae arenaria</i> . . . . .                         | 1.50          | 14.—         | <i>Quercus pedunculata</i> <i>Concordia</i> . . . . .        | 2.50          | 23.—         |
| „ <i>spinosa</i> . . . . .                                 | 1.50          | 14.—         | „ „ <i>nigricans</i> . . . . .                               | 2.50          | 23.—         |
| <i>Castanea vesca</i> . . . . .                            | 1.30          | 12.—         | <i>Robinia hispida</i> . . . . .                             | 1.50          | 14.—         |
| „ „ <i>arg.-var.</i> . . . . .                             | 2.—           | 19.—         | „ <i>neomexicana</i> . . . . .                               | 1.50          | 14.—         |
| <i>Catalpa bignonioides</i> . . . . .                      | 1.30          | 12.—         | „ <i>Pseudacacia angustifolia</i> . . . . .                  | 1.50          | 14.—         |
| „ „ <i>aurea</i> . . . . .                                 | 1.80          | 17.—         | „ <i>viscosa</i> . . . . .                                   | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>hybr. atropurpurea</i> . . . . .                      | 2.—           | 19.—         | <i>Salix caprea pendula</i> . . . . .                        | 1.50          | 14.—         |
| <i>Celtis occidentalis</i> . . . . .                       | 1.50          | 14.—         | „ <i>purpurea pendula</i> . . . . .                          | 1.50          | 14.—         |
| <i>Cornus alba arg.-var.</i> . . . . .                     | 1.50          | 14.—         | <i>Sorbus americana</i> . . . . .                            | 1.50          | 14.—         |
| „ „ <i>Späthi</i> . . . . .                                | 1.50          | 14.—         | „ <i>Aria lutescens</i> . . . . .                            | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>sanguinea arg.-var.</i> . . . . .                     | 1.50          | 14.—         | „ <i>aucuparia fructu luteo</i> . . . . .                    | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>tatarica</i> var. <i>sibirica arg.-marg.</i> . . . .  | 1.50          | 14.—         | „ „ <i>moravica</i> . . . . .                                | 1.50          | 14.—         |
| <i>Cotoneaster Simonsii</i> . . . . .                      | 1.50          | 14.—         | „ <i>scandica</i> . . . . .                                  | 1.50          | 14.—         |
| <i>Crataegus Carrièrei</i> . . . . .                       | 1.30          | 12.—         | <i>Syringa vulgaris</i> in 12 veredelten<br>Sorten . . . . . | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>monogyna fastigiata</i> . . . . .                     | 1.30          | 12.—         | <i>Ulmus americana aurea</i> . . . . .                       | 1.50          | 14.—         |
| „ „ <i>rubra</i> pl. . . . .                               | 1.30          | 12.—         | „ <i>campestris arg.-var.</i> . . . .                        | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>oxyacantha alba</i> pl. . . . .                       | 1.30          | 12.—         | „ „ <i>monumentalis</i> . . . . .                            | 1.50          | 14.—         |
| <i>Cytisus capitatus</i> . . . . .                         | 1.50          | 14.—         | „ „ <i>Rueppellii</i> . . . . .                              | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>hirsutus</i> . . . . .                                | 1.50          | 14.—         | „ <i>glabra corylifolia purpurea</i> . . . . .               | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>nigricans</i> . . . . .                               | 1.50          | 14.—         | „ <i>montana Dampieri Wredei</i> . . . . .                   | 1.50          | 14.—         |
| „ <i>purpureus</i> . . . . .                               | 1.50          | 14.—         | „ „ <i>fastigiata</i> . . . . .                              | 2.—           | 19.—         |
| <i>Deutzia crenata rubra plena</i> . . . . .               | 1.30          | 12.—         | „ „ <i>lutescens van Houttei</i> . . . . .                   | 1.50          | 14.—         |
| <i>Diervilla intermedia alba</i> . . . . .                 | 1.30          | 12.—         | <i>Viburnum Opulus sterile</i> . . . . .                     | 1.50          | 14.—         |
| <i>Fagus silvatica purpurea</i> . . . . .                  | 2.20          | 20.—         | „ <i>tomentosum sterile</i> . . . . .                        | 1.50          | 14.—         |
| <i>Halimodendron argenteum</i> . . . . .                   | 1.50          | 14.—         | <i>Wistaria polystachya</i> in Töpfen . . . . .              | 4.—           | 36.—         |
| <i>Hydrangea paniculata grandiflora</i> . . . . .          | 1.50          | 14.—         |  |               |              |
| <i>Laburnum Adami</i> . . . . .                            | 1.50          | 14.—         |  |               |              |



# Allee- und Zierbäume.

Stärkere Alleeabäume sind regelmäßig verpflanz. — Werden auch schwächere — bis zu 12 cm — verpflanz gewünscht, so erhöht sich der Preis hierfür um 25 %.

Preise per 1000 Stück auf Anfrage.

Der Stammumfang ist 1 m vom Boden gemessen.

| Name und Autor  | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form            | Bemerkungen   | Stamm-<br>umfang<br>cm                   | 1 Stück<br>M.                       | 10 St.<br>M.                         | 100 St.<br>M.                             |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Acanthopanax</b> , Stach.-Kraft-<br>wurz (Dcsne. u. Planch.) |  |   |  |                                     |                                      |   |
| „ <b>ricinifolium</b> (Dcsne. und<br>Planch.)                   | schwach, aufrecht,<br>Blätter tief einge-<br>schnitten         | schöner Solitärbaum   | 14—16<br>16—18                           | 5.—<br>6.50                         | 48.—<br>60.—                         |   |
| <b>Acer</b> (L.), Ahorn   |  |   |  |                                     |                                      |   |
| „ <b>campestre</b> (L.), Feld-A.                                | schwach,<br>Blätter klein                                      | unempfindlich gegen<br>Rauch und Staub,<br>für enge Straßen       | 10—12<br>12—14                           | 3.—<br>4.—                          | 27.—<br>36.—                         | 220.—<br>330.—                            |
| „ <b>dasycarpum</b> (Ehrh.),<br>Silber-Ahorn . . . . .          | stark, aufrecht,<br>Blätter unterseits<br>silberig             | empfehlenswerter<br>Alleebaum, weniger<br>für windige Straßen     | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.80<br>2.20<br>2.50<br>4.—<br>5.—  | 16.—<br>20.—<br>24.—<br>36.—<br>45.— | 140.—<br>180.—<br>220.—<br>340.—<br>400.— |
| „ <b>laetum rubrum</b> (Kirch.)                                 | schwach, pyramidal,<br>junge Blätter rot                       | für enge Straßen<br>und guten Boden<br>bei geschützter Lage       | 10—12                                    | 3.—                                 | 27.—                                 | 230.—                                     |
| „ „ <b>viride</b> (Hesse) . . .                                 | grünblättrig   |   | 12—14                                    | 4.—                                 | 36.—                                 | 330.—                                     |
| „ <b>Negundo</b> (L.), Eschen-A.                                | mittel, breitkronig  |   | 14—16                                    | 5.50                                | 50.—                                 | 450.—                                     |
| „ „ <b>arg.-var.</b> (Bon.) . .                                 | mittel, breitkronig  | verlangt vor Wind<br>geschützten Stand                            | 8—10<br>10—12                            | 1.50<br>1.80                        | 14.—<br>17.—                         | 130.—<br>160.—                            |
| „ „ <b>aur.-var.</b> (Kirch.) . .                               | schwach, weißbunt  | Solitär   | 8—10                                     | 2.—                                 | 19.—                                 | 180.—                                     |
| „ „ <b>Odessanum</b> (T.Rothe)                                  | schwach, gelbbunt  |   |  |                                     |                                      |   |
| „ „ <b>pennsylvanicum</b> (L.),<br>Pennsylvan.-A. . . . .       | schwach, goldgelb  |   |  |                                     |                                      |   |
| „ „ <b>platanooides</b> (L.),<br>Spitzahorn . . . . .           | mittelstark, Blätter<br>rund, gezähnt, grün                    | Rinde auffallend weiß<br>gestreift                                | 10—12<br>12—14                           | 3.—<br>4.—                          | 27.—<br>36.—                         |   |
| „ „ <b>globosum</b> (Nichol.) .                                 | stark,<br>spitzblättrig, grün                                  | für breite Straßen,<br>ziemlich unempfindlich<br>gegen Rauch usw. | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.50<br>2.—<br>2.50<br>3.—<br>4.—   | 14.—<br>17.—<br>22.—<br>27.—<br>38.— | 120.—<br>150.—<br>200.—<br>260.—<br>360.— |
| „ „ <b>Lorbergi</b> (v. Htte. und<br>Schwer.) . . . . .         | schwach, kugelig   | sehr empfehlenswert<br>für enge Straßen                           | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 2.50<br>3.—<br>4.—                  | 23.—<br>27.—<br>36.—                 | 200.—<br>240.—<br>340.—                   |
| „ „ <b>Reitenbachi</b> (Nichol)                                 | Blätter glänzend<br>grün, tief gelappt                         | empfehlenswert für<br>Alleen                                      | 10—12<br>12—14                           | 3.—<br>4.—                          | 27.—<br>36.—                         |   |
| „ „ <b>Schwedleri</b> (C.Koch.)                                 | mittel, Blätter<br>bräunlich-rot                               | empfehlenswert für<br>alle Zwecke                                 | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 2.50<br>3.—<br>4.—<br>5.—           | 22.—<br>27.—<br>36.—<br>45.—         | 180.—<br>220.—<br>340.—<br>400.—          |
| „ <b>Pseudoplatanus</b> (L.),<br>Bergahorn . . . . .            | mittel, pyramidal,<br>blutrot austreibend,<br>später bräunlich | do.   | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 2.50<br>3.—<br>4.—<br>5.—           | 22.—<br>27.—<br>36.—<br>45.—         | 180.—<br>220.—<br>330.—<br>400.—          |
| „ <b>Pseudoplatanus</b> (L.),<br>Bergahorn . . . . .            | stark, breit,<br>grün, stumpfblättrig                          | unempfindlich gegen<br>Rauch, für exponierte<br>Lagen             | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.50<br>2.—<br>2.50<br>3.50<br>4.50 | 14.—<br>17.—<br>22.—<br>30.—<br>40.— | 120.—<br>140.—<br>180.—<br>260.—<br>350.— |



| Name und Autor  | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form                   | Bemerkungen  | Stamm-<br>umfang<br>cm           | 1 Stück<br>M.               | 10 St.<br>M.                 | 100 St.<br>M.                    |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Acer</b>   |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>Pseudoplatanus atropurpureum</i> (Späth)           | unterseits dunkelrot  | gute Solitär und<br>Alleeabäume  | 8—10                             | 2.50                        | 22.—                         | 180.—                            |
| „ „ <i>Leopoldi</i> (Lem.) . . .                        | mittel, buntblättrig,   |  | 10—12                            | 3.—                         | 27.—                         | 220.—                            |
|   |   |  | 12—14                            | 4.—                         | 36.—                         | 330.—                            |
| „ „ <i>Worléei</i> (Ohlend.) . .                        | gelbblättrig  |  | 14—16                            | 5.—                         | 45.—                         | 400.—                            |
| <b>Aesculus</b> (L.), Roßkastanie                       |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>Hippocastanum</i> (L.),<br>weißblühende R. . . .   | stark, breit, dichtbe-<br>laubt, weißblühend                          | treibt sehr früh aus,<br>nur für freie Lagen,<br>verliert sonst sehr früh<br>die Blätter | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.—<br>2.50<br>3.50<br>4.50 | 17.—<br>22.—<br>32.—<br>40.— | 150.—<br>200.—<br>280.—<br>350.— |
| „ „ fl. pl. (hort.), gefüllt-<br>blühende R. . . . .    | stark, pyramidal,<br>gefülltblühend                                   | trägt keine Früchte,<br>sehr zu empfehlen für<br>breite Straßen in freien<br>Lagen       | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.50<br>3.—<br>4.—<br>5.—   | 22.—<br>27.—<br>36.—<br>45.— | 200.—<br>240.—<br>320.—<br>400.— |
| „ <i>rubicunda</i> (Lois.), rot-<br>blühende R. . . . . | mittelstark, breit-<br>kronig, rotblühend                             | für freie Lagen zu<br>empfehlen  | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.60<br>3.20<br>3.80<br>5.— | 24.—<br>30.—<br>36.—<br>45.— | 230.—<br>290.—<br>340.—<br>400.— |
| <b>Ailantus</b> (Desf.), Götterbaum                     |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>glandulosa</i> (Desf.) . . .                       | stark, breitkronig,<br>ungewöhnlich lange<br>Fiederblätter            | junge Bäume frost-<br>empfindlich, gut für<br>Trottoirbepflanzung                        | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.30<br>3.—<br>3.80<br>5.—  | 22.—<br>27.—<br>36.—<br>45.— | 200.—<br>260.—<br>340.—          |
| <b>Alnus</b> (Gärtn.), Erle                             |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>glutinosa</i> (Gärtn.),<br>Schwarzerle . . . . .   | stark, aufrecht   | für feuchte Lagen  | 8—10<br>10—12<br>12—14           | 1.50<br>1.80<br>2.20        | 14.—<br>17.—<br>21.—         | 130.—<br>160.—<br>200.—          |
| „ <i>incana</i> (Borkh.), Weißerle                      | stark, aufrecht,<br>Blätter graugrün                                  | gedeiht auch noch in<br>trockenen Lagen  | 14—16<br>16—18                   | 3.—<br>3.50                 | 27.—<br>33.—                 | 260.—<br>300.—                   |
| <b>Betula</b> (L.), Birke                               |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>papyracea</i> (Ait.), Papier-<br>Birke. . . . .    | mittel, Rinde bei<br>ältern Bäumen<br>blendendweiß                    | sehr empfehlenswert<br>für mittlere Straßen  | 8—10<br>10—12                    | 2.—<br>2.40                 | 18.—<br>22.—                 | 160.—<br>200.—                   |
| „ <i>pubescens atropur-<br/>purea</i> (hort.) . . . . . | ganz schwach, rot-<br>blättrig  | —  | 8—10                             | 3.—                         | 27.—                         |                                  |
| „ <i>verrucosa</i> (Ehrh.), Weiß-<br>Birke . . . . .    | Hängebirke, im<br>Alter weißrindig                                    | schöner Baum für breite<br>Straßen und Friedhöfe   | 8—10<br>10—12                    | 2.—<br>2.40                 | 18.—<br>22.—                 | 160.—<br>200.—                   |
| „ „ <i>elegans laciniata</i> . . .                      | schwach, leicht<br>bezweigt   | Solitär- und Gruppen-<br>baum  | 8—10<br>10—12                    | 2.50<br>3.—                 | 22.—<br>27.—                 |                                  |
| <b>Caragana</b> (Lam.), Erbsen-<br>strauch              |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>arborescens</i> (L.) . . .                         | kleinkronig, frisch-<br>grün belaubt                                  | für Gruppen  | 8—10<br>10—12                    | 1.50<br>1.80                | 14.—<br>17.—                 | 130.—<br>160.—                   |
| <b>Carpinus</b> (L.), Hainbuche                         |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>Betulus</i> (L.) . . . . .                         | mittelstark, breit-<br>kronig   | sehr gut für schattige<br>Lagen  | 10—12                            | 2.60                        | 24.—                         | 220.—                            |
| <b>Carya</b> (Nutt.), Bitternuß                         |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>amara</i> (Nutt.) . . . . .                        | stark, fiedelblättrig   | für Gruppen  | 8—10<br>10—12                    | 2.20<br>3.—                 | 20.—<br>27.—                 |                                  |
| <b>Castanea</b> (Mill.), Kastanie                       |   |  |                                  |                             |                              |                                  |
| „ <i>vesca</i> (Ginr.), Edel-K.                         | stark, glänzend-<br>grüne, gezähnte<br>Blätter, Frucht ge-<br>nießbar | für geschützte Lagen,<br>weil frostempfindlich,<br>guter Schattenbaum<br>an Sitzplätzen  | 10—12<br>12—14<br>14—16          | 2.60<br>3.—<br>3.80         | 24.—<br>27.—<br>36.—         | 220.—<br>260.—<br>340.—          |

| Name und Autor  | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form     | Bemerkungen  | Stamm-<br>umfang<br>cm                                     | 1 Stück<br>M.                       | 10 St.<br>M.                         | 100 St.<br>M.                             |
|---|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Castanea</b>   |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>vesca heterophylla</b><br>(hort.) . . . . .            | wievorstehende, mit<br>tief geschl. Blättern            | für geschützte Lagen   | 12—14<br>14—16   | 4.—<br>5.—                          | 36.—<br>45.—                         |   |
| <b>Catalpa</b> (Scop.), Trompeten-<br>baum                  |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>bignonioides</b> (Walt.) .                             | mittel, breitkronig,<br>sehr reichblühend               | guter Allee- und<br>Gruppenbaum                              | 10—12<br>12—14   | 2.—<br>2.60                         | 19.—<br>25.—                         | 180.—                                     |
| " <b>aurea</b> (hort.) . . . .                              | schwach, goldig<br>belaubt                              | Solitär  | 10—12  | 2.50                                | 23.—                                 |   |
| " <b>Kaempferi</b> (S. & Z.) . .                            | mittelstark   | für Gruppen  | 10—12  | 2.—                                 | 18.—                                 |   |
| <b>Corylus</b> (L.), Hasel                                  |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>Columna</b> (L.), Baum-H.                              | mittel, pyramidal,<br>weißgraue, korkige<br>Rinde       | unempfindlich gegen<br>Rauch, sehr<br>empfehlenswert         | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18                           | 3.—<br>3.50<br>4.—<br>5.—           | 28.—<br>33.—<br>38.—<br>45.—         | 250.—<br>300.—<br>350.—<br>400.—          |
| <b>Cotoneaster</b> (Med.), Zwerg-<br>mispel                 |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>multiflora</b> (Bge.), vielblu-<br>mige Z. . . . .     | schwach, sparrig,<br>Blüten weiß im Mai,<br>Früchte rot | Solitär und Gruppenb.  | 10—12  | 3.—                                 | 28.—                                 |   |
| <b>Crataegus</b> (L.), Weißdorn                             |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>Carrièrei</b> (Vauv.) . . .                            | ziemlich stark,<br>Blätter glänzend                     | gut für mittlere Straßen                                     | 8—10<br>10—12<br>12—14                                     | 1.80<br>2.20<br>3.—                 | 17.—<br>21.—<br>28.—                 | 160.—<br>200.—<br>260.—                   |
| " <b>monogyna rubra pl.</b><br>(hort.), gefülltbl. Rotdorn  | bekannt,<br>mittelstark, kugelig                        | für enge<br>Straß., s.<br>zierend,<br>überall zu<br>empfehl. | Stammh. 2m<br>7—8<br>8—10<br>" 2,50 "<br>" 2,50 "<br>10—12 | 1.50<br>1.80<br>2.—<br>3.—          | 14.—<br>17.—<br>19.—<br>28.—         | 130.—<br>160.—<br>180.—<br>260.—          |
| " <b>oxyacantha alba pl.</b><br>(hort.), gefülltbl. . . . . | Weißdorn, mittelst.                                     | für Gruppen und Alleen                                       | 7—8<br>8—10  | 1.50<br>2.—                         | 14.—<br>19.—                         | 130.—<br>180.—                            |
| <b>Fagus</b> (L.), Rotbuche, Buche                          |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>silvatica</b> (L.), gemeine<br>Rotbuche . . . . .      | stark, aufrecht,<br>grünblättrig                        | Park- und Alleebaum<br>auch für schattige Lage               | 10—12  | 2.60                                | 24.—                                 | 220.—                                     |
| " <b>purpurea</b> (Ait.),<br>Blutbuche . . . . .            | stark, rotblättrig,<br>Sämling                          | für Gruppen  | 8—10<br>10—12<br>12—14                                     | 2.50<br>3.—<br>3.50                 | 24.—<br>27.—<br>32.—                 | 220.—<br>260.—                            |
| " <b>major</b> veredelte<br>Blutbuche . . . . .             | mittel, dunkelrot,<br>großblättrig                      | Solitär  | 8—10<br>10—12<br>12—14                                     | 3.30<br>4.—<br>5.—                  | 32.—<br>38.—<br>48.—                 | 300.—                                     |
| <b>Fraxinus</b> (L.), Esche . . . .                         |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>americana</b> (L.), Weiß-E.                            | stark, aufrecht,<br>fiederblättrig                      | für breite Straßen   | 10—12<br>12—14<br>14—16                                    | 1.80<br>2.20<br>3.50                | 17.—<br>20.—<br>32.—                 | 160.—<br>180.—<br>300.—                   |
| " <b>excelsior</b> (L.), gemeine E.                         | stark, aufrecht,  | für Landstraßen  | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>12—14<br>14—16<br>16—18          | 1.50<br>2.—<br>2.50<br>3.50<br>4.50 | 13.—<br>17.—<br>22.—<br>33.—<br>43.— | 110.—<br>140.—<br>200.—<br>300.—<br>400.— |
| " <b>Ornus</b> (L.), Blumen-E. .                            | mittel, ziemlich breit                                  | reichblühend, sehr<br>guter Alleebaum                        | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18                   | 1.80<br>2.40<br>3.—<br>4.—<br>5.50  | 17.—<br>22.—<br>27.—<br>38.—<br>50.— | 160.—<br>200.—<br>260.—<br>360.—          |
| <b>Gleditschia</b> (L.), Gleditschie                        |   |  |  |                                     |                                      |   |
| " <b>triacanthos</b> (L.), dreidorn-<br>nige G. . . . .     | mittelstark,<br>breitkronig                             | Gruppenbaum  | 8—10<br>10—12  | 2.—<br>2.50                         | 18.—<br>23.—                         | 160.—                                     |
| " <b>inermis</b> (D. C.) . . . .                            | do.   | do.  | 8—10<br>10—12  | 2.—<br>2.50                         | 18.—<br>23.—                         |   |



| Name und Autor  | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form  | Bemerkungen   | Stamm-<br>umfang<br>cm                   | 1 Stück<br>M.                     | 10 St.<br>M.                         | 100 St.<br>M.                             |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Laburnum</b> (Grsb.)Goldregen  |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>Adami</b> (P. & K.), Adams G.  | mittel   | interessanter Farben-<br>wechsel in den Blüten                                      | 8—10                                     | 2.—                               | 18.—                                 |   |
| „ <b>vulgare</b> (Grsb.)gemein.G.   | —  | Gruppenbaum   | 8—10<br>10—12                            | 2.—<br>2.50                       | 18.—<br>23.—                         | 160.—<br>200.—                            |
| <b>Liriodendron</b> (L.), Tulpenb.  |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>Tulipifera</b> (L.), gemeiner<br>Tulpenbaum . . . . .                            | stark, große kantige<br>Blätter                      | Solitär- und Gruppen-<br>baum   | 8—10                                     | 2.50                              | 23.—                                 |   |
| <b>Malus</b> (Juss.), Apfelbaum   |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>baccata</b> (Borkh.) . . .   | Kirschäpfel<br>schwach bis<br>mittelstark            | durch Blüten und<br>Früchte sehr zierend<br>in Gruppen                              | 7—8<br>8—10                              | 1.60<br>2.—                       | 15.—<br>18.—                         | 140.—<br>160.—                            |
| „ <b>cerasifera</b> (Spach.) . .  |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ „ <b>fructu luteo</b> (hort.) .   |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>floribunda</b> (Sieb.) . . .   |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>Ringo</b> (Sieb.) . . . . .  |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>Scheideckeri</b> (Späth) .   |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>spectabilis</b> Kaido (hort.)  |  |   |  |                                   |                                      |   |
| <b>Morus</b> (L.), Maulbeerbaum   |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>alba</b> (L.), weißer M. . .   | schwach  | für Gruppen   | 7—9<br>10—12<br>12—14                    | 2.—<br>3.—<br>4.50                | 18.—<br>27.—<br>42.—                 |   |
| „ <b>nigra</b> (L.), schwarzer M.   | do.  | do.   | 7—8<br>8—10                              | 6.—<br>9.—                        | 55.—<br>80.—                         |   |
| <b>Paulownia</b> (S. & Z.),<br>Paulownie  |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>tomentosa</b> (K. Koch),<br>filzige P. . . . .                                   | mittelstark, sehr<br>groß.wollige Blätter            | für Gruppen u. Solitär,<br>geschützter Standort                                     | 10—12                                    | 2.—                               | 18.—                                 |   |
| <b>Platanus</b> (L.), Platane   |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>occidentalis</b> (L.),amerika-<br>nische P., siehe Abbildung                     | stark, aufrecht,<br>große, schön<br>geformte Blätter | einer der besten Allee-<br>bäume für breite<br>Straßen, hält das Laub<br>sehr lange | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.80<br>2.30<br>3.—<br>4.—<br>5.— | 16.—<br>20.—<br>27.—<br>38.—<br>48.— | 140.—<br>180.—<br>230.—<br>360.—<br>460.— |
| <b>Populus</b> (L.), Pappel   |  |   |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>alba</b> (L.), Silber-P. . . .   | stark, Rinde grau,<br>Blätter silberweiß             | schön für Friedhöfe<br>und Gruppen  | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 1.50<br>2.—<br>2.50               | 14.—<br>18.—<br>22.—                 | 120.—<br>150.—<br>200.—                   |
| „ „ <b>pyramidalis</b> (Bnge.)  | mittel, pyramidal                                    | do. Solitär   | 10—12                                    | 2.30                              | 20.—                                 |   |
| „ <b>balsamifera</b> (L.),Balsam-<br>Pappel . . . . .                                 | stark, Zweige<br>klebrig                             | für feuchte Lagen   | 10—12<br>12—14<br>14—16                  | 2.—<br>2.50<br>3.50               | 17.—<br>22.—<br>32.—                 | 150.—<br>180.—<br>280.—                   |
| „ <b>canadensis</b> (Mnch.),<br>kanadische P. . . . .                                 | sehr stark, breit-<br>kronig                         | für Wiesen und Ufer-<br>pflanzungen, Holz wird<br>sehr gesucht                      | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 1.50<br>2.—<br>2.50<br>3.50       | 14.—<br>17.—<br>22.—<br>32.—         | 120.—<br>150.—<br>200.—<br>280.—          |
| „ „ <b>aurea</b> (v. Geert.) . .  | mittelstark, gelb-<br>blättrig                       | Gruppenbaum   | 12—14<br>14—16<br>16—18                  | 2.50<br>3.50<br>5.—               | 23.—<br>32.—<br>45.—                 |   |
| „ <b>nigra var. pyramidalis</b><br>(Spach.), Pyramiden-P.,<br>italienische P. . . . . | schmal, aufrecht                                     | sehr schöner Allee-<br>baum für feuchte<br>Stellen                                  | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 1.60<br>2.—<br>2.80<br>3.80       | 15.—<br>18.—<br>26.—<br>36.—         | 140.—<br>170.—<br>240.—<br>340.—          |



*Platanus occidentalis* (L.)



*Robinia Pseud. Bessoniana* (hort.)



| Name und Autor   | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form                      | Bemerkungen  | Stamm-<br>umfang<br>cm                   | 1 Stück<br>M.                       | 10 St.<br>M.                         | 100 St.<br>M.                    |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Prunus (L.), Kirsche</b>  |  |  |  |                                     |                                      |                                  |
| „ <b>avium fl. pl.</b> (hort.) . . .   | schwach, reichbl.  | für Gruppen  | 8—10                                     | 1.80                                | 17.—                                 |                                  |
| „ <b>Chamaecerasus glo-</b><br><b>bosa</b> (hort.) . . . . .                               | ganz schwach,<br>kugelig   | für enge Straßen und<br>regelmäßige Gärten                                   | 8—10<br>10—12                            | 1.80<br>2.50                        | 17.—<br>23.—                         |                                  |
| „ <b>intermedia semper-</b><br><b>florens</b> (Ehrh.), Aller-<br>heiligenkirsche . . . . . | schwach,<br>feinzweigig  | Gruppenbaum  | 8—10                                     | 1.80                                | 17.—                                 |                                  |
| „ <b>Myrobalana purpurea</b><br>(Späth), [Prunus Pissardi<br>Carr.] Blutpflaume . . . .    | schwach, rotblättrig   | für Gruppen und<br>Solitär   | 7—8<br>8—10                              | 1.80<br>2.20                        | 17.—<br>20.—                         | 160.—<br>180.—                   |
| „ <b>Padus</b> (L.), gemeine<br>Trauben-K. . . . .   | zieml. starkwachs.,<br>Blätter dunkelgrün,<br>weiße Traubenblüt.         | für Alleen und Gruppen   | 8—1<br>10—12                             | 1.80<br>2.50                        | 17.—<br>23.—                         |                                  |
| „ <b>serotina</b> (Ehrh.), spätbl.<br>Trauben-K. . . . .                                   | mittelstark, breit-<br>kronig, glänzend<br>grüne, lederartige<br>Blätter | unempfindlich gegen<br>Rauch und Staub                                       | 10—12<br>12—14<br>14—16                  | 2.50<br>3.40<br>4.—                 | 23.—<br>32.—<br>38.—                 | 210.—<br>300.—                   |
| „ <b>tribola fl. pl.</b> (hort.) . .   | schwach, rosafarb.<br>gefüllte Blüten                                    | Gruppen, Solitär   | 7—8<br>8—10                              | 1.80<br>2.20                        | 17.—<br>20.—                         | 160.—<br>180.—                   |
| <b>Quercus (L.), Eiche</b>   |  |  |  |                                     |                                      |                                  |
| „ <b>Cerris</b> (L.), Zerr-E. . .  | stark, tief einge-<br>schnittene Blätter                                 | Gruppen, Solitär   | 10—12<br>14—16                           | 3.—<br>4.50                         | 28.—<br>42.—                         |                                  |
| „ <b>palustris</b> (Dur.), Sumpf-<br>Eiche . . . . .                                       | stark, sparrig, im<br>Herbst schön rot-<br>färbend                       | für breite Alleen<br>und feuchte Stellen                                     | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 3.—<br>4.—<br>4.50<br>5.50          | 27.—<br>36.—<br>42.—<br>52.—         | 230.—<br>330.—                   |
| „ <b>pedunculata</b> (Ehrh.),<br>Stiel-E. . . . .  | starkwachsende<br>einheimische Art                                       | für Alleen in freier<br>Lage, Solitärbaum                                    | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 2.50<br>3.—<br>4.—<br>5.—           | 20.—<br>27.—<br>36.—<br>45.—         | 180.—<br>220.—<br>320.—<br>400.— |
| „ „ <b>Concordia</b> (hort.) . .   | schwach, goldig<br>belaubt   | Solitär- und Gruppen-<br>baum  | 8—10                                     | 3.—                                 | 27.—                                 |                                  |
| „ <b>rubra</b> (L.), amerikanische<br>Rot-E. . . . .                                       | starkwachsend, im<br>Herbst schön rot-<br>färbend                        | sehr gesucht für breite<br>Straßen, Solitär                                  | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 3.—<br>4.—<br>4.50<br>5.50          | 27.—<br>36.—<br>42.—<br>53.—         | 230.—<br>330.—<br>400.—          |
| <b>Robinia (L.), Robinie</b>   |  |  |  |                                     |                                      |                                  |
| „ <b>dubia Decaisneana</b><br>(hort.) . . . . .  | stark, rosablühend   | Allee- und Gruppen-<br>baum  | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.80<br>2.30<br>3.—<br>3.50<br>4.50 | 17.—<br>22.—<br>27.—<br>32.—<br>40.— | 160.—                            |
| „ <b>hispida</b> (L.), borstige R.   | schwach, sparrig,<br>rosarot, reichblüh.                                 | Zweige brechen leicht,<br>für Gruppen, Solitär                               | 8—10                                     | 2.—                                 | 18.—                                 |                                  |
| „ <b>neomexicana</b> (A. Gray)   | mittelstark, fleisch-<br>farbig blühend                                  | für Gruppen  | 8—10<br>10—12                            | 2.—<br>2.50                         | 18.—<br>23.—                         |                                  |
| „ <b>Pseudacacia</b> (L.),<br>gemeine R. . . . .   | sparrig, stark   | für Gruppen  | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 1.50<br>1.80<br>2.20<br>2.80        | 14.—<br>17.—<br>21.—<br>26.—         | 130.—<br>160.—<br>200.—<br>240.— |
| „ „ <b>angustifolia</b> (hort.),<br>feinblättrige R. . . . .                               | schwach  | sehr zierlich. Alleebaum<br>empfehlenswert f. enge<br>windgeschützte Straßen | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 2.—<br>2.50<br>3.50                 | 18.—<br>23.—<br>33.—                 | 170.—<br>220.—                   |
| „ „ <b>aurea</b> (hort.) . . . .   | mittel, gelbblättrig   |  | 8—10<br>10—12                            | 2.—<br>2.50                         | 18.—<br>23.—                         |                                  |



*Tilia tomentosa* (Mnch.)



*Tilia vulgaris* (Hayne)



| Name und Autor  | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form                    | Bemerkungen  | Stamm-<br>umfang<br>cm                   | 1 Stück<br>M.                      | 10 St.<br>M.                         | 100 St.<br>M.                             |
|---|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Robinia</b>  |  |  |  |                                    |                                      |   |
| " <b>Pseudacacia Bessoni-<br/>ana</b> (hort.), Bessons<br>Kugelakazie, s. Abbild. | mittelstark, schön<br>pyramidale,<br>dichte Krone                      | einer der besten Allee-<br>bäume für Städte, un-<br>empfindlich geg. Rauch<br>und Staub, hält das<br>Laub sehr lange | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.—<br>2.50<br>3.—<br>3.80<br>4.50 | 18.—<br>22.—<br>28.—<br>36.—<br>43.— | 160.—<br>200.—<br>250.—<br>330.—<br>400.— |
| " " <b>crispa</b> (D. C.) . . .   | starkwachsend,<br>Blätter grün, kraus                                  |  | 10—12<br>12—14                           | 2.50<br>3.—                        | 23.—<br>28.—                         |   |
| " " <b>semperflorens</b> (hort.)  | stark, zweimal<br>blühend  | für Gruppen  | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 1.80<br>2.30<br>3.—                | 17.—<br>22.—<br>28.—                 | 160.—<br>200.—                            |
| " " <b>umbraculifera</b> (D.C.),<br>Kugelakazie . . . . .                         | schwach, dichte,<br>kugelige Krone                                     | sehr empfehlenswert f.<br>enge Straßen in wind-<br>geschützter Lage  | 8—10<br>10—12                            | 2.—<br>2.50                        | 18.—<br>22.—                         | 170.—<br>200.—                            |
| " <b>viscosa</b> (Vent.), klebrige<br>Robinia . . . . .                           | ziemlich stark,<br>Zweige klebrig,<br>fleischfarb. blühend             | für Gruppen  | 8—10<br>10—12                            | 1.80<br>2.50                       | 17.—<br>24.—                         |   |
| <b>Salix</b> (L.), Weide  |  |  |  |                                    |                                      |   |
| " <b>daphnoides</b> (Vill.), Reif-<br>Weide . . . . .                             | länglichspitz, grün<br>grünlichgelbe<br>Kätzchen                       | großer Baum,<br>Stamm und Zweige<br>weiß bereift   | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 1.50<br>1.80<br>2.30<br>3.—        | 14.—<br>17.—<br>20.—<br>27.—         | 130.—<br>160.—<br>180.—                   |
| " <b>repens rosmarinifolia</b><br>(W. Koch) . . . . .                             | schwach, kleinkron.<br>feinblättrig                                    | Solitär  | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 2.—<br>2.50<br>3.—                 | 19.—<br>23.—<br>27.—                 | 180.—                                     |
| <b>Sophora</b> (L.), Sophore  |  |  |  |                                    |                                      |   |
| " <b>japonica</b> (L.), japan. S. .   | schwach, Holz und<br>Fiederblätter<br>frischgrün                       | für Gruppen  | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 2.40<br>3.—<br>4.50<br>5.50        | 22.—<br>28.—<br>43.—<br>50.—         |   |
| <b>Sorbus</b> (L.), Eberesche,<br>Mehlbeere                                       |  |  |  |                                    |                                      |   |
| " <b>Aria lutescens</b> (hort.),<br>Mehlbeere . . . . .                           | mittelst., pyramidal,<br>Blätter silberweiß                            | empfehlenswert für<br>Alleen   | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 1.80<br>2.20<br>3.—                | 17.—<br>21.—<br>28.—                 | 160.—<br>200.—<br>260.—                   |
| " <b>aucuparia</b> (L.), gemeine<br>Eberesche . . . . .                           | starkwachsend,<br>reichblühend, dicht<br>mit roten Früchten<br>besetzt | für breite Straßen, sehr<br>zu empfehlen   | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.50<br>2.—<br>2.50<br>3.—<br>4.—  | 14.—<br>17.—<br>22.—<br>26.—<br>36.— | 130.—<br>150.—<br>200.—<br>240.—<br>320.— |
| " " <b>moravica</b> (Zgrl.), süß-<br>früchtige E. . . . .                         | mittelstark,<br>pyramidal  | für Alleen   | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 1.80<br>2.20<br>3.—<br>3.20        | 17.—<br>21.—<br>28.—<br>30.—         | 160.—<br>200.—<br>260.—                   |
| " " <b>fructu luteo</b> (hort.) .   | mittelstark, aufrecht  | trägt gelbe Früchte  | 10—12<br>12—14<br>14—16                  | 2.20<br>3.—<br>4.—                 | 21.—<br>28.—<br>38.—                 | 200.—<br>260.—                            |
| " <b>hybrida var. quercoides</b><br>(hort.) . . . . .                             | mittelstark, aufrecht<br>Blätter weißfilzig                            | für Alleen   | 14—16<br>16—18                           | 4.—<br>5.50                        | 38.—<br>50.—                         |   |
| " <b>scandica</b> (Fries.),<br>nordische M. . . . .                               | mittelstark, Blätter<br>filzig   | sehr guter Alleebaum,<br>unempfindlich gegen<br>Rauch und Staub  | 8—10<br>10—12                            | 2.—<br>2.30                        | 19.—<br>22.—                         | 170.—<br>200.—                            |
| <b>Tilia</b> (L.), Linde  |  |  |  |                                    |                                      |   |
| " <b>americana</b> (L.), Schwarz-<br>Linde . . . . .                              | starkwachsend,<br>sehr großblättrig                                    | gut für breite Straßen,<br>hält das Laub recht<br>lange  | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 2.20<br>3.—<br>3.80<br>4.50        | 21.—<br>28.—<br>36.—<br>43.—         | 200.—<br>260.—<br>340.—<br>400.—          |



*Ulmus campestris sarniensis* (Loud.)



*Ulmus montana latifolia* (hort.)



| Name und Autor  | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form    | Bemerkungen  | Stamm-<br>umfang<br>cm                   | 1 Stück<br>M.                     | 10 St.<br>M.                         | 100 St.<br>M.                             |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Tilia</b>  |  |  |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>grandifolia</b> (Ehrh.), groß-<br>blättrige Linde . . . . .                              | stark, pyramidal                                       | nur für freien Standort,<br>verliert sonst das Laub<br>zu früh   | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 1.80<br>2.20<br>3.—<br>4.—        | 17.—<br>21.—<br>28.—<br>37.—         | 160.—<br>200.—<br>260.—<br>350.—          |
| „ <b>parvifolia</b> (Ehrh.), klein-<br>blättrige L., Stein-L. . . . .                         | mittelstark, breit-<br>kronig, sehr reich-<br>blühend  | empfehlenswerter<br>Alleebaum, hält die<br>Blätter sehr lange  | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16          | 2.50<br>3.—<br>4.—<br>5.—         | 22.—<br>27.—<br>36.—<br>45.—         | 200.—<br>220.—<br>330.—<br>400.—          |
| „ <b>rubraeuchlora</b> (C.Koch),<br>Krim-L. (T. dasystyla<br>Loud.) . . . . .                 | mittelstark, pyra-<br>midal, Blätter<br>glänzendgrün   | einer der besten Allee-<br>bäume, unempfindlich<br>gegen Rauch u. Staub,<br>hält das Laub sehr<br>lange      | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.80<br>2.20<br>3.—<br>4.—<br>5.— | 17.—<br>21.—<br>28.—<br>37.—<br>47.— | 160.—<br>200.—<br>260.—<br>350.—<br>450.— |
| „ <b>tomentosa</b> (Mnch.), unga-<br>rische Silber-L., s. Abbild.                             | stark, pyramidal<br>Blätter silberweiß                 | prachtvoll. Alleebaum,<br>hält das Laub länger<br>wie alle anderen Linden                                    | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.50<br>3.—<br>4.—<br>5.—<br>6.50 | 22.—<br>27.—<br>36.—<br>47.—<br>60.— | 200.—<br>240.—<br>330.—<br>420.—<br>550.— |
| „ <b>vulgaris</b> (Hayne), holländ.<br>L., (T. intermedia D. C.)<br>siehe Abbildung . . . . . | stark, pyramidal                                       | sehr guter Alleebaum,<br>für breite Straßen in<br>tiefgründigem Boden<br>und freier Lage                     | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.—<br>2.50<br>3.—<br>4.—<br>5.—  | 17.—<br>22.—<br>27.—<br>36.—<br>45.— | 140.—<br>180.—<br>220.—<br>300.—<br>400.— |
| <b>Ulmus</b> (L.), Ulme, Rüster   |  |  |  |                                   |                                      |   |
| „ <b>americana</b> (L.) . . . . .   | stark, breitkronig,<br>sehr große Blätter              | empfehlenswert für<br>breite Straßen   | 10—12<br>12—14                           | 2.20<br>2.80                      | 21.—<br>27.—                         | 200.—<br>260.—                            |
| „ „ <b>aurea</b> (hort.) . . . . .  | mittelstark, gelb-<br>blättrig                         | für Gruppen  | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 3.—<br>4.—<br>5.—<br>6.—          | 27.—<br>36.—<br>45.—<br>55.—         | 230.—<br>320.—<br>400.—                   |
| „ <b>campestris</b> (L.), Feld-U.   | schwach, breit-<br>kronig, korkige<br>Rinde            | für Gruppen und Alleen   | 10—12<br>12—14<br>14—16                  | 2.—<br>2.50<br>3.50               | 18.—<br>24.—<br>33.—                 | 170.—<br>230.—<br>300.—                   |
| „ „ <b>arg.-var.</b> (hort.) . . . . .  | schwach, weiß-<br>marmorierte Blätter                  | für Gruppen  | 10—12                                    | 3.—                               | 27.—                                 | 230.—                                     |
| „ „ <b>monumentalis</b> (Rinz)  | mittelstark, fast<br>kugelig                           | sehr empfehlenswert<br>u. gesucht für schmale<br>Straßen, bleibt lange<br>grün, unempfindlich<br>gegen Rauch | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 3.—<br>4.—<br>5.—<br>6.—          | 27.—<br>36.—<br>45.—<br>55.—         | 230.—<br>320.—<br>400.—                   |
| „ „ <b>Rueppellii</b> (hort.) . . . . .   | schwach, kugelförm.<br>kleinblättrig, fein-<br>zweigig | für enge Straßen sehr<br>geschätzt   | 10—12<br>12—14<br>14—16                  | 3.—<br>4.—<br>5.—                 | 27.—<br>36.—<br>45.—                 | 230.—<br>320.—<br>400.—                   |
| „ „ <b>sarniensis</b> (Loud.)<br>(U. Wheatleyi hort.),<br>siehe Abbildung . . . . .           | schmal, pyramidal                                      | sehr empfehlenswert<br>für Alleen  | 10—12<br>12—14<br>14—16                  | 3.—<br>4.—<br>5.—                 | 27.—<br>36.—<br>45.—                 | 230.—<br>320.—<br>400.—                   |
| „ „ <b>umbraculifera</b><br>(Späth), Kugel-U. . . . .   | kugelförmig,<br>kleinkronig                            | schöner, nicht ganz<br>harter Alleebaum  | 10—12<br>12—14                           | 3.—<br>4.—                        |                                      |   |
| „ <b>glabra corylifolia pur-<br/>purea</b> (hort.) . . . . .                                  | unregelmäßig<br>wachsend, rotblättr.                   | für Gruppen  | 10—12                                    | 3.—                               | 27.—                                 |   |
| „ „ <b>vegeta</b> (Loud.) . . . . .   | stark breitkronig,<br>große, hellgrüne<br>Blätter      | ganz vorzüglich für<br>breite Straßen  | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 2.—<br>2.80<br>3.50<br>4.—        | 19.—<br>25.—<br>33.—<br>38.—         | 180.—<br>220.—<br>300.—<br>360.—          |

| Name und Autor   | Wuchs<br>und Form der Krone,<br>Blattfarbe und Form      | Bemerkungen   | Stamm-<br>umfang<br>cm                   | 1 Stück<br>M.                      | 10 St.<br>M.                         | 100 St.<br>M.                             |
|--|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Ulmus</b>   |  |   |  |                                    |                                      |   |
| " <i>montana</i> Dampieri<br>Wredei (hort.) . . .  | schwach, Blätter<br>auffallend goldgelb,<br>gedreht      | für Gruppen und<br>Solitär  | 10—12                                    | 2.50                               | 23.—                                 |   |
| " <i>fastigiata</i> (hort.) . .  | säulenförmig,<br>Blätter schwarz-<br>grün, eng anliegend | Alleebaum für schmale<br>Straßen, bleibt lange<br>grün, sehr geschätzt  | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18         | 2.20<br>3.—<br>3.80<br>4.50        | 21.—<br>28.—<br>36.—<br>43.—         | 200.—<br>260.—<br>340.—                   |
| " <i>Gaujardii</i> (hort.) . .   | mittelstark, aufrecht,<br>Blätter länglich               | für Alleen  | 10—12<br>12—14<br>14—16                  | 2.20<br>3.—<br>3.80                | 21.—<br>28.—<br>36.—                 | 200.—<br>260.—                            |
| " <i>latifolia</i> (hort.) Berg.-U.<br>siehe Abbildung . . .<br>(U. mont. Pitteursi hort.) | s. stark, bildet breite,<br>pyramidale Kronen            | einer der gesuchtesten<br>Alleeobäume für breite<br>Straßen in Städten,<br>unempfindlich gegen<br>Rauch und Staub, ge-<br>deiht in minderwertig.<br>Boden | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.50<br>2.—<br>2.40<br>3.20<br>4.— | 14.—<br>18.—<br>23.—<br>30.—<br>36.— | 130.—<br>170.—<br>220.—<br>280.—<br>340.— |
| " <i>lutescens</i> van Hout-<br>tei (hort.) . . . . .                                      | mittelstark,<br>gelbblättrig                             | für Gruppen   | 10—12<br>12—14                           | 2.20<br>3.—                        | 21.—<br>28.—                         |   |
| " <i>superba</i> (hort.) . . .   | stark, Blätter sehr<br>groß, glänzend grün               | schöne, pyramidale<br>Krone, geschätzter<br>Alleebaum, hält das<br>Laub sehr lange  | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 2.—<br>2.50<br>3.50                | 19.—<br>24.—<br>34.—                 | 180.—<br>230.—                            |





# Solitär- und Gruppenbäume

verpflanzte, extra starke Exemplare mit breiten Kronen.

|                                   | Stammumfang in cm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   | 18-20             | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
|                                   | a Stück M.        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acanthopanax ricinifolium . . .   | 8.—               | 10.—  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acer dasycarpum . . . . .         | 6.50              | 8.—   | 10.—  | 12.—  | 15.—  | 18.—  | 22.—  | 25.—  |       |       |       |
| " laetum rubrum . . . . .         |                   |       |       | 12.—  | 14.—  | 20.—  | 25.—  |       |       |       |       |
| " platanoides . . . . .           | 6.—               | 9.—   | 12.—  | 15.—  | 18.—  |       |       |       |       |       |       |
| " Pseudoplatanus . . . . .        | 5.50              | 8.—   | 10.—  | 12.—  | 15.—  | 18.—  | 20.—  | 23.—  |       |       |       |
| " " atropurpureum . . . . .       | 6.50              |       |       | 18.—  |       |       |       |       |       |       |       |
| " " Leopoldi . . . . .            |                   |       | 12.—  | 15.—  | 20.—  |       |       |       |       |       |       |
| Aesculus Hippocastanum . . . .    | 5.50              | 8.—   | 10.—  | 12.—  | 15.—  | 18.—  |       |       |       | 30.—  | 42 cm |
| " " fl. pl. . . . .               | 6.50              | 9.—   | 10.—  | 13.—  | 16.—  | 20.—  | 24.—  | 28.—  |       |       | 35.—  |
| " lutea . . . . .                 |                   | 10.—  |       |       |       |       |       |       |       |       | 35.—  |
| " rubicunda . . . . .             | 8.—               | 10.—  | 12.—  | 14.—  | 18.—  | 22.—  | 25.—  |       |       |       |       |
| Ailantus glandulosa . . . . .     | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 13.—  | 15.—  | 18.—  |       | 22.—  | 25.—  |       |       |
| Alnus cordata . . . . .           |                   |       |       |       |       |       | 20.—  |       |       |       |       |
| " glutinosa und incana . . . .    | 5.—               | 7.—   | 9.—   | 12.—  | 14.—  | 17.—  | 20.—  |       |       |       |       |
| Carpinus Betulus . . . . .        | 7.50              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| (von der Erde verzweigt)          |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Castanea vesca . . . . .          | 7.—               |       | 12.—  | 14.—  |       | 20.—  | 24.—  |       |       |       |       |
| Corylus Colurna . . . . .         | 8.—               | 10.—  | 12.—  | 15.—  | 18.—  |       |       |       |       |       |       |
| Crataegus coccinea u. rubra pl.   |                   |       |       | 15.—  | 18.—  |       |       |       |       |       |       |
| Fraxinus americana u. aucubae-    |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| folia . . . . .                   | 6.—               | 8.—   | 10.—  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| " excelsior . . . . .             | 5.—               | 7.—   | 9.—   |       | 12.—  | 15.—  |       |       |       |       |       |
| " " pendula . . . . .             | 6.—               | 8.—   | 11.—  | 14.—  | 17.—  | 20.—  |       |       |       |       |       |
| " monophylla . . . . .            |                   |       | 12.—  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| " Ornus . . . . .                 | 7.—               | 10.—  | 12.—  | 15.—  | 18.—  | 22.—  |       | 25.—  |       |       |       |
| Juglans nigra . . . . .           |                   | 8.—   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Platanus occidentalis . . . . .   | 6.—               | 9.—   | 12.—  | 15.—  |       |       |       |       |       |       |       |
| Populus alba . . . . .            | 5.—               | 7.—   | 9.—   | 12.—  |       | 15.—  |       |       |       |       |       |
| " balsamifera . . . . .           |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25.—  |
| " nigra var. pyramidalis . . . .  |                   |       |       |       |       |       |       | 24.—  |       | 28.—  |       |
| Prunus serotina . . . . .         | 6.—               | 9.—   | 12.—  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Quercus pedunculata . . . . .     |                   |       | 12.—  | 15.—  | 18.—  | 20.—  | 22.—  | 25.—  | 27.—  | 30.—  | 35.—  |
| " " pendula . . . . .             | 8.—               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| " " pyramidalis . . . . .         |                   |       |       |       | 25.—  |       |       |       |       |       |       |
| " palustris und rubra . . . . .   | 7.—               | 10.—  | 13.—  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Robinia Pseudacacia . . . . .     |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| " " Bessoniana u. rubra . . . .   | 6.50              | 8.—   | 10.—  | 12.—  |       |       |       |       |       |       |       |
| " umbraculifera . . . . .         | 7.—               | 9.—   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Salix caprea . . . . .            |                   |       |       |       |       |       | 20.—  |       |       |       |       |
| " purpurea pendula . . . . .      | 7.—               | 9.—   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Sorbus Aria lutescens . . . . .   | 7.—               | 10.—  | 13.—  |       | 18.—  | 20.—  |       |       |       |       |       |
| " aucuparia . . . . .             | 5.—               | 7.—   | 10.—  | 13.—  | 16.—  | 18.—  |       |       |       |       |       |
| " hybr. var. quercoides . . . . . | 7.—               | 10.—  | 13.—  | 15.—  |       |       |       |       |       |       |       |
| Tilia americana . . . . .         | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 13.—  | 16.—  | 18.—  | 22.—  | 25.—  | 28.—  | 30.—  |       |
| " Moltkei . . . . .               |                   |       | 12.—  | 15.—  | 18.—  |       |       |       |       |       | 35.—  |
| " grandifolia . . . . .           | 5.50              | 8.—   | 10.—  | 12.—  | 15.—  | 18.—  | 20.—  | 23.—  | 26.—  | 30.—  | 44 cm |
| " parvifolia . . . . .            |                   |       |       |       |       | 18.—  |       | 25.—  | 30.—  |       | 40.—  |
| " rubra euchlora . . . . .        | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 13.—  | 16.—  | 18.—  | 22.—  | 25.—  | 28.—  | 32.—  | 36.—  |
| " tomentosa und alba . . . . .    | 8.—               | 11.—  | 14.—  | 17.—  | 20.—  | 22.—  | 25.—  |       | 30.—  |       | 44 cm |
| " vulgaris . . . . .              | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 12.—  | 15.—  | 18.—  |       | 22.—  | 25.—  |       | 40.—  |
| " " pendula . . . . .             |                   |       |       |       |       | 20.—  | 22.—  |       |       |       | 30.—  |
| Ulmus americana aurea . . . . .   | 6.—               |       | 10.—  | 12.—  |       |       |       |       |       |       |       |
| " campestris . . . . .            |                   |       |       | 13.—  | 16.—  |       |       |       |       |       |       |
| " " pendula . . . . .             | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 13.—  | 16.—  | 18.—  | 22.—  | 25.—  | 28.—  | 30.—  | 35.—  |
| " sarniensis . . . . .            |                   | 8.—   | 10.—  | 13.—  |       |       |       |       |       |       | 41 cm |
| " effusa und Gaujardii . . . . .  | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 13.—  | 15.—  |       | 20.—  |       |       |       | 35.—  |
| " glabra vegeta . . . . .         | 6.—               | 8.—   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| " montana latifolia . . . . .     | 5.—               | 7.—   | 9.—   | 12.—  | 15.—  | 18.—  | 22.—  | 25.—  | 28.—  |       | 40 cm |
| " " horizontalis . . . . .        | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 13.—  |       |       |       |       |       |       | 35.—  |
| " " pendula . . . . .             | 6.—               | 8.—   | 10.—  | 13.—  | 16.—  | 20.—  | 22.—  |       |       |       |       |



*Fagus silvatica pendula* (Lodd.)



# Hängebäume.

| Name und Autor  | Wuchs und Belaubung  | Bemerkungen  | Stamm-<br>umfang<br>cm                   | 1 Stück<br>M.                       | 10 St<br>M.                          |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Acer</b> (L.), Ahorn   |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>dasycarpum</b> Wieri (Ellw. & Barr.) . . . . .               | breit, unregelmäßig, Blätter<br>zierlich geschliffen,<br>unterseits silberweiß | für Gruppen in<br>größeren Parkanlagen                       | 10—12<br>12—14                           | 2.20<br>3.—                         | 21.—<br>28.—                         |
| <b>Betula</b> (L.), Birke   |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>verrucosa elegans</b><br>Youngi (hort.) . . . . .            | mittelstark, leicht bezweigt,<br>stark hängend                                 | schöner Solitärbaum  | 7—8<br>8—10<br>10—12                     | 2.80<br>3.20<br>4.—                 | 26.—<br>30.—<br>38.—                 |
| <b>Caragana</b> (Lam.), Erbsenstr.                                |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>arborescens pendula</b><br>(hort.) . . . . .                 | schwach,<br>Zweige steifhängend  | für Gruppen  | 8—10<br>10—12                            | 2.—<br>2.30                         | 18.—<br>20.—                         |
| <b>Corylus</b> (L.), Hasel  |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>Avellana pendula</b> (hort.)                                 | schwach, stark hängend   | do.  | 8—10<br>10—12                            | 2.50<br>3.—                         | 22.—<br>28.—                         |
| <b>Fagus</b> (L.), Rotbuche, Buche                                |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>silvatica pendula</b> (Lodd.)<br>siehe Abbildung . . . . .   | unregelmäßig,<br>sehr malerisch hängend,<br>Blätter grün                       | einer unserer schönst.<br>Solitärbäume                       | 10—12<br>12—14                           | 4.—<br>5.—                          | 38.—<br>48.—                         |
| „ „ <b>purpurea pendula</b><br>(hort.) . . . . .                  | schwach, leicht hängend,<br>rotblättrig  | Solitärbaum  | 8—10                                     | 4.50                                | 42.—                                 |
| <b>Fraxinus</b> (L.), Esche                                       |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>excelsior pendula</b> (Desf.)                                | schwach, gleichmäßig<br>hängend  | zur Bildung von<br>Läuben sehr geeignet                      | 8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 1.80<br>2.20<br>3.—<br>3.50<br>4.50 | 17.—<br>20.—<br>28.—<br>33.—<br>42.— |
| „ „ <b>pend. aurea</b> (hort.) . . . . .                          | sparrige, leicht hängende,<br>goldgelbe Zweige und<br>gelbe Blätter            | für Gruppen  | 10—12<br>12—14                           | 2.80<br>3.50                        | 25.—<br>33.—                         |
| <b>Malus</b> (Juss.), Apfelbaum                                   |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>pendula Elise Rathke</b><br>(Rathke) . . . . .               | sehr schwach,<br>leicht hängend  | f. kleine Gruppen, trägt<br>wohlschmeckend. Äpfel            | 7—8<br>8—10                              | 1.80<br>2.30                        | 16.—<br>20.—                         |
| <b>Pirus</b> (L.), Birnbaum                                       |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>salicifolia</b> (L.) . . . . .                               | ganz schwach, unregelmäßig<br>häng., silberweiße Blätter                       | Gruppenbaum  | 7—8<br>8—10                              | 1.70<br>2.30                        | 15.—<br>20.—                         |
| <b>Prunus</b> (L.), Kirsche                                       |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>caproniana pendula</b><br>(hort.) . . . . .                  | sehr schwach, feinzweigig  | do.  | 7—8<br>8—10                              | 1.80<br>2.30                        | 16.—<br>20.—                         |
| <b>Quercus</b> (L.), Eiche  |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>pedunculata pendula</b><br>(Loud.) . . . . .                 | zieml. stark, leicht hängend   | Solitär  | 14—16                                    | 5.—                                 |                                      |
| <b>Robinia</b> (L.), Robinie                                      |  |  |  |                                     |                                      |
| „ <b>Pseudacacia tortuosa</b><br><b>pendula</b> (hort.) . . . . . | mittelstark, sehr<br>unregelmäßig hängend,<br>mit gedrehten Zweigen            | bei windgeschütztem<br>Stand sehr dekorativer<br>Solitärbaum | 8—10<br>10—12<br>12—14                   | 2.30<br>3.—<br>3.50                 | 20.—<br>28.—<br>33.—                 |
| „ „ <b>pendula monophylla</b><br>(hort.) . . . . .                | lebhaft wachsend,<br>Blätter einzeln stehend                                   | schöner Gruppenbaum  | 10—12                                    | 3.—                                 | 28.—                                 |



DAHS, REUTER & Co.  
JÜNGSFELD.

*Ulmus montana pendula* (hort.)



| Name und Autor   | Wuchs und Belaubung   | Bemerkungen   | Stamm-<br>umfang<br>cm                 | 1 Stück<br>M.                        | 10 St.<br>M.                         |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Salix</b> (L.), Weide   |   |   |  |                                      |                                      |
| „ <b>alba vitellina pendula</b><br>(hort.) . . . . .                 | stark wachsend, feine<br>Bezweigung, Holz gold-<br>gelb, Blätter blaugrün | unstreitig der schönste<br>Baum an Teichrändern<br>und Wasserläufen | 7—8<br>8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16 | 1.50<br>1.80<br>2.30<br>3.20<br>4.20 | 14.—<br>17.—<br>20.—<br>30.—<br>40.— |
| „ <b>caprea pendula</b> (hort.)                                      | schwach, senkrecht<br>hängend   | Solitär, für feuchte<br>Stellen                                     | 7—8<br>8—10<br>10—12                   | 1.50<br>2.—<br>2.80                  | 14.—<br>18.—<br>26.—                 |
| „ <b>purpurea pendula</b> (hort.)                                    | schwach, feinzweigig  | do.   | 7—8<br>8—10<br>10—12<br>12—14<br>14—16 | 1.50<br>2.—<br>2.50<br>3.—<br>3.50   | 14.—<br>18.—<br>22.—<br>28.—<br>32.— |
| <b>Sophora</b> (L.), Sophore   |   |   |  |                                      |                                      |
| „ <b>japonica pendula</b> (hort.)                                    | sehr schwach, dicht be-<br>zweigt und stark hängend                       | Solitär   | 8—10                                   | 4.—                                  | 38.—                                 |
| <b>Sorbus</b> (L.), Eberesche  |   |   |  |                                      |                                      |
| „ <b>aucuparia pendula var.</b><br>(hort.) . . . . .                 | stark, leicht hängend,<br>buntblättrig                                    | für Gruppen   | 8—10                                   | 2.20                                 | 20.—                                 |
| <b>Tilia</b> (L.), Linde   |   |   |  |                                      |                                      |
| „ <b>alba</b> (Ait.) . . . . .                                       | stark, leicht hängend   | für Gruppen u. Solitär  | 10—12<br>12—14                         | 3.20<br>4.30                         | 30.—<br>40.—                         |
| <b>Ulmus</b> (L.), Ulme, Rüstler                                     |   |   |  |                                      |                                      |
| „ <b>campestris pendula</b><br>(hort.) . . . . .                     | stark, sehr schön<br>ungleichmäßig  | Solitär und<br>Gruppen  | 10—12                                  | 2.20                                 | 21.—                                 |
| „ <b>montana horizontalis</b><br>(hort.) . . . . .                   | kräftig, leicht hängend,<br>sehr großblättrig                             | Gruppenbaum   | 12—14<br>14—16<br>16—18                | 3.—<br>3.50<br>4.20                  | 28.—<br>33.—<br>40.—                 |
| „ <b>montana pendula</b> (hort.)<br><u>siehe Abbildung</u> . . . . . | stark hängend   | Solitärbaum, sehr<br>gut für Lauben                                 |  |                                      |                                      |



# Schlingpflanzen.

| Name und Autor  | Wuchs, Belaubung und Blüten  | Bemerkungen   | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|---|--|---|---------------|--------------|
| <b>Actinidia</b> (Lindl.), Strahlengriffel                        |  |   |               |              |
| „ <b>Kolomikta</b> (Max.), mand-<br>schurischer St. . . . .       | ziemlich stark, Blätter<br>bräunlich, später schön<br>buntfärbend              | zur Berankung von<br>Gittern usw.                                   | 1.60          | 14.—         |
| <b>Akebia</b> (Dcne.), Akebia                                     |  |   |               |              |
| „ <b>quinata</b> (Dcne.), fünfblättrige<br>Akebia . . . . .       | stark, Blätter dunkelgrün,<br>3—5 teilig, Blütentrauben<br>violett, Anfang Mai | wird bis 4 m hoch   | 1.60          | 14.—         |
| <b>Ampelopsis</b> (Mchx.), Jungfern-<br>wein                      |  |   |               |              |
| „ <b>quinquefolia</b> (Mchx.), ge-<br>meiner J. (Wilder Wein) . . | stark, Blätter 5teilig, färben<br>im Herbst schön rot                          | sehr geeignet } starke<br>z. Berankung } schwächere<br>von Lauben } | 0.60<br>0.40  | 5.—<br>3.50  |
| „ <b>radicantissima</b> , festhaften-<br>der J. . . . .           | starkwachsend, Blätter<br>groß, grün, fünfflappig                              | rankt fest an Holz und<br>rauhem Mauerwerk                          | 0.50          | 4.50         |
| „ „ <b>Engelmanni</b> (hort.),<br>selbstklimmender J. . .         | ziemlich stark, kleinere<br>zierliche Blätter, rote<br>Herbstfärbung           | do.   | 0.60          | 5.—          |
| „ <b>tricuspidata Veitchi</b> (hort.)                             | schwach, verschieden-<br>artige rötlich austreibende<br>Blätter                | rankt auch an glatten<br>Hauswänden                                 | 0.70          | 6.—          |
| „ „ <b>Veitchi gigantea</b> (hort.)                               | stark, glänzendgrün be-<br>laubt, im Herbst schön<br>rotfärbend                | do.   | 0.80          | 7.—          |
| „ „ „ <b>purpurea</b> (hort.) . .                                 | stark, rot austreibend   | do.   | 0.80          | 7.—          |
| <b>Aristolochia</b> (L.), Pfeifenblume                            |  |   |               |              |
| „ <b>Sipho</b> (L. Hérít.), gemeine Pf.                           | stark, hellgrüne, große,<br>herzförmige Blätter, dicht<br>belaubt              | sehr gut für } starke<br>Lauben } schwächere                        | 1.70<br>1.40  | 16.—<br>13.— |



Gitter, berankt mit Clematis paniculata (Thbg.)



| Name und Autor  | Wuchs, Belaubung und Blüten  | Bemerkungen  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |      |
|---|--|--|---------------|--------------|------|
| <b>Bignonia</b> siehe Tecoma  |  |  |               |              |      |
| <b>Clematis</b> (L.), Waldrebe  |  |  |               |              |      |
| „ <b>coccinea</b> (Engelm.), scharlachblütige W. . . . .              | Blüten glockenförmig, fleischig, zinnoberrot                                       | sehr schwach wachsend  | 1.20          | 10.—         |      |
| „ <b>Flammula</b> (L.), blasenziehende W. . . . .                     | ziemlich stark, wenig schlingend, weiße, endständige Blütenrispen                  | für Böschungen   | 0.80          | 7.—          |      |
| „ <b>montana rubens</b> (Jouin) .                                     | Ranken und Blütenstiele purpur, sehr reichbl., rosa                                | neuere, schöne Sorte   | 1.50          | 13.—         |      |
| „ <b>paniculata</b> (Thbg.), rispenblütige W., <u>siehe Abbildung</u> | sehr stark, dichtbelaubt und frischgrün, Blüten weiß, wohlriechend, Sept.-Okt.     | besonders empfehlenswert zur Berankung von Gittern, Lauben usw.<br>in Töpfen | 1.20          | 10.—         |      |
|   |  | aus dem freien Lande   | 0.80          | 7.—          |      |
| „ <b>großblumige Sorten</b> (veredelte) . . . . .                     | in Farben weiß, rosa, lila, rot, hell- und dunkelblau, teils auch gefüllt          | schöne Solitärpflanzen, für Torbogen, Säulen usw.<br>in Töpfen               | 1.20          | 10.—         |      |
| „ <b>Vitalba</b> (L.), gemeine W. .                                   | sehr stark, weiße, endständige Blüten  | zur Bekleidung von Mauern, Lauben usw., auch für Gehölzgruppen               | 0.80          | 7.—          |      |
| „ <b>Viticella</b> (L.), blaue W. . .                                 | mittelstark, spärlich belaubt, bläuliche, einzelständige Blüten                    | do.  | 0.80          | 7.—          |      |
| <b>Evonymus</b> (L.), Spindelbaum                                     |  |  |               |              |      |
| „ <b>japonica radicans</b> (Sieb.)                                    | schwach, niederliegend   | beliebt für Einfassungen   | 0.50          | 4.50         |      |
| „ „ „ <b>picta</b> (hort.)  | schwach, weißbuntblättrig  | do.  | 0.60          | 5.—          |      |
| <b>Glycine</b> siehe Wistaria   |  |  |               |              |      |
| <b>Hedera</b> (L.), Efeu  |  |  |               |              |      |
| „ <b>Helix</b> (L.), gemeiner E. . .                                  | kleinblättrig  | Allgemein bekannt und beliebt, gedeiht vorzüglich im Schatten                | Höhe 80-100cm | 0.40         | 3.50 |
| „ <b>hibernica</b> (C. Koch) schottischer E. . . . .                  | großblättrig   |  | 100-130 "     | 0.50         | 4.50 |
|   |  |  | 140-170 "     | 1.—          | 9.—  |
|   |  |  | 180-220 "     | 1.50         | 14.— |
| <b>Lonicera</b> (L.), Geißblatt                                       |  |  |               |              |      |
| „ <b>Caprifolium</b> (L.), Garten-G.                                  | stark, weißliche Blütenköpfchen  | sehr gut verwendbar an Gittern, Lauben, Balkonen usw.                        |               |              |      |
| „ „ <b>praecox</b> (Lam.) . . . .                                     | mittelstark, violett-weißlich  |  |               |              |      |
| „ <b>flava</b> (Sims.), gelbblühendes Geißbl. . . . .                 | stark, Blüten wohlriechend, goldgelb   |  |               |              |      |
| „ <b>japonica</b> (Thbg.), japanisch. Geißbl. . . . .                 | fast immergrün, anfangs braunrote Belaubung, Blüten außen braunrot, innen rahmweiß |  |               |              |      |
| „ „ <b>flexuosa</b> (Thbg.) . . . .                                   | schwach, dichtbelaubt, kleinblättrig, immergrün, Blüten gelb, wenig auffallend     |  | 1.—           | 9.—          |      |
| „ „ <b>aureo reticulata</b> (hort.)                                   | wie vorstehende, Blätter gelbbunt  |  |               |              |      |
| „ <b>Periclymenum</b> (L.), Wald-G.                                   | stark, frischgrün, Blüten gelblich-weiß, sehr wohlriechend                         |  |               |              |      |
| „ <b>plantierensis fuchsoides</b> (hort.) . . . . .                   | stark, Blüten zierlich, rot bis kupfergelb   |  |               |              |      |
| „ „ <b>punicea</b> (hort.) . . . .                                    | schwach, korallenr. Blüten   |  |               |              |      |
| „ <b>Sullivantii</b> (A. Gr.) . . . .                                 | sehr schöne Art, Blüten rotgelb  |  |               |              |      |

| Name und Autor  | Wuchs, Belaubung und Blüte  | Bemerkungen  | 1 Stück<br>M. | 10 St.<br>M. |
|---|---|--|---------------|--------------|
| <b>Periploca</b> (L.), Baumschlinge<br>„ <b>graeca</b> (L.), griechische B.   | stark, lange, schmale,<br>glänzendgrüne Blätter                                     | schön an Mauern, für<br>Lauben empfehlenswert,<br>ca. 3 m hoch                     | 1.60<br>2.50  | 14.—<br>23.— |
| <b>Polygonum</b> (L.), Knöterich<br>„ <b>Baldschuanicum</b> (Rgl.) . . .      | stark, 4—5 m hoch, sehr<br>zierlich, Blütenrispen lang,<br>rötlich-weiß, Juli-Sept. | nicht überall winterhart   | 2.—           | 18.—         |
| <b>Schlingrosen</b> siehe Rosen   |   |  |               |              |
| <b>Tecoma</b> (Juss.), Jasmintrumpete<br>„ <b>chinensis</b> (K. Koch) . . . . | mittelst., gefiedertes Laub<br>Blüten groß, orangerot                               | für geschützten Standort   | 1.—           | 9.—          |
| „ <b>radicans</b> (Juss.), wurzelnde J.                                       | ziemlich stark, feinzweigig,<br>Blüten klein, orangegebl                            | zur Berankung von<br>Gittern usw.  | 0.80          | 7.50         |
| <b>Vinca</b> (L.), Singrün<br>„ <b>major</b> (L.), großes S. . . .            | großblättrig,<br>immergrün, Blüten groß,<br>hell- bis dunkelblau                    | vorzüglich für<br>Einfassungen und Beete   | 0.60          | 5.50         |
| „ „ <b>arg. marg.</b> (hort.) . . . .   | wie vorige,<br>weißbunt belaubt   | do.  | 0.70          | 6.50         |
| „ <b>minor</b> (L.), kleines S. . . .   | schwach, Blätter klein,<br>immergrün, Blüten groß,<br>hell- bis dunkelblau          | sehr gut f. schattige<br>Stellen, wo Rasen }<br>nicht gedeiht } $\frac{1}{2}$ 20.— | 0.30          | 2.50         |
| <b>Wistaria</b> (Nutt.), Glycine<br>„ <b>polystachya</b> (K. Koch) . . .      | stark, allgemein bekannt,<br>Blütentrauben blau                                     | f. Balkone sehr } starke<br>zu empfehlen } schwäch.                                | 2.—<br>1.50   | 18.—<br>14.— |
| „ „ <b>alba</b> (hort.) . . . . .   | mittelstark, Blüten weiß  | do.  | 2.—           | 18.—         |







**Antirrhinum (L.), Löwenmaul**

1 Stück

- „ **majus (L.)**, großes L., in verschiedensten Farben blühend, Juni-August, für Schnitt und Gruppen . . . . . M. 0.20

**Aquilegia (L.), Akelei**

- „ **vulg. Hybr.**, verschiedenfarbig, Mai-Juli, für Schnitt und Gruppen an schatt. Stellen M. 0.40

**Arabis (L.), Gänsekraut**

- „ **apina**, schneeweiß . . . . . M. 0.30  
 „ **fl. pl.**, schöne, weißgefüllte, stark duftende Blumen, ähnlich Levkojen, März-April „ 0.30  
 „ **fol. var.** mit weißb. Blättern, März-April für Gruppen und Einfassungen . . . „ 0.30

**Aralia (L.), Beerenangelike**

- „ **cashmeriana**, Blattpflanze, Einzelpflanze, Blüte unscheinbar . . . . . M. 0.80

**Armeria (W.), Grasnelke**

- „ **maritima alba**, weiß, Juni-Juli, vorzügliche Rabattenstaude . . . . . M. 0.40

**Arundo (L.), Wasserrohr**

- „ **Donax**, schilfähnliche grüne Blätter . . . . . M. 0.90  
 „ **fol. var.** mit weißbunten Blättern, nicht winterhart . . . . . 1.—

**Asperula (L.), Waldmeister**

- „ **odorata**, weiß, Mai-Juni, unter schattigen Baumgruppen verwendbar . . . . . M. 0.10

**Aster (L.), Sternblume**

Für Rabatten, Felsenpartien und Vorpflanzung vor Gehölzgruppen geeignet; wie auch als Schnittblume zu empfehlen. Blütezeit Mai-November, Höhe je nach den Arten 50 bis 150 cm.

**a) frühblühende Sorten:**

- |                                  |           |   |           |
|----------------------------------|-----------|---|-----------|
| alpinus, blau, Mai . . . . .     | } M. 0.50 | Mesa grande speciosus, blau, Juni . . . . . | } M. 0.50 |
| „ albus, weiß, Mai . . . . .     |           | subcoeruleus, violett . . . . .             |           |
| diplostephioides, lila . . . . . |           |   |           |

**b) spätblühende Sorten:**

- |   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| acris linarifolius, zartblau . . . . .                                | } M. 0.50 | Nov. Belg. Colerette rose, rosa . . . . . | } M. 0.50 |
| ericoides, weiß . . . . .   |           | „ „ Coombe Fishacre, lilarosa . . . . .   |           |
| „ Delight, weiß-rosa . . . . .  |           | „ „ John Wood, hellblau . . . . .         |           |
| hybr. Amy, blau . . . . .   |           | „ „ Rob. Parker, blau . . . . .           |           |
| „ Eyleen, hellblau . . . . .  |           | „ „ The Reverend Egles, blau . . . . .    |           |
| „ Mad. Cocheux, rosa . . . . .  |           | „ „ Thirza, lila . . . . .                |           |
| ibericus, Ultramarin, tiefblau, schönste aller Herbstastern . . . . . |           | „ „ Top Swayer, halbgef., zartbl. . . . . |           |
| Nov. Angl. Lil Fardell, rosa . . . . .                                |           | „ „ Thos. S. Ware, blau . . . . .         |           |
| „ „ Rycroft pink, rosa . . . . .                                      |           | Vimineus Freedom, weißrosa . . . . .      |           |
| „ „ W. Bowman, dunkelviolett . . . . .                                |           | „ Ophir, blau, Zentrum gelb . . . . .     |           |

**Astilbe (Ham.), Prachtspiere**

Passend zu Gruppen und Einzelpflanzung; von großer, dekorativer Wirkung. Die Blüten stehen in ährenartigen Rispen. Blütezeit Juli-August. Sie bevorzugt eine etwas feuchte, halbschattige Lage. Die Blüten sind für Schnitt sehr wertvoll, müssen aber gleich in Wasser gestellt werden.

- |   |  |
|---|--|
| „ <b>Arendsi Brunhilde</b> , cremerosa . M. 1.— | <b>Arendsi Venus</b> , purpurrosa . . . . . M. 0.80    |
| „ <b>Ceres</b> , lilarosa . . . . . 0.80        | „ <b>chinensis</b> , zartrosa . . . . . 0.50           |
| „ <b>Gunther</b> , rosa . . . . . 1.—           | „ <b>Davidi</b> , lilarosa . . . . . 0.50              |
| „ <b>Kriemhilde</b> , lachsrosa . . . . . 0.80  | „ <b>Japonica comp. multifl.</b> , weiß . . . . . 0.40 |
| „ <b>Lachskönigin</b> , „ . . . . . 0.80        | „ <b>Lemoinei nuée rose</b> , zartrosa . . . . . 0.40  |
| „ <b>Rosa Perle</b> , zartrosa . . . . . 0.80   | „ <b>rivularis major</b> , gelb . . . . . 0.50         |
| „ <b>Siegfried</b> , karminrosa . . . . . 1.—   |  |

**Bambusa (Schreb.), Bambusrohr**

- „ **Metake**, schilfähnliche grüne Blätter . . . . . M. 1.50  
 „ **nigra**, wirkt sehr dekorativ an Teichanlagen . . . . . 1.50

**Baptisia (Vent.), Färberhülse**

- „ **australis**, große blaue Trauben, Mai-Juli, lupinenähnlich . . . . . M. 0.60

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



**Bellis** (L.), Gänseblümchen

1 Stück

- |   |                                   |         |
|---|-----------------------------------|---------|
| " <i>perennis alba</i> pl., weißgefüllt . . . . . | } für Rabatten und Einfassungen { | M. 0.10 |
| " <i>rubra</i> pl., rotgefüllt . . . . .          |                                   | " 0.10  |

**Betonica** (L.), Scheinziest

- |   |         |
|---|---------|
| " <i>grandiflora superba</i> , hellpurpur, Juli . . . . . | M. 0.50 |
|---|---------|

**Borago** (L.), Gurkenkraut

- |   |         |
|---|---------|
| " <i>faxiflora</i> , blau, Mai-August, niederliegend, für Gruppen . . . . . | M. 0.80 |
|---|---------|

**Campanula** (L.), Glockenblume

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| " <i>carpatica</i> , blau, 20—30 cm . . . . .            | } Passend zu Einfassungen, Felsengruppen, zur Topfkultur und vor allem als Schnittblume, Blütezeit Mai-August, Höhe je nach den Arten 20—100 cm { | M. 0.30 |
| " <i>nivea</i> , weiß, 20—30 cm . . . . .                |   | " 0.30  |
| " <i>elegans</i> , blau . . . . .                        |   | " 0.35  |
| " <i>glomerata dahurica</i> , blau . . . . .             |   | " 0.40  |
| " <i>speciosa</i> , blau . . . . .                       |   | " 0.40  |
| " Medium i. F. gemischt, weiß, rot, rosa, blau . . . . . |   | " 0.15  |
| " <i>persicifolia alba</i> , weiß . . . . .              |   | " 0.40  |
| " <i>Moerheimii</i> , weißgefüllt . . . . .              |   | " 0.50  |
| " <i>multiflora</i> , blau . . . . .                     |   | " 0.50  |
| " <i>Seidenball</i> , bläulich, gefüllt . . . . .        |   | " 0.50  |
| " <i>rotundifolia</i> , kleinbl. blau . . . . .          | " 0.40  |         |

**Carlina** (L.), Silberdistel

- |   |         |
|---|---------|
| " <i>acaulis</i> , weiß, Juli-September. Die Blüte schließt sich bei Regen und in der Nacht, daher auch Wetterdistel genannt; für Felspartien . . . . . | M. 0.40 |
|---|---------|

**Centaurea** (L.), Kornblume

- |  |  |         |
|--|--|---------|
| " <i>dealbata</i> , rosa . . . . .                   | } Rabattstaude, sehr haltbare Schnittblume. Mai-August { | M. 0.35 |
| " <i>montana alba</i> , weiß . . . . .               |  | " 0.40  |
| " <i>carnea</i> , fleischfarbig . . . . .            |  | " 0.40  |
| " <i>coerulea grandifl.</i> , blau . . . . .         |  | " 0.40  |
| " <i>rubra</i> , rot . . . . .                       |  | " 0.40  |
| " <i>ruthenica</i> , kugelig, schwefelgelb . . . . . |  | " 0.50  |
| " <i>Tournefortii</i> , goldgelb . . . . .           | " 0.50   |         |

**Cerastium** (L.), Hornkraut

- |   |         |
|---|---------|
| " <i>Biebersteini</i> , silberweiß, Mai-Juni, für Felspartien . . . . . | M. 0.35 |
|---|---------|

**Cheiranthus** (L.), Goldlack

- |   |         |
|---|---------|
| " <i>Cheiri</i> i. Farben, hellgelb bis dunkelrot . . . . . | M. 0.15 |
|---|---------|

**Chelone** (L.), Schildblume

- |   |         |
|---|---------|
| " <i>barbata coccinea</i> , leuchtendrot, Juli-September . . . . .              | M. 0.40 |
| " <i>glabra</i> , rosa, August-Oktober; liebt schattige, feuchte Lage . . . . . | " 0.40  |
| " <i>alba</i> , weiße Blumen im August . . . . .                                | " 0.40  |

**Chrysanthemum** (L.), Wucherblume, Margueriten

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| " <i>indicum</i> in verschied. Farben, rot, weiß usw. . . . . | } Zeichnen sich durch schöne Farben, gefällige Form der Blumen und große Reichblütigkeit aus. Die gefüllten Sorten ( <i>Chr. indicum</i> ) blühen von Aug.-Nov.; die ungefüllt. ( <i>Chr. maximum</i> ) im Juli-August. Hauptverwendung Schnitt { | M. 0.60 |
| " <i>maxim. Mrs. J. Tersteeg</i> , bis 1 m. weiß . . . . .    |   | " 0.50  |
| " <i>Perfection</i> , weiß . . . . .                          |   | " 0.40  |
| " <i>Polarstern</i> , großblumig, weiß . . . . .              |   | " 0.40  |

**Clematis** (L.), Waldrebe

- |   |                                     |         |
|---|-------------------------------------|---------|
| " <i>Davidiana</i> , blau, Juli-September . . . . . | } für Schnitt und Gruppen . . . . . | M. 0.60 |
| " <i>integrifolia</i> , „ Juni-August . . . . .     |                                     |         |

**Colchicum** (L.), Herbstzeitlose

- |  |         |
|--|---------|
| " <i>autumnale</i> , lilarosa, September-Oktober, giftig . . . . . | M. 0.15 |
|--|---------|

**Convallaria** (L.), Maiglöckchen

- |   |         |
|---|---------|
| " <i>majalis</i> , weiß, April-Mai, für schattige Lagen, vorzüglich zum Treiben . . . . . | M. 0.10 |
|---|---------|

**Coreopsis** (L.), Mädchenaugen

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| " <i>lanceolata</i> , gelb . . . . .                                      | } Äußerst dankbare Schnittstaude und Rabattenpflanze. Juni-September. { | M. 0.40 |
| " <i>rosea</i> , rosa . . . . .   |   |         |
| " <i>tenuifolia</i> , gelb, kleinblumig, Blätter fein gefiedert . . . . . |   |         |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.







**Dianthus** (L.), Nelke

1 Stück

|   |   |  |   |         |
|---|---|--|---|---------|
| " | Caryophyllus Droll, schneeweiß, rot geadert . . . . .                           | Chornelke, für Beete und Schnitt<br>Juni-August<br>Die großbl. wohlriechenden Blüten<br>müssen aufgebunden werden. | { | M. 0.60 |
| " | " Märchen, rosa . . . . .   |  |   |         |
| " | " Terracotta, rot . . . . .   |  |   |         |
| " | " Titania, aprikosenfarbig . . . . .  |  |   |         |
| " | Gartennelken, einfach und gefüllt in allen Farben, weiß, rot, rosa usw. . . . . |  |   | M. 0.15 |
| " | plumarius fl. pl. Delicata, lila gefüllte Federnelke, Juni-August . . . . .     |  |   | M. 0.50 |
| " | " Herr Majesty  | schneeweiße, dicht gefüllte Blumen auf aufrechten Stielen<br>im Juni   | { | M. 0.30 |
| " | " Kaiser Wilhelm  |  |   |         |

**Dicentra** (Borkh.), Herzblume

|   |   |         |
|---|---|---------|
| " | formosa, fleischfarbig, Mai-August . . . . .                            | M. 0.40 |
| " | spectabilis, rosa, das blutende oder tränende Herz, April-Mai . . . . . | " 0.40  |

**Dictamnus** (L.), Diptam

|   |  |         |
|---|--|---------|
| " | Fraxinella, rosa, dunkelgeadert, Mai-Juni, verwendbar für Rabatten . . . . . | M. 0.50 |
|---|--|---------|

**Digitalis** (L.), Fingerhut

|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| " | gloxinaeflora, rot, rosa, gelb, weiß ) bis 150 cm hohe, giftige Staude mit lang., ährigen Blüt. | { | M. 0.20 |
| " | purpurea, rot, heimischer Fingerhut ) Juni-Juli, für dichtes Gebüsch oder steinige Abhänge      |   |         |

**Doronicum** (L.), Gemswurz

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| " | austriacum, halbschattige Lage, 1 m         | { | Die langgestielten, gelben Blumen liefern ein gutes Bindematerial, wertvolle Rabattenstaude, Blütezeit April-Juli | { | M. 0.40 |
| " | caucasicum, margueritenähnlich . . . . .    |   |   |   |         |
| " | Draytonense . . . . .                       |   |   |   |         |
| " | glaciale, Alpenpflanze . . . . .            |   |   |   |         |
| " | Pardalianches, gute Gartenpflanze . . . . . |   |   |   |         |
| " | plantagineum excels., großbl. . . . .       |   |   |   |         |

**Dracocephalum** (L.), Drachenkopf

|   |  |         |
|---|--|---------|
| " | Ruyschiana, weiße Lippen, Juli-August, für Rabatten, Gruppen und Schnitt . . . . . | M. 0.60 |
| " | virginicum, rosa . . . . .   | M. 0.50 |

**Echinops** (L.), Kugeldistel

|   |                                       |   |   |   |                             |
|---|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| " | Ritro, hellblau . . . . .             | { | zierende Gewächse, mit 100—150 cm hohen Stengeln und kugelfunden Blüten, Juni-Sept. | { | M. 0.60<br>" 0.60<br>" 0.60 |
| " | ruthenicus, hellblau . . . . .        |   |   |   |                             |
| " | sphaerocephalus, silbergrau . . . . . |   |   |   |                             |

**Elymus** (L.), Strandroggen, Strandgras

|   |   |         |
|---|---|---------|
| " | arenarius, blau-weiß bereift, für Trockenbuketts geeignet . . . . . | M. 0.40 |
|---|---|---------|

**Epilobium** (L.), Weidenröschen

|   |  |         |
|---|--|---------|
| " | angustifolium, purpurrot, Juni-Juli, für Schnitt und Alpinum . . . . . | M. 0.30 |
|---|--|---------|

**Eremurus** (M. B.), Lilienschweif

|   |   |         |
|---|---|---------|
| " | robustus, rosa, Mai-Juni, dekorative Einzelpflanze, trägt ihre Blüte in dichter, langer Traube auf oft 2—3 m hohem Blütschaft; sie liebt nahrhaften, lockeren Boden, zur Triebzeit viel Wasser und im Winter leichten Schutz. Pflanzzeit im Herbst oder zeitigen Frühjahr . . . . . | M. 2.50 |
|---|---|---------|

**Erigeron** (L.), Berufungskraut

|   |  |   |  |   |                             |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|
| " | Asa Gray (Neu aprikosengelb) . . . . .   | { | Ähneln im Bau und Kolorit den Asten; Blütezeit | { | M. 0.80<br>" 0.40<br>" 0.50 |
| " | Coulteri, reinweiß . . . . .   |   |  |   |                             |
| " | speciosus superbus, dunkelblau } Mai-Aug. Geeignet für Schnitt und Felsgruppen |   |  |   |                             |

**Eryngium** (L.), Edeldistel

|   |                                 |   |   |   |                             |
|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| " | alpinum, hellviolett . . . . .  | { | Juni-September für Schnitt- und Felspartien | { | M. 0.60<br>" 0.60<br>" 0.50 |
| " | Oliverianum, blau . . . . .     |   |   |   |                             |
| " | planum, kleinbl. blau . . . . . |   |   |   |                             |

**Eulalia** (Trin.), Eulalie

|   |   |   |   |   |                                       |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| " | japonica, grüne Blätter . . . . .         | { | Sehr wertvolle Grasart für Rasenflächen | { | M. 0.60<br>" 0.80<br>" 0.50<br>" 0.60 |
| " | fol. var., weißbunt . . . . .             |   |   |   |                                       |
| " | gracillima, dunkelgrün, schmalbl. . . . . |   |   |   |                                       |
| " | zebrina, gelb, quer gestreift . . . . .   |   |   |   |                                       |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



|  |  |         |
|--|--|---------|
| <b>Eupatorium</b> (L.), Kunigundenkraut  |  | 1 Stück |
| „ violaceum, violett-rosa, an Teichanlagen   |  | M. 0.50 |
| <b>Filices</b> (L.), Farnkraut   |  |         |
| <b>Adiantum pedatum</b> , Schleierfarn   |  | M. 0.75 |
| <b>Aspidium aculeatum</b> , Schildfarn   |  | 0.50    |
| „ <b>angulare lineare</b>  |  | 0.80    |
| „ <b>marginale</b>   |  | 0.80    |
| „ <b>Filix mas</b> , Wurmfarne   |  | 0.40    |
| „ <b>mas fluctuosa</b> , Punktfarn   |  | 0.80    |
| „ <b>spinulosum</b> , Dornfarn   |  | 0.40    |
| <b>Athyrium Filix femina angustata congesta</b>  | Sie sind in jeder Umgebung von male-<br>rischer Wirkung, in Felspartien, als<br>Unter- und Vorpflanzung bei Gehölz-<br>gruppen, zur Belebung von Teichufern,<br>oder als Gruppen- und Einzelpflanze<br>auf dem Rasen. Eine Beigabe von<br>feuchtem Torf bei der Pflanzung fördert<br>das Wachstum. | 0.60    |
| „ <b>ramulosum</b> , Frauenfarn  |  | 0.75    |
| „ <b>Fil. fem. cristata</b> , Frauenfarn   |  | 0.75    |
| „ <b>multifidum</b>  |  | 1.25    |
| <b>Osmunda Claytoniana</b> , Königsfarn  |  | 1.25    |
| „ <b>gracilis</b>  |  | 0.75    |
| „ <b>regalis</b>   |  | 0.30    |
| <b>Pteridium aquilinum</b> , Adlerfarn   |  | 0.50    |
| <b>Scolopendrium officinarum</b> , Hirschzunge   |  | 1.25    |
| „ <b>undulatum</b>   |  | 0.50    |
| <b>Struthiopteris germanica</b> , Straußfarn   |  |         |
| <b>Fritillaria</b> (L.), Kaiserkrone   |  |         |
| „ <b>imperialis</b> (giftig), gelbbraun-scharlachrot, April-Mai  |  | M. 0.40 |
| <b>Funkia</b> (Spreng.), Funkie  |  |         |
| „ <b>cucullata</b> , frischgrün  | Findet am besten Verwendung bei<br>Fontänen, Ufern und als Einfassung.<br>Die bunten Sorten liefern mit ihren<br>Blättern ein gern gesehenes Binde-<br>material; für Halbschatten.   | M. 0.50 |
| „ <b>Fortunei</b> , blaugrün, dickes Laub  |  | 0.60    |
| „ <b>Sieboldi</b> , großbl., blaugrün  |  | 0.50    |
| „ <b>subcordata grandiflora</b> , hellgrün   |  | 0.50    |
| „ <b>undulata</b> , weißbunt   |  | 0.40    |
| „ <b>var. marg. lutescens</b> , gelbbunt   |  | 0.50    |
| <b>Gaillardia</b> (Foug.), Kokardenblume   |  |         |
| „ <b>grandifl. hybr.</b> , gelb, innen rot, Juni-September, Verwendung als erstklassige Gärten-<br>und Rabattenstaude, sowie Schnittstaude ersten Ranges. Nicht ganz winterhart  |  | M. 0.40 |
| <b>Galanthus</b> (L.), Schneeglöckchen   |  |         |
| „ <b>nivalis</b> , weiß, März-April, für schattige Stellen   |  | M. 0.10 |
| <b>Gentiana</b> (L.), Enzian   |  |         |
| „ <b>acaulis</b> , eine alpine Pflanze, die sich vor anderen dieser Art durch die Größe<br>ihrer strahlend blauen Blumen auszeichnet; sie bildet Rasen und die 6 cm hohen<br>Stängel tragen eine einzige Blume im Mai-Juni |  | M. 0.40 |
| <b>Geum</b> (L.), Nelkenwurz   |  |         |
| „ <b>coccineum</b> , leuchtendrot  | Niedrige oder halbhohle, buschige<br>Staude mit lockern Doldenrispen,<br>Mai-Juli.   | M. 0.40 |
| „ „ <b>Mrs. Bradshaw</b> , scharlachrot, groß-<br>blumig, gefüllt  |  | 0.80    |
| „ <b>Heldreichii</b> , <b>magnificum</b> , großblumig  |  | 0.40    |
| „ „ <b>splend. superba</b>   |  | 0.40    |
| <b>Gладиолус</b> (L.), Siegwurzel  |  |         |
| „ <b>Childsi Hybr.</b>   | Prachtmischung in allen Farben, vorzügliche Rabattenstaude<br>und zum Schnitt, Juli-September. Die Zwiebeln sind frostfrei<br>zu überwintern.  | M. 0.15 |
| „ <b>gandavensis Hybr.</b>   |  |         |
| „ <b>Lemoinei</b>  |  |         |
| „ <b>Nancyanus</b>   |  |         |
| <b>Glyceria</b> (R. Br.), Süßgras  |  |         |
| „ <b>spectabilis fol. var.</b> , gelbbunt, bis 150 cm hoch, zur Uferdekoration   |  | M. 0.50 |
| <b>Gunnera</b> (L.), Färbernessel  |  |         |
| „ <b>scabra</b> , Rhabarber ähnliche Riesenstaude bis 2 m, verlangt Winterschutz   |  | M. 1.50 |
| <b>Gynerium</b> (Humb.), Pampasgras  |  |         |
| „ <b>argenteum</b> , weiße Rispen, August-September, 1½—2 m, verlangt Winterschutz   |  | M. 1.50 |
| Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei<br>Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.   |  |         |



Gypsophila (L.), Gipskraut

- „ *paniculata*, weiß, Juni-August . . . ) frisch und getrocknet als lockeres Binde- ( M. 0.35  
 „ „ *fl. pl.*, gefüllt, Juni-August . . . ) material; zum Bepflanzen von Felsen ( „ 0.70

Helenium (C.), Sonnenbraut

- „ *autumnale superbum*, goldgelb, 2 m . . . } Ähnlich Sonnenblumen, für Garten- ( M. 0.50  
 „ *Bigelowi*, goldgelb, Mitte schwarz, niedrig . } dekoration und Schnitt, Juni-Sept., ( „ 0.50  
 „ *Hoopesi*, orange-gelb, Mai . . . . . } Höhe je nach Art 0,70—2 m ( „ 0.40  
 „ *pumilum magnif.*, reingelb, niedrig . . . } ( „ 0.60  
 „ *Riverton Beauty*, zitron.-gelb, Mitte schwarz

Helianthus (L.), Sonnenblume

- „ *doronicoides*, Gemswurzel ähnlich . . . } Dekorations- und Schnittstaude, ( M. 0.50  
 „ *giganteus*, schwefelgelb . . . . . } Juli-Oktober, Höhe 1—2 m  
 „ *microcephalus*, kleinbl. gelb . . . . . }  
 „ *rigidus* Mrs. Mellish, gelb, großbl. . . }  
 „ „ *semiplenus*, hellgelb . . . . . }

Heliopsis (Pers.), Sonnenauge

- „ *soleil d'or*, goldgelb . . . . . ) Juli-Oktober, Höhe 1—1½ m für größere Gärten ( M. 1.—  
 „ *scabra* var. *Pitscheriana*, gelb ) und Schnitt ( „ 0.60

Helleborus (L.), Christrose

- „ *Hybridus i. Farb.* weiß, gelb, rot usw. ) Die Blüten entwickeln sich schon vor den ( M. 0.60  
 „ *niger*, weiß . . . . . ) Blättern im Dez.-März; für Halbschatten ( „ 0.80

Hemerocallis (L.), Taglilie

- „ *Apricot*, goldgelb . . . . . } M. 0.40  
 „ *aurantica*, dunkelorange . . . . . } „ 0.70  
 „ „ *major*, orange-gelb . . . . . } „ 0.70  
 „ *flava*, goldgelb . . . . . } Vorzugsweise zur Bepflanzung von Ufern und zum ( „ 0.40  
 „ *fulva*, gelbrot . . . . . } Schnitt, Mai-Juli ( „ 0.40  
 „ *Gold Dust*, goldgelb . . . . . } „ 0.50  
 „ *Orange man*, orange-gelb . . . . . } „ 0.50  
 „ *rutilans*, gelb, außen braun . . . . . } „ 0.40

Hepatica (L.), Leberblümchen

- „ *triloba coerulea*, blau . . . . . } Hübsche Frühlingsblüher für Alpinum und Park, ( M. 0.40  
 „ „ *fl. alba*, weiß, gefüllt . . . . . } besonders in Massen wirkungsvolle Schatten-  
 „ „ *fl. rosea*, rosa . . . . . } pflanze. Februar-April.  
 „ „ *rubra pl.*, rot, gefüllt . . . . . }

Heracleum (L.), Bärenklau

- „ *giganteum*, Blattpfl., Einzelpflanze, 1½—2 m . . . . . M. 0.60

Hesperis (L.), Nachtkiefer

- „ *matronalis*, lila, Juni-Juli, wohlriechende Rabattenstaude . . . . . M. 0.30

Heuchera (L.), Purpurglöckchen

- „ *brizoides gracillima*, zartrosa, Mai-Juli, wertvoll für Schnitt und Alpinum . . . . M. 0.40

Hyacinthus (L.), Hyazinthe

- in Farben gemischt, rot, rosa, gelb, blau, weiß . . . . . M. 0.2<sup>0</sup>

Hydrangea (L.), Hortensie

- „ *hortensis*, weißlichrosa, dekorativ . . . . . M. 0.80  
 „ „ *fol. var.*, weißlichrosa mit weißbunten Blättern, dekorativ . . . . . „ 0.90

Iberis (L.), Schleifenblume


- „ *correaefolia*, weißrosa . . . . . } Niederliegende buschige Staude, ( M. 0.35  
 „ *sempervirens*, weiß . . . . . } alpinen Charakters mit immer-  
 „ „ var. „Schneeflocke“, weiß großbl. } grünen Blättern, April-Mai  
 „ weißer Zwerg, weiß . . . . . }

Incarvillea (Franch.), Freiland-Gloxinie

- „ *Delavayi*, rot . . . . . } für Gruppen, reichblühend, nicht ganz winterhart, Mai-Juni M. 0.50  
 „ *grandifl.*, purpurrot, großbl. }

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.





Gruppe Iberis in Sorten

**Inula** (L.), Alant

1 Stück

- „ **macrocephala**, gelbblühende Blattstaude, Juli-August, 1—2 m . . . . . M. 0.50

**Iris** (L.), Schwertlilie

Wenige Pflanzen sind so hart und anspruchslos, wie die bekannten Schwertlilien mit ihren weichen Farbtönen. Etwas empfindlicher als unsere deutschen Schwertlilien (*I. germanica*) sind die japanischen (*I. Kaempferi*) in verschiedenartigsten Farbschattierungen. Zeichnungen (Adern, Marmorflecken usw.) und können mit Recht die Orchideen des Freilandes genannt werden. *I. germanica* entfaltet ihre Blütenpracht schon Mai-Juni, *I. Kaempferi* von Juni-Juli.

- „ **Actorum**, violett, Mai-Juni . . . . . M. 0.40  
 „ **germanica**, in nachstehenden Sorten: . . . . . M. 0.35

**albicans**, weiß

**Amelia**, lila, innen gelbblau

**aurea**, gelb

**candianus**, hellblau mit violett

**Comte de St. Clair**, weiß-bläulich

**Darius**, hellgelb-lila

**flavescens**, gelblich-weiß

**Fulda**, silberblau

**Gracchus**, gelb, rot geadert

**Iriskönig**, Neuheit! zitronengelb,  
 untere Blätter samtig dunkelbraun, weiß  
 umsäumt a M. 1.—

**Judith**, gelb mit lila

**Kharput**, purpur

**Lucretia**, gelblich bis zartblau

**Mad. Chereau**, reinweiß, lila gerandet

**Magnet**, karmin-rotbraun

**Maori King**, goldgelb, Hängeblätter schwarz-  
 braun

**Mrs. H. Darwin**, weiß, lila geadert

**Mrs. Neubronner**, rein goldgelb

**Parisiensis**, blau-violett

**Queen of May**, rosa-violett

**Rhein-Nixe**, Neuheit! reinweiß,  
 untere Blätter veilchenblau, weiß umrandet  
 a M. 1.—

**spectabilis**, samtig-blau

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei  
 Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>Iris</b> <i>interregna</i> , Halbdan, hellcremangelb . . . . .                             | } Kreuzung zwischen <i>I. germanica</i> und <i>I. pumila</i> , in Höhe und Blütezeit zwischen beiden stehend                    | } M. 0.75 |
| „ <i>Helge</i> , zitronengelb . . . . .   |   |           |
| „ <i>Ingeborg</i> , reinweiß . . . . .  |   |           |
| „ <i>Walhalla</i> , lila, hängende Blätter, weinrot . . . . .                                 |   |           |
| „ <b>Kaempferi</b> , in nachstehenden Sorten bzw. Farben . . . . .                            |   | M. 0.50   |
| Statt der umständlichen japanischen Namen sehen wir Buchstaben.                               |   |           |
| a) weiß, blau schattiert  | k) weiß, Rand rosa, weißgeadert, gefüllt  |           |
| b) blau, äußerer Rand weiß  | l) dunkelblau, Blumen empfindlich   |           |
| c) purpur, weißgenarbt, gefüllt   | m) „ großblumig, gefüllt  |           |
| d) „ weiße Adern,   | n) reinweiß, gefüllt  |           |
| e) veilchenblau, außen weiß   | o) „ einfach  |           |
| f) tiefblau, gefüllt  | p) weiß, purpur geadert   |           |
| g) violett, weiße Adern   | q) violett mit weiß, gefüllt  |           |
| h) weiß, lila angehaucht, großblumig  | r) tiefblau, gefüllt, großblumig  |           |
| i) hellblau, weiß überlaufen, gefüllt   | s) weiß, blau geadert, gefüllt  |           |
| „ <b>longipetala superba</b> , zartblau, bis 1½ m hoch, Mai-Juni . . . . .                    |   | M. 0.50   |
| „ <b>ochroleuca gigantea</b> , weiß . . . . .   | } große auffallende Blumen, Juni-Juli, bis 1½ m   | „ 0.40    |
| „ <i>sulfurea</i> , schwefelgelb . . . . .  |   |           |
| „ <b>orientalis</b> „ <i>Schneekönigin</i> “, weiß, großblumig, Mai-Juni . . . . .            |   | „ 0.40    |
| „ <b>Pseudacorus</b> , gelb, liebt feuchte Lage . . . . .                                     |   | „ 0.40    |
| „ <b>pumila coerulea</b> , hellblau . . . . .   | } 20 bis 40 cm hoch, zu gleichmäßigen Einfassungen und Gruppen, für sonnige Abhänge und trocknen Standort, blühen Anfang April. | } M. 0.30 |
| „ „ <i>cuprea</i> , violett . . . . .   |   |           |
| „ „ <b>hybr.</b> „ <i>Schneekönigin</i> “, weiß . . . . .                                     |   |           |
| „ „ in Farben, blau, gelb, weiß . . . . .   |   |           |
| „ <b>sibirica</b> , in 2 Farben blau oder weiß, Mai-Juni, für Schnitt, wohlriechend . . . . . |   | M. 0.40   |

**Kniphofia** (Münch.), Tritome

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| „ <b>pauciflora</b> , gelb, kleinblumig . . . . . | } mit schwertförmigen Blättern; wirkungsvolle Einzelpflanze, Juli-August, verlangt Winterschutz | } M. 0.70 |
| „ <b>Uvaria grandifl.</b> , rot . . . . .         |   |           |

**Lathyrus** (L.), Platterbse

|  |         |
|--|---------|
| „ <b>latifolius hybr.</b> , weiß, rot, rosa. Juli-August, zum Beranken von Gittern . . . . . | M. 0.30 |
|--|---------|

**Leontopodium** (C.), Edelweiß

|  |         |
|--|---------|
| „ <b>alpinum</b> , weiß, Juni-September, für Felspartien . . . . . | M. 0.40 |
|--|---------|

**Leucojum** (L.), Knotenblume

|  |         |
|--|---------|
| „ <b>vernum</b> , Schneeglöckchen ähnlich, für Gruppen und vor Gebüsch, in schattiger Lage | M. 0.10 |
|--|---------|

**Liatris** (Gärtn.), Prachtscharte

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| „ <b>callilepis</b> , leuchtend, karmin-rosa . . . . . | } für Rabatten, Alpinum und Schnitt, Juli-Oktober | } M. 0.50 |
| „ <b>pycnostachya</b> , purpur-rosa . . . . .          |   |           |
| „ <b>spicata</b> , violett-purpur . . . . .            |   |           |

**Lilium** (L.), Lilie

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| „ <b>candidum</b> , weiße oder Madonnalilie, bekannte, sehr schöne Art . . . . .                                  | } Juni-August | } M. 0.40 |
| „ <b>lancifol. album Kraeheri</b> , weiß . . . . .  |               |           |
| „ „ <i>rubrum</i> , rotgefleckt . . . . .   |               |           |
| „ <b>longiflorum giganteum</b> , 50–70 cm hoch, mit sehr großen, weißen, weitgeöffneten Trompetenblumen . . . . . |               |           |
| „ <b>multiflorum</b> , 50–70 cm hoch, mit sehr großen, weißen, weitgeöffneten Trompetenblumen . . . . .           |               |           |
| „ <b>Martagon</b> , fleischfarbig, kleinblumig, Türkenbundlilie . . . . .   |               |           |
| „ <b>pardalinum</b> , Leupferdlilie mit orangegelben, rotgeflamten Blumen . . . . .                               |               |           |
| „ <b>pomponicum luteum</b> mit kleinen, gelben, rundgeformten Blumen, sehr reichblühend . . . . .                 |               |           |
| „ <b>tigrinum</b> , braunrot, gefleckt, Tigerlilie . . . . .  |               |           |
| „ „ fl. pl. mit gefüllten Blumen . . . . .  |               |           |
| „ „ <b>grandiflorum</b> , sehr großblumig . . . . .   |               |           |
| „ „ <b>splendens</b> , Blumen von leuchtender Farbe . . . . .   |               |           |
| „ <b>umbellatum grandiflorum</b> , rot, schwarzgefleckt . . . . .   |               |           |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Lunaria</b> (L.), Judas Silberling  |   | 1 Stück           |
| " <b>biennis</b> , weiß und blau; die silberglänzenden Scheidewände der Schoten bleiben nach dem Samenausfall stehen. Verwendung zu Trockenbuketts . . . . . |   | M. 0.15           |
| <b>Lupinus</b> (L.), Lupine  |   |                   |
| " <b>polyphyllus</b> , blau . . .  | } Wird zur Ausschmückung von Bosketts, im lichten Zier-gehölz und zum Schnitt verwendet. Juni-August.                                       | M. 0.40           |
| " " <b>albus</b> , weiß . . .  |   | " 0.40            |
| " " <b>roseus</b> , zartrosa . . .   |   | " 0.50            |
| <b>Lychnis</b> (L.), Lichtnelke  |   |                   |
| " <b>chalcedonica</b> , scharlachrot . . . . .   | } Bekannte Staude, für Rabatten und Gruppen. Mai-Juli.  | M. 0.35           |
| " " <b>alba pl.</b> , weiß, gefüllt . . . . .  |   | " 0.40            |
| " " <b>rosea pl.</b> , rosa . . . . .  |   | " 0.60            |
| " " <b>rubra pl.</b> , rot, gefüllt . . . . .  |   | " 0.40            |
| " <b>divaricata rubra pl.</b> , rot, gefüllt . . .   |   | " 0.40            |
| " <b>viscaria splendens fl. pl.</b> , magentarot . . .   |   | " 0.40            |
| <b>Megasea</b> (Engl.), Riesen-Steinbrech  |   |                   |
| " <b>speciosa</b> , rot, April-Mai, unentbehrlich zu Einfassungen, auf Steingruppen, an Wasserfällen usw., 30—50 cm hoch . . . . .                           |   | M. 0.40           |
| <b>Montbretia</b> (D. C.), Montbretie  |   |                   |
| " <b>crocosmiaeflora</b> , ziegelrot, Juli-September, für Gruppen, frostfrei überwintern . .   |   | M. 0.10           |
| <b>Mulgedium</b> (Cass.), Milchlattich   |   |                   |
| " <b>Bourgaei</b> , zartblau . . .   | } Juni-August, empfehlenswerte Schattenpflanze . . . . .  | M. 0.40           |
| " <b>giganteum</b> , lila . . .  |   |                   |
| <b>Myosotis</b> (L.), Vergißmeinnicht  |   |                   |
| " <b>alpestris</b> , himmelblau, Mai-Juni; beliebt für Rabatten und Einfassungen . . . . .   |   | M. 0.10           |
| <b>Narcissus</b> (L.), Narzisse  |   |                   |
| " einfach und gefüllt, weiß und gelb, April-Mai . . . . .  |   | M. 0.15           |
| <b>Nuphar</b> (Sen.), Nixenblume   |   |                   |
| " <b>luteum</b> , gelb, Juni-August. Winterharte Wasserstaude . . . . .  |   | M. 0.50           |
| <b>Nymphaea</b> (Sm.), Seerose   |   |                   |
| " <b>alba</b> . . . . .  |   | M. 0.50           |
| " in Sorten und Farben, Juni-August . . . . .  |   | M. 3.— bis " 10.— |
| <b>Oenothera</b> (L.), Nachtkerze  |   |                   |
| " <b>fruticosa</b> , dottergelb . . . . .  | } Sehr genügsam, lieben kalkhaltigen, trocknen und sonnigen Boden. An Abhängen und vor Bosketts besonders schön. Schnittblume. Juni-August. | } M. 0.40         |
| " <b>glabra</b> , dottergelb, Blätter braun . . . . .  |   |                   |
| " <b>missouriensis</b> , schwefelgelb . . . . .  |   |                   |
| " <b>speciosa</b> , weiß . . . . .   |   |                   |
| <b>Orobis</b> (Bernh.), Waldwicke  |   |                   |
| " <b>purpureus</b> , purpurn . . . . .   |   | M. 0.40           |
| " <b>varius</b> , lachsfarbig . . . . .  |   | " 0.80            |
| " <b>vernus roseus</b> , rosa . . . . .  |   | " 0.40            |
| <b>Papaver</b> (Tourn.), Mohn  |   |                   |
| " <b>alpinum</b> , weiß, gelb, rosa, f. Alpinum u. Einfassung, 10—15 cm hoch . . . . .   | } sehr reichblühend, namentlich in trockenen Gärten, wirkungsvolle Einzel- und Gruppenpflanzen. Mai-Juni.                                   | M. 0.40           |
| " <b>nudicaule</b> , " " " " " Schnitt, 20—30 cm hoch . . . . .  |   | " 0.40            |
| " <b>orientale</b> in Farben gemischt . . . . .  |   | " 0.40            |
| " <b>Brightness</b> , orangerot, braun gefleckt . . . . .  |   | " 0.50            |
| " <b>Großfürst</b> , zinnoberrrot . . . . .  |   | " 0.50            |
| " <b>Prinzess Ena</b> , zartrosa . . . . .   |   | " 0.50            |
| " <b>Prinzessin Viktoria Luise</b> , lachsfarbig . . . . .   |   | " 0.50            |
| " <b>Salmon Queen</b> , lachsfarbig . . . . .  |   | " 0.50            |
| " <b>Semiplenum</b> , scharlachrot gefüllt . . . . .   |   | " 0.50            |
| " <b>Silberblick</b> , lachsrot, innen weiß . . . . .  |   | " 0.40            |
| " <b>pilosum</b> , scharlachrot, weißgefleckt . . . . .  |   | " 0.50            |
| " <b>rupifragum atlanticum</b> , orangerot . . . . .   |   | " 0.40            |
| " <b>trauriculum</b> , orange gelb . . . . .   |   | " 0.40            |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



**Paeonia** (L.), Pfingstrose. Verlangt nahrhaften, tiefgründigen Boden und sonnige Lage, Mai-Juni

Einzelpflanze für Rabatten.

**chinensis:**

|   |         |
|---|---------|
| " Achilles, lila mit lichtgrünem Schimmer | M. 0.80 |
| " Agida, violett-rosa, gefüllt            | " 0.70  |
| " Albâtre, weiß, Mitte karmin             | " 1.20  |
| " bicolor, zartrosa, Mitte gelb           | " 1.20  |
| " Delachéi, dunkelrot                     | " 0.80  |
| " Duchesse de Nemours, gelb               | " 0.70  |
| " Duke of Wellington, rahmweiß            | " 1.—   |
| " edulis superba, hellrosa                | " 0.80  |
| " festiva, schneeweiß                     | " 0.80  |
| " maxima, schneew., großbl.               | " 0.80  |
| " Jeanne d'Arc, rosa, Mitte crème         | " 0.80  |
| " insignes, violettrosa                   | " 0.70  |
| " officinalis rubra plena, rot, gefüllt   | " 0.50  |
| " tenuifolia fl. pl., rot, gefüllt        | " 1.—   |

**chinensis:**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| " Mad. Costé, rosa, Mitte gelb          | M. 0.80 | 1 Stück |
| " de Gachan, rosa                       | " 0.70  |         |
| " Vatry, rosa, Mitte weiß               | " 0.80  |         |
| " Verneville, lachsfarbig               | " 0.70  |         |
| " Marie Lemoine, hellgelb, spätblüh.    | " 1.50  |         |
| " Modeste, dunkelrot                    | " 0.70  |         |
| " Paul Rissbourg, hellviolett, rot      | " 0.70  |         |
| " Revesiana pl., violett., sehr großbl. | " 0.80  |         |
| " Stanley, zartrosa, gefüllt            | " 0.80  |         |
| " Thorbecki, schön rosa                 | " 0.70  |         |
| " Wellington, hellrot                   | " 0.70  |         |
| " White Queen, weiß                     | " 0.80  |         |
| " Whitleyi major, weiß, großbl.         | " 1.60  |         |

**Pentstemon** (Mitsch.), Barfaden

|   |        |
|---|--------|
| " Newbury Gem, rot, Juni-Juli, fingerhutähnliche Blüte, Rabattenpflanze | M. 1.— |
|---|--------|

**Phalaris** (L.), Glanzgras

|   |         |
|---|---------|
| " arundinacea var. picta, weiße Ähren, weißgestreifte Blätter | M. 0.30 |
|---|---------|

**Phlox** (L.), Flammenblume

|  |   |
|--|---|
| amoena, magentarot, kriechend, für Gruppen und Alpinum . . . . . | M. 0.30   |
| decussata in nachstehenden Sorten . . . . .                      | " 0.40  |
| Boule de feu, leuchtendrot                                       | } zur<br>Rabattenbildung<br>und<br>zu Einfassungen;<br>auch zum Schnitt.<br>Juli-September. |
| Brillant, scharlachrot   |   |
| Clara Benz, rosa karmin  |   |
| Coquelicot, leuchtendrot   |   |
| Eclairer, purpurn, großbl.                                       |   |
| Etna, dunkelkarmin   |   |
| Fernand Cortez, orang.-purp.                                     |   |
| Flora Hornung, karminr. m. weiß                                  |   |
| setacea atropurpurea, purpurrosa . . . . .                       | } M. 0.40   |
| Newry Seedling, lila . . . . .                                   |   |
| nivalis, weißlichrosa . . . . .                                  |   |
| stellaria rubescens, blaulila . . . . .                          |   |
| suffruticosa: Juni-September                                     |   |
| Andrew Kerr, weiß in lila übergehend . . . . .                   |   |
| Indian Chief . . . . .   |   |
| Mrs. Greenless, weiß, Auge lila . . . . .                        |   |
| Ringleader, weiß, kirschrot schattiert                           |   |
| Snowdown, reinweiß, große Dolde                                  |   |

**Physalis** (L.), Judenkirsche

|   |         |
|---|---------|
| " Franchetti, weiß, Juli-September, rote Früchte; zum Einmachen | M. 0.30 |
|---|---------|

**Polemonium** (L.), Sperrkraut

|   |         |
|---|---------|
| " reptans, blaßblaue, glockenförmige Blume, Mai, Rabattenstaude | M. 0.40 |
|---|---------|

**Polygonum** (L.), Knöterich

|  |                              |         |
|--|------------------------------|---------|
| " cuspidatum, weiße Rispen                     | } starkwuchernd, Juli-August | M. 0.50 |
| " Sieboldi var. spectabile, weiß, buntblättrig |                              |         |

**Potentilla** (L.), Fingerkraut

• Eine sehr hübsche, allgemein zu empfehlende Boskettstaude, mit erdbeerartigen Blättern; sehr geeignet zur Bepflanzung von Beeten und Steingruppen. Juni-August.

|   |         |
|---|---------|
| " in verschiedenen Sorten von gelber, oranger und roter Färbung | M. 0.50 |
|---|---------|

**Primula** (L.), Schlüsselblume

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| " acaulis purpurea, einfach, rot     | } Blütezeit März-Juni, liebt halbschattige Lage, besonders Sieboldi. | M. 0.30 |
| " Auricula, gelb, rot, rosa, violett |  | " 0.25  |
| " capitata, dunkelblau               |  | " 0.40  |
| " Sieboldi, weiß, rot, rosa, violett |  | " 0.35  |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

1 Stück

|  |   |         |
|--|---|---------|
| hybr. album plenum, weiß, gefüllt . . .                            | Auf Rasenflächen und besonders zum Schnitt vorteilhaft. Sie blüht zweimal: im Mai-Juni und im August-September, für sonnige Lage. | M. 0.60 |
| " Alice Roosevelt, halbgefüllt, rosa . .                           |   |         |
| " Aphrodite, reinweiß, gefüllt großbl. .                           |   |         |
| " Empress Queen, lila, rosa, extra großbl.                         |   |         |
| " Figaro, rot, gefüllt . . . . .                                   |   |         |
| " James Kelway, rot, einfach . . . . .                             |   |         |
| " Lord Roseberry, karminrot, gefüllt, empfehlenswert               |   |         |
| " Princ. Metternich, reinweiß, großbl.                             |   |         |
| " Yvonne Cayeux, weiß, Zentrum gelb, gefüllt, sehr schön . . . . . |   |         |

**Ranunculus** (L.), Hahnenfuß

*speciosus* fl. pl., gelb, Mai-Juni, 30—35 cm hoch . . . . . M. 0.40

### Rheum (L.), Rabarber

„ **Queen Victoria**, Blattpflanze zur Dekoration. Stiele werden zu Kompott verwandt . . M. 0.70

**Rudbeckia** (L.), Rudbeckie

|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| " | laciniafl. fl. pl. „Goldball“, gefüllt . . . . . | In der gefüllten Spielart „Goldball“ erreichen sie | M. 0.40 |
| " | „ Goldstrahl, zierlich, gelb . . . . .           | ihre vollkommene Form. Einzelnd stehend wie        | " 0.70  |
| " | lancifolia chinensis, goldgelb . . . . .         | truppweise verwendet, ist „Goldball“ von hervor-   | " 0.70  |
| " | Neumann, goldgelb, innen schwarz . . . . .       | ragender Wirkung und von langer Dauer. Juli-       | " 0.40  |
| " | purpurea, weinrot . . . . .                      | Okt. Vorzügliche Schnittblume. 60—180 cm.          | " 0.50  |

**Saxifraga** (L.), Steinbrech

|    |  |                                      |
|----|--|--------------------------------------|
| 38 | <b>Aizoon purpurea</b> , rosa mit Rosetten . . . .   |                                      |
| 39 | <b>Cotyledon pyramidalis</b> , rosa . . . .          | besonders für Steingruppen, wo er    |
| 40 | <b>decipiens grandifl.</b> alba, weiß . . . .        | hübsche Polster in Rosetten bildet,  |
| 41 | <b>rosea</b> , rosa . . . .                          | von denen sich die kleinen weiß-rosa |
| 42 | <b>peltata</b> , halbschattige Lage bis 1 m . . . .  | Blüten wirkungsvoll abheben.         |
| 43 | <b>Rhei</b> , rosa, Rasen bildend . . . .            | April-Juni                           |
| 44 | <b>rotundifolia</b> , weiß, purpur punktiert . . . . |                                      |

M. 0.35

**Scabiosa (L.), Grindkraut**

|   |  |      |
|---|--|------|
| " | <b>caucasica</b> , himmelblau, ausgezeichnete Schnittstaude, Juni-September . . . . . M. | 0.50 |
| " | <b>alba</b> , weiß, " " " " " "  | 0.50 |

**Sedum** (L.), Fetthenne, Fettblatt

|    |  |   |           |
|----|--|---|-----------|
| 71 | <b>Aizoon</b> , gelb                         | } Ausdauernde, saftig-fleischige Staude mit verschiedenen gestalteten Blättern und kleinen Blüten. Felsen teppichartig überziehend. Juni-August, sonnige Lage | } M. 0.40 |
| 71 | <b>album</b> , weiß, Rasen bildend . . . . . |   |           |
|    | <b>Anacampseros</b> , purpurrosa             |   |           |
|    | <b>Ewersi</b> , rosenrot, blaugrüne Blätter  |   |           |
| 79 | <b>glaucum</b> , fleischfarbig               |   |           |
| 81 | <b>kamtschaticum</b> , gelb . . . . .        |   |           |
| 79 | <b>maximum purpureum</b> , purpurn           |   |           |
|    | <b>populifolium</b> , rosaweiß . . . . .     |   |           |
| 77 | <b>Sieboldi</b> , zartrosa, Blätter blaugrün |   |           |
| 77 | <b>spectabile atropurpureum</b> , tiefrot    |   |           |
| 79 | <b>spurium</b> , rosenrot . . . . .          |   |           |
|    | <b>album</b> , weiß                          |   |           |

**Sempervivum** (L.), Hauslauch

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| „ arachnoideum gnaphalium . . . .<br>„ fimbriatum . . . . .<br>„ juratense . . . . .<br>„ rufhenicum . . . . .<br>„ friste . . . . . | Bekannte fleischige Staude für Alpinum und<br>altes Mauerwerk. Die weiß bis roten Blüten<br>entfalten sich juni-August. | { M. 0.35 |
|--|---|-----------|

**Senecio** (L.), Kreuzkraut

„ **Veitchianus**, gelb, Juni-August, bis 1 m hohe Wasserpflanze . . . . . M. 0.80

**Solidago (L.), Goldrute**

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| " <i>aspera</i> , hellgelb 1 m . . . . .                  | } zu Schnitt und Dekoration { | ( M. 0.40 |
| " <i>canadensis</i> , goldgelb . . . . .                  |                               |           |
| " <i>Shortii</i> , gelb . . . . .                         |                               |           |
| " <i>virgo aurea praecox</i> , goldgelb niedrig . . . . . |                               | M. 0.70   |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



Spiraea (L.), Spierstrauch

1 Stück

|  |   |         |
|--|---|---------|
| " <i>Aruncus</i> , weiß . . . . .                            | } Einzeln oder in Gruppen auf dem Rasen und an Teichen stehend, sehr dekorativ und besonders zu empfehlen. Juni-August. Höhe 50—150 cm. | M. 0.40 |
| " <i>Filipendula fl. pl.</i> , weiß, rosa, gefüllt . . . . . |   | " 0.40  |
| " <i>palmata purpurea</i> , braunrot . . . . .               |   | " 0.50  |
| " " <i>rosea</i> , rosa . . . . .                            |   | " 0.50  |
| " <i>pubescens</i> , weißlich . . . . .                      |   | " 0.40  |
| " <i>trifoliata</i> , weiß-rosa . . . . .                    |   | " 0.40  |
| " <i>Ulmaria aurea</i> var., weiß, Blätter gelb b. . . . .   |   | " 0.40  |
| " " <i>fl. pl.</i> , reinweiß, gefüllt . . . . .             |   | " 0.40  |

Statice (L.), Sandnelke

|  |         |
|--|---------|
| " <i>eximia fl. alba</i> , weiß, Juli-August, für Rabatten und Schnitt . . . . . | M. 0.50 |
|--|---------|

Stokesia (L. Herit.), Stokesie

|   |         |
|---|---------|
| " <i>cyanea</i> , hellblau, Juli-Oktober, für Gruppen und Schnitt . . . . . | M. 0.60 |
|---|---------|

Telekia (Schreb.), Ochsenauge

|   |         |
|---|---------|
| " <i>speciosa</i> , orangegelbe Blütenköpfe, Juli-August, 1½—2 m hoch . . . . . | M. 0.50 |
|---|---------|

Thalictrum (L.), Wiesenraute

|   |                           |         |
|---|---------------------------|---------|
| " <i>adiantifolium</i> , weißgelb . . . . . | } Juni-August zum Schnitt | M. 0.40 |
| " <i>Delavayi</i> , rosa . . . . .          |                           | " 0.40  |
| " <i>flavum</i> , gelb . . . . .            |                           | " 0.50  |

Trollius (L.), Trollblume

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
| " <i>Fortunei fl. pl.</i> , goldgelb . . . . . | } für Abhänge und Rabatten, Mai-Juli | { M. 0.50 |
| " <i>hybr. Orange globe</i> . . . . .          |                                      |           |

Tulipa (L.), Tulpe

|  |         |
|--|---------|
| " in Sorten und allen Farben . . . . . | M. 0.10 |
|--|---------|

Thypha (L.), Kolbenrohr

|  |         |
|--|---------|
| " <i>latifolia</i> , gelb, Juni-juli, 100—150 cm, für Teichanlagen . . . . . | M. 0.40 |
|--|---------|

Verbascum (L.), Königskerze

|   |  |         |
|---|--|---------|
| " <i>caledonia</i> , rosa . . . . .         | } Hochdekorativ, Juni-September, 1—2 m hoch. | M. 0.60 |
| " <i>densiflorum</i> , kupfergelb . . . . . |  | " 0.75  |
| " <i>olympicum</i> , gelb . . . . .         |  | " 0.60  |

Veronica (L.), Ehrenpreis

|   |                              |         |
|---|------------------------------|---------|
| " <i>incana</i> , dunkelblau für Einfassung . . . . .       | } Juni-August. Sonnige Lage. | M. 0.35 |
| " <i>longifolia alba</i> , weiß, für Rabatten . . . . .     |                              | " 0.40  |
| " <i>longifolia rosea</i> , lila . . . . .                  |                              | " 0.40  |
| " <i>rupestris</i> , amethystblau, alpine Pflanze . . . . . |                              | " 0.35  |

Viola (L.), Veilchen

|  |         |
|--|---------|
| " <i>cornuta</i> „Gustav Wermig“, eine der besten Züchtungen; den ganzen Sommer und Herbst reichblühendes Hornveilchen von wunderbarer Farbe, ausgezeichnet für Schnitt, Gruppen und Einfassungen. Ganz besonders zu empfehlen . . . . . | M. 0.30 |
| " " <i>Hybriden in Farben</i> , weiß, gelb, orange, lila, blau . . . . .   | " 0.30  |
| " " <i>Papilio</i> , violettblau mit heller Mitte, blüht ununterbrochen bis zum Spätherbste . . . . .  | " 0.25  |
| " <i>cucullata</i> , tiefblau, Mai-Juni . . . . .  | " 0.20  |
| " <i>odorata</i> , blau, März, wohlriechendes, echtes Veilchen . . . . .   | " 0.30  |
| " " <i>Königin Charlotte</i> , dunkelblau, do. . . . .   | " 0.40  |
| " " <i>La France</i> , langstielig, großbl. do. . . . .  | " 0.40  |
| " <i>tricolor maxima</i> (Stiefmütterchen) in allen Farben . . . . .   | " 0.10  |

Wahlenbergia (Schraed.), Plattglocke

|                                       |  |         |
|---------------------------------------|--|---------|
| " <i>grandiflora</i> , blau . . . . . | } Trichterförmig, für kleine Gruppen und Schnitt. Juni-August. | M. 0.50 |
| " " <i>alba</i> , weiß . . . . .      |  |         |

Yucca (L.), Palmlilie

|   |        |
|---|--------|
| " <i>filamentosa</i> , weiß, Juli-August, für Einzelpflanzen und Dekoration . . . . . | M. 1.— |
|---|--------|

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



# ROSEN



Zeichenerklärung für die Rosenklassen:

B=Bourbon-R. N=Noisette-R.  
 HR=Hybrid-Remontant-R. NH=Noisette-Hybrid-R.  
 K=Kletter- u. Schling-R. P=Polyantha-R.  
 M=Moos-R. T=Tee-R.  
 MB=Monats-Bengal-R. TH=Tee-Hybrid-R.

Partiepreise für Sorten nach unserer Wahl:

|             |            |  | 10 Stück<br>M. | 100 Stück<br>M. |
|-------------|------------|--|----------------|-----------------|
| Sträucher   | in Sorten: | Monats-, Remontant- und Teehybridrosen . . .       | 3.50           | 30.—            |
| "           | "          | Polyantharosen, Tee-, Schling- u. botanische Rosen | 4.50           | 40.—            |
| Halbstämme  | "          | aller Gattungen . . . . .                          | 11.—           | 100.—           |
| Hochstämme  | "          | " " 0,90—1,20 m hoch . . . . .                     | 14.—           | 130.—           |
| "           | "          | " " 1,20—1,50 m " . . . . .                        | 16.—           | 150.—           |
| Trauerrosen | "          | der Klasse K 1,50—2 m " . . . . .                  | 24.—           | 230.—           |

## Wichtige Notiz!

Die häufigen Mißerfolge bei Neupflanzungen von Rosen werden — obgleich meist große Fehler bei der Pflanzung und der spätern Behandlung gemacht werden — fast immer dem Lieferanten zur Last gelegt. Wir sehen uns daher veranlaßt, auch hier nochmals auf unsere Verkaufsbedingungen, worin wir jeden Ersatzanspruch ablehnen, aufmerksam zu machen.

- I. Erfordernis bei der Pflanzung ist, daß die Rosen stets feucht bleiben und am besten **frisch angeschlemmt** in den Boden kommen.
- II. Müssen die Kronen der Hochstämme sowohl wie auch die Sträucher beim Pflanzen bis auf  $\frac{1}{3}$  der Zweiglänge zurückgeschnitten werden.
- III. Ist es unbedingt notwendig — hier wird gerade am meisten gefehlt —, daß die Sträucher angehäufelt, die Hochstämme aber umgelegt und mit den Kronen in die Erde gegraben werden; dort bleiben sie solange, bis sie angetrieben haben. Bei trübem Wetter und nach vorausgegangenem Regen entfernt man den angehäuften Boden. Die Stamimrosen werden dann angebunden. Ist das Anhäufeln der Hochstämme aus irgend einem Grunde unmöglich, so binde man Stämme und Kronen in feuchtes Moos ein.

Bei vorangegebener Behandlung sind Ausfälle ziemlich ausgeschlossen; man hat sogar bei **späten** Pflanzungen im Mai selten mehr als **5%** Verlust.



### Zeichenerklärung für Preise:

N = Strauchform       $\frac{1}{2}$  H = Halbstamm      H = Hochstamm

- B = **Bourbon-Rosen**, ziemlich widerstandsfähige Klasse, mit reichem Herbstflor.
- HR = **Hybrid-Remontant-Rosen**, sind ausschließlich harte Sorten, die auch in kälteren Gegenden meist noch gut gedeihen. Es gibt in dieser Klasse weiße, rosa und gelbe Sorten, jedoch herrscht die rote Farbe vor. Die meisten Sorten zeichnen sich durch reiche Blühbarkeit und süßen Duft aus.
- K = **Schling-Rosen**, haben starken Wuchs und sind im allgemeinen unempfindlich gegen Kälte. Diese Klasse hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen zur Bepflanzung von Wänden, Spalieren und Säulen, auch als Pyramiden auf den Rasenflächen. Die Hochstämme dieser Klasse sind als Trauerrosen bekannt und beliebt.
- M = **Moos-Rosen**, im allgemeinen winterhart, haben stark stacheliges Holz; die Blumenkelche sind in grünes Moos eingehüllt.
- MB = **Monats-Bengal-Rosen**, sind sehr dankbar in der Blüte und eignen sich zur Bepflanzung von Beeten und als Einfassungen.
- N = **Noisette** } starkwachsende, teils kletternde Sorten mit reichem  
 NH = **Noisette-Hybrid** } Blütenflor im Herbst.
- P = **Polyantha**, kleinblumige, meist niedrigbleibende, sehr reichblühende Sorten, verwendbar zu Beeten und Einfassungen. Jedenfalls wirkt die Klasse am besten bei geschlossener Pflanzung.
- RP = **Rosa Pernetiana**, neuere, zukunftsreiche Rosenklasse; meist starkwachsend und absolut winterhart.
- T = **Tee-Rosen**, teils frostempfindlich, verlangen daher geeigneten Winterschutz. Die Tee-Rosen nehmen infolge der Farbenschönheit vieler Sorten einen hervorragenden Platz unter den Rosen ein.
- TH = **Tee-Hybrid-Rosen**; von sämtlichen Klassen hat keine andere annähernd so viel wertvolle Neuheiten gebracht, wie diese. Die meisten Treib- und Schnittsorten, viele bewundernswerte Beet- und Rabatten-Rosen gehören zu dieser Familie. Gegenüber den Teesorten haben sie größere Widerstandsfähigkeit und sind an Schönheit und Reichtum der Blüten mindestens gleichwertig.

Schöne Sortimente siehe Seite 151.



| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung           | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten  | Wuchs — Bemerkungen  | 1 Stück M. |                 |      |
|---|---|--------|---|--|------------|-----------------|------|
|   |   |        |   |  | N          | $\frac{1}{2}$ H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |   |        |   |  |            |                 |      |
| 4   | Ännchen Müller (07)                       | P      | eigenart. leuchtend-<br>rosa in Dolden steh.,<br>den ganzen Sommer<br>blühend | mittel,<br>sehr empfehlenswert<br>für Gruppen, vielfach<br>empfindl. geg. Mehltau        | 0.50       | —               | —    |
| 6   | Aglaia (96) . . . . .                     | K      | gelblich, große<br>Dolden   | sehr stark,<br>einmal blühende Park-<br>und Rankrose                                     | 0.50       | —               | 2.50 |
| 10  | Alfred Colomb (66)                        | HR     | feuerrot, groß  | stark  | 0.40       | 1.20            | 1.50 |
| 12  | American Pillar (09)                      | K      | zartrosa,<br>Staubfäden gelb  | stark,<br>sehr reichblühend  | 0.60       | —               | —    |
| 20  | Arthur R. Goodwin<br>(09) . . . . .       | RP     | kupfrig orangefarbt,<br>groß, gefüllt   | mittel, reichblühend   | 0.80       | —               | —    |
| 22  | Augustine<br>Guinoisseau (90)             | TH     | fleischfarbig weiß  | stark, bekannte<br>Schnitt- und Treibrose  | 0.40       | 1.20            | 1.50 |
| 28  | Baronne de Roth-<br>schild (68) . . . . . | HR     | zartrosa, groß  | mittel, Treibrose,<br>extra!   | 0.40       | —               | —    |
| 35  | Beauté de Lyon (10)                       | RP     | prachtvoll korallen-<br>rot   | stark,<br>nicht reichblühend   | 1.—        | —               | —    |
| 40  | Belle Siebrecht (96)                      | TH     | rosa, groß, leicht<br>aufblühend  | mittel, Treib- und<br>Schnittrose, extra!  | 0.40       | 1.20            | 1.50 |
| 45  | Betty (06) . . . . .                      | TH     | kupfrig rosa,<br>groß, gefüllt  | mittel,<br>stark duftend   | 0.70       | —               | —    |
| 51  | Blanche Moreau (81)                       | M      | von feinsten, weißer<br>Farbe,<br>groß, in Büscheln                           | mittel, 2—3 cm lange,<br>schön bemooste<br>Knospen                                       | 0.50       | 1.30            | 1.80 |
| 55  | <b>Bürgermeister<br/>Christen</b> (11)    | TH     | leuchtend rosa,<br>duftend  | mittel, reichblühend   | 1.—        | —               | —    |
| 63  | Camoëns (83) . . . .                      | TH     | leuchtendrosa,<br>locker gefüllt, mittel-<br>groß, duftend,<br>Treibrose      | mittel, außerordentlich<br>reichblühend, sehr<br>empfehlenswert für<br>Gruppen und Beete | 0.50       | —               | —    |
| 65  | Captain Christy (74)                      | HR     | schön rosa, sehr<br>groß  | mittel,<br>Treibrose, extra!   | 0.40       | —               | —    |
| 66  | „ Hayward (94)                            | HR     | samtig karminrot,<br>groß, schalenförmig                                      | mittel,<br>sehr reichblühend   | 0.40       | —               | —    |
| 68  | Carmen (06) [Rugosa]                      |        | leuchtendrot,<br>einfach  | stark,<br>schöner Parkstrauch  | 0.60       | —               | —    |
| 73  | Charles Darwin (80)                       | HR     | dunkelrot, groß   | mittel, schöne Knospe  | 0.40       | —               | —    |
| 85  | Comfesse d'Oxford<br>(70) . . . . .       | HR     | hellkarmin, duftend   | mittel   | 0.40       | —               | —    |
| 87  | <b>Coronet</b> (12) . . . .               | P      | gelb, rosaschattiert,<br>große Dolden   | mittel, sehr reich-<br>blühend, für Gruppen<br>und Beete                                 | 0.80       | —               | —    |
| 88  | Crimson Rambler<br>(94) . . . . .         | K      | lebhaft, karmesin,<br>halb gefüllt in<br>Dolden                               | sehr stark, allgemein<br>bekannt, für Lauben,<br>Pyramiden sehr zu<br>empfehlen          | 0.50       | —               | 2.50 |
| 90  | Cristata (27) . . . .                     | M      | rosa, kugelförmig,<br>groß, duftig  | mittel,<br>Kelch kammförmig,<br>schönste Moosrose  | 0.60       | —               | —    |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung       | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten  | Wuchs — Bemerkungen   | 1 Stück M. |                 |      |
|---|---------------------------------------|--------|---|---|------------|-----------------|------|
|   |                                       |        |   |   | N          | $\frac{1}{2}$ H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |                                       |        |   |   |            |                 |      |
| 95  | Deuil de Paul Fontaine (74) . . . . . | M      | dunkelpurpur,<br>groß   | stark   | 0.55       | 1.30            | 1.80 |
| 96  | Deutschland (10) . . .                | HR     | goldgelb, gefüllt   | stark, Park- und<br>Gruppenrose   | 0.70       | —               | —    |
| 103   | Dora Hansen (11) .                    | TH     | rosa  | mittel, sehr reich-<br>blühend, Schnitt- u.<br>Treibrose                                  | 0.60       | 1.30            | 1.60 |
| 104   | Dorothy Perkins (02)                  | K      | leuchtend rosa,<br>in Büscheln  | sehr stark, sehr dank-<br>bar für Lauben,<br>Pyramiden                                    | 0.50       | —               | 2.50 |
| 109   | Ducher (70) . . . . .                 | MB     | reinweiß  | schwach, reichblühend   | 0.40       | —               | —    |
| 112   | Duchess of Wellington (09) . . . . .  | TH     | kupfrig safrangelb,<br>seltene Färbung  | mittel, stark duftend,<br>reichblühend  | 0.80       | —               | —    |
| 116   | Eclair (84) . . . . .                 | HR     | feuerrot, groß  | mittel  | 0.40       | —               | —    |
| 119   | Edu Meyer (05) . .                    | TH     | kupfriggelb, i. rosa<br>übergehend, groß,<br>Knospe spitz                                       | mittel, auffallende<br>Färbung  | 0.40       | 1.20            | 1.50 |
| 122   | Elise Boëlle (70) . .                 | HR     | weiß, mittelgroß  | mittel, sehr reich-<br>blühend, Treibrose   | 0.40       | 1.20            | 1.50 |
| 123   | Ellen Poulsen (11) .                  | P      | leucht. dunkelrosa,<br>in Büscheln, gefüllt   | mittel, Gruppen- und<br>Topfrosee   | 0.70       | —               | —    |
| 124   | Erna Teschendorf<br>(11) . . . . .    | P      | leucht. rot, gut gefüllt<br>auch b. läng. Regen-<br>wetter gleich schön<br>u. nicht verblassend | mittel, sehr empfehlens-<br>werte rote Polyantha-<br>Rose für Beete, Schnitt<br>und Töpfe | 0.70       | —               | —    |
| 125   | Etoile de France (05)                 | TH     | leuchtend dunkelrot,<br>angenehm duftend  | mittel, langstielig,<br>Schnitt- und Treibrose  | 0.40       | —               | —    |
| 126   | Eugène Fürst (79) .                   | HR     | samtrot, außen<br>dunkler, groß   | stark, Treibrose  | 0.40       | 1.20            | 1.50 |
| 128   | Eugène Verdier (73)                   | M      | zinnoberrrot, groß  | mittel, schöne<br>Moosrose  | 0.55       | 1.30            | 1.80 |
| 132   | Euphrosine (96) . .                   | K      | leichtrosa, einfach<br>in großen Dolden   | sehr stark, reich-<br>blühend für Gruppen   | 0.50       | —               | —    |
| 135   | Excelsa (10) . . . . .                | K      | glänzend scharlach-<br>rot, gefüllt   | stark, für Pyramiden<br>geeignet  | 0.80       | —               | —    |
| 140   | Farbenkönigin (02)                    | TH     | hellrot, i. dunkelrosa<br>übergehend, groß,<br>sehr reichblühend                                | schwach, extra, Schnitt-<br>Treib- und Gruppen-<br>rose                                   | 0.45       | 1.30            | 1.80 |
| 143   | Felicité & Perpétue<br>(28) . . . . . | K      | fleischfarbig weiß,<br>mittelgroß   | sehr stark, empfehlens-<br>wert für Lauben, und<br>Pyramiden                              | 0.50       | —               | —    |
| 144   | Felleberg (57) . .                    | MB     | karmesinrosa,<br>fast gefüllt   | schwach, sehr reich-<br>blühend, für Gruppen  | 0.40       | —               | —    |
| 148   | Fisher Holmes (66)                    | HR     | dunkelrot, groß   | mittel, Schnitt- und<br>Treibrose, extra!   | 0.40       | 1.20            | 1.50 |
| 150   | Fragezeichen (10) .                   | K      | rosa, in großen<br>Dolden,<br>ähnlich Hermosa   | stark, schön belaubt  | 0.60       | —               | —    |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung            | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten                           | Wuchs — Bemerkungen  | 1 Stück M. |       |      |
|---|--|--------|--|--|------------|-------|------|
|   |  |        |  |  | N          | 1/2 H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |  |        |  |  |            |       |      |
| 152   | Franz Deegen (01) .                        | TH     | goldgelb, groß   | schwach, angenehm<br>duftend, reichblühend   | 0.80       | —     | —    |
| 156   | Frau Elise Kreis (11)                      | P      | dunkelrot, Sport<br>von Ännchen Müller                 | mittel, für Beete  | 0.60       | —     | —    |
| 158   | Frau Karl Druschki<br>(01) [Schneekönigin] | HR     | reinweiß, sehr groß,<br>Knospe länglich                | stark, reichblühend, la.<br>Treib-, Schnitt- und<br>Gruppenrose  | 0.40       | 1.20  | 1.50 |
| 160   | Frau Lilla Rauten-<br>strauch (03) . . .   | TH     | lachsrosa, groß,<br>sehr langstielig                   | mittel, reichblühende<br>Schnittrose, schöne<br>Farbe  | 0.40       | 1.30  | 1.80 |
| 162   | Frau Marg. Möller<br>(11) . . . . .        | TH     | dunkelrosa, sehr<br>groß, stark gefüllt                | mittel, duftend, für<br>Gruppen und Treib-<br>zwecke   | 1.—        | —     | —    |
| 165   | Freiherr von Mar-<br>schall (03) . . . . . | T      | dunkelkarminrot,<br>langknospig                        | stark  | 0.40       | —     | —    |
| 167   | Friedrichsruh (08) .                       | TH     | dunkelblutrot, groß                                    | schwach, hochfein<br>duftend   | 0.40       | 1.30  | 1.80 |
| 176   | General Jaqueminot<br>(53) . . . . .       | HR     | leuchtendrot, groß                                     | stark, Treib- und<br>Schnittrose   | 0.40       | 1.20  | 1.60 |
| 177   | General Mac Arthur<br>(06) . . . . .       | TH     | glänz. scharlachrot,<br>groß                           | mittel, duftend, sehr<br>reichblühend  | 0.40       | 1.20  | 1.60 |
| 178   | <b>Generalsuperior<br/>A. Jansen (12)</b>  | TH     | leuchtend dunkel-<br>karmin, groß, gefüllt             | stark, reichblühend  | 1.—        | —     | —    |
| 180   | Georg Arends (10) .                        | TH     | zart, rosa,<br>großblumig                              | sehr stark, langstielig,<br>Zentifolienduft  | 0.60       | —     | —    |
| 182   | Germaine (12) . . .                        | P      | leuchtend rosa,<br>große Dolden                        | mittel, reichblühend   | 0.80       | —     | —    |
| 185   | Gloire de Dijon (53)                       | T      | lachsgelb, groß,<br>duftend                            | sehr stark,<br>Treibrose, sehr<br>reichblühend   | 0.50       | 1.20  | 1.60 |
| 187   | Godesberg . . . . .                        | K      | leuchtendrosa, fast<br>gefüllt                         | mittel, zweimal blühend  | 0.60       | —     | —    |
| 193   | <b>Graf Zeppelin (10)</b>                  | K      | feurig leuchtend-<br>rosa, in großen<br>Dolden stehend | stark, äußerst reich-<br>blühend, winterhart   | 0.60       | —     | —    |
| 194   | Gruß an Aachen (09)                        | P      | gelblich rosa  | schwach, für Rabatten  | 0.50       | —     | —    |
| 195   | Gruß an Teplitz (98)                       | TH     | leuchtend purpur-<br>rot, duftend                      | sehr stark,<br>sehr reichblühend,<br>auffallend durch das<br>rötlich-dunkle Laub,<br>empfehlenswert für<br>Beete | 0.40       | 1.20  | 1.50 |
| 197   | Gustave Régis (91) .                       | TH     | kanariengelb, innen<br>safrangelb, groß                | stark, duftend   | 0.60       | —     | —    |
| 199   | Gustav Grünerwald<br>(03) . . . . .        | TH     | karminrosa, groß,<br>kelchförmig                       | mittel, sehr duftreich   | 0.40       | —     | —    |
| 202   | Harry Kirk (08) . .                        | TH     | schwefelgelb   | stark, sehr schön  | 0.50       | —     | 1.60 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung                            | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten   | Wuchs — Bemerkungen  | 1 Stück M. |       |      |
|---|--|--------|--|--|------------|-------|------|
|   |  |        |  |  | N          | 1/2 H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |  |        |  |  |            |       |      |
| 203   | <u>Heinrich Münch</u> (11)                                 | HR     | zartrosa, groß,<br>gefüllt, ähnlich<br>La France                         | sehr stark, Treib- und<br>Schnittrose  | 0.60       | —     | —    |
| 219   | <u>Hermosa</u> (40) . . .                                  | MB     | zartrosa, mittelgroß   | mittel, Treibrose  | 0.40       | —     | —    |
| 222   | <u>Hiawatha</u> (05) . . .                                 | K      | leuchtendrot,<br>einfach, in großen<br>Büscheln                          | sehr stark,<br>sehr reichblühend,<br>gut für Pyramiden<br>und Felspartien,<br>eine der schönsten<br>Schlingrosen | 0.50       | —     | 2.50 |
| 225   | <u>Horace Vernet</u> (67)                                  | HR     | dunkelrot,<br>sehr groß, duftend   | mittel, Treibrose  | 0.60       | —     | —    |
| 227   | <u>Hugh Dickson</u> (05)                                   | HR     | glänz., karmesin-<br>scharlach, groß, gef.<br>und schön geformt          | stark, sehr gute Treib-,<br>Schnitt- und<br>Gruppenrose  | 0.60       | 1.40  | 1.80 |
| 229   | <u>James Veitch</u> (65) .                                 | M      | dunkelrot,<br>mittelgroß   | schwach,<br>sehr dankbar blühend   | 0.60       | 1.30  | 1.80 |
| 230   | <u>Jenny Gillemot</u> (06)                                 | TH     | safrangelb   | mittel, Schnittrose  | 0.60       | 1.40  | 1.80 |
| 232   | <u>Jessie</u> (09) . . . . .                               | P      | glänzend kirschrot   | mittel, mehlaufrei,<br>für Gruppen und<br>Rabatten   | 0.60       | —     | —    |
| 235   | <u>Immerblühende<br/>Crimson Rambler</u><br>(09) . . . . . | K      | lebhaft rot, i. Dolden,<br>den ganzen<br>Sommer blühend                  | mittel, empfehlens-<br>werte Topfroze, zu<br>Pyramiden geeignet  | 0.50       | —     | 2.50 |
| 237   | <u>Johanna Sebus</u> (99)                                  | TH     | kirschrosa, s. groß  | stark, wohlriechend  | 0.40       | 1.30  | 1.80 |
| 239   | <u>Johannes Wesselhöft</u><br>(00) . . . . .               | TH     | schwefelgelb, groß   | mittel,<br>langstielig, duftend  | 0.40       | —     | —    |
| 245   | <u>Jonkheer J. L. Mook</u><br>(09) . . . . .               | TH     | intens. leuchtendrot,<br>außen silberig rosa                             | mittel, sehr langstielig,<br>schätzbare Schnittrose  | 0.70       | 1.40  | 1.80 |
| 247   | <u>Juliet</u> (11)<br>[Kapuziner R.] . .                   |        | kupfrig bis orange   | stark,<br>eigentümliche Färbung<br>unter den Rosen   | 0.60       | —     | —    |
| 250   | <u>Kaiserin Augusta<br/>Viktoria</u> (92) . . .            | TH     | rahmweiß, groß,<br>duftend   | schwach,<br>sehr reichblühend,<br>Treib- und Schnittrose   | 0.60       | 1.30  | 1.80 |
| 255   | <u>Katharine Zeimet</u> (01)                               | P      | reinweiß,<br>gut gefüllt,<br>klein, duftend                              | schwach,<br>reichblühend, sehr zu<br>empfehlen f. Friedhöfe  | 0.50       | —     | —    |
| 258   | <u>Klara Stahl</u> (13) .                                  | P      | herrlich zartrosa,<br>Form ähnl. Bellis.<br>in schönen, großen<br>Dolden | mittel, buschig,<br>Dekorations- und<br>Treibrose  | 1.50       | —     | —    |
| 260   | <u>Königin Karola</u> (04)                                 | TH     | seidigrosa   | schwach,<br>Treib- und Schnittrose   | 0.40       | —     | —    |
| 262   | <u>Kronprinzessin<br/>Cecilie</u> (08) . . .               | TH     | zart silbrigrosa,<br>an den Rändern<br>leicht gefranst                   | stark, sehr langknosp.,<br>widerstandsfähig  | 0.40       | 1.20  | 1.60 |
| 263   | <u>Lady Ashtown</u> (05) .                                 | TH     | schön rosa   | stark, Gruppen- und<br>Treibrose, extra schön  | 0.40       | 1.20  | 1.50 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten.

| Nr. | Name und<br>Jahr der Einführung          | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten  | Wuchs — Bemerkungen   | 1 Stück M. |       |      |
|-----|--|--------|---|---|------------|-------|------|
|     |  |        |   |   | N          | 1/2 H | H    |
| 265 | Lady Gay (06) . . .                      | K      | rosa, in weiß<br>übergehend   | sehr stark,<br>Park- und Rankrose   | 0.50       | —     | —    |
| 268 | Lady Pirrie (11) . .                     | TH     | rötlich lachsfarbig,<br>außen kupfrig,<br>schön gebaut  | mittel,<br>sehr reichblühend  | 1.—        | —     | —    |
| 270 | La France (68) . . .                     | TH     | schön rosa,<br>sehr groß  | mittel, Treibrose extra!<br>allgemein bekannt                                   | 0.50       | 1.30  | 1.60 |
| 274 | Laurent Carle (08) .                     | TH     | feurigrot   | mittel, sehr schön  | 0.60       | 1.40  | 1.80 |
| 276 | Leuchtfleur (09) . .                     | MB     | leucht., scharlachrot   | mittel,<br>für Beete u. Gruppen   | 0.60       | —     | —    |
| 280 | Leuchstern (01) . . .                    | K      | weiß, rosa umrandet<br>klein, einfach,<br>in Dolden stehend   | stark, reichblühend,<br>wirkt großartig als<br>Pyramide                         | 0.50       | —     | 2.50 |
| 285 | Liberty (00) . . . .                     | TH     | feurigrot, mittelgroß   | mittel, dankb. blühend,<br>Blätter frischgrün                                   | 0.50       | —     | —    |
| 286 | Leutnant Chauré<br>(10) . . . . .        | TH     | samtig karmesin-<br>rot, ziemlich gefüllt,<br>Knospe lang   | hervorrag. Gruppen-<br>und Schnittrose  | 1.—        | —     | —    |
| 287 | Little Gem (81) . . .                    | M      | karmesin, klein   | stark,<br>schöne Moosrose   | 0.60       | —     | —    |
| 289 | Lohengrin (04) . . .                     | TH     | leuchtendrosa groß<br>Knospe lang   | mittel, sehr reich-<br>blühend  | 0.50       | —     | —    |
| 290 | Louise Katherine<br>Breslau (12)         | RP     | krebsrot-bis<br>kupfrig-orange,<br>sehr groß, sehr<br>gefüllt, Knospe<br>korallenrot                      | mittel, sehr empfehlens-<br>werte Schnittrose                                   | 1.50       | —     | —    |
| 295 | Lyon Rose (08) . . .                     | RP     | auffallend. Färbung<br>krabbenrot, Zen-<br>trum korallenrot<br>mit lachsgelb nu-<br>anciert, sehr duftend | stark, Knospe groß,<br>abgerundet, sehr<br>schöne Schnittsorte                  | 0.50       | 1.30  | 1.60 |
| 300 | Madame Abel<br>Châtenay (91) . . .       | TH     | lachsfarbig, mittel-<br>groß, schöne Form   | stark, reichblühend<br>empfehlenswerte<br>Schnitt- u. Treibrose                 | 0.40       | 1.30  | 1.60 |
| 310 | Madame Caroline<br>Testout (91) . . . .  | TH     | leuchtendrosa,<br>groß  | mittel, sehr reich-<br>blühend, bekannte<br>Schnitt-, Treib- und<br>Gruppenrose | 0.40       | 1.20  | 1.50 |
| 312 | Mad. Charles<br>Lufaud (12)              | TH     | chromgelb,<br>scharlachrosa<br>überhaucht, sehr<br>groß, Knospe lang,<br>auf starken Stielen              | stark, aufrecht, Laub<br>rötlich, hervorragende<br>Schnittrose                  | 1.50       | —     | —    |
| 316 | Mad. C. P. Straß-<br>heim (98) . . . . . | T      | weißlich-gelb,<br>Knospe länglich   | schwach   | 0.60       | —     | —    |
| 325 | Mad. Edouard<br>Herriot (13)             | RP     | herrlich lachsfarbig<br>bis krebsrot, Knosp.<br>korallenrot, gelb<br>schattiert                           | mittel, für Schnitt und<br>Ausstellungszwecke<br>Neuheit<br>allerersten Ranges  | 2.—        | —     | —    |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung             | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten  | Wuchs — Bemerkungen   | 1 Stück M. |       |      |
|---|---|--------|---|---|------------|-------|------|
|   |   |        |   |   | N          | 1/2 H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |   |        |   |   |            |       |      |
| 339   | Madame Hoste (88)                           | T      | gelblich-weiß, groß   | mittel, schöne Knospe   | 0.70       | —     | —    |
| 345   | „ Jean Dupuy (02)                           | T      | rötlich goldgelb,<br>Knospe lang, auf<br>festen Stielen   | mittel, blüht lange und<br>reich, Schnittrose   | 0.60       | —     | —    |
| 348   | <b>Mad. Jules<br/>Gouchault</b> (13) . .    | P      | karminrot, innen<br>rosa überhaucht,<br>Knospe samtig   | mittel, für Beete und<br>Gruppen  | 0.80       | —     | —    |
| 350   | Mad. Jules Grolez (97)                      | TH     | eigenart. chinesisch-<br>rosa, groß, lang-<br>knospig   | mittel, sehr reich-<br>blühend, la. Schnitt-<br>Treib- u. Gruppenrose                             | 0.40       | 1.20  | 1.50 |
| 354   | „ Leon Pain (05) .                          | TH     | lachsfarbig   | mittel, Schnittrose   | 0.50       | 1.20  | 1.50 |
| 356   | „ Marie Finger (73)                         | HR     | leuchtendrosa, groß   | stark, Treib- und<br>Schnittrose  | 0.40       | —     | —    |
| 357   | „ Maurice de Luze<br>(08) . . . . .         | TH     | schön rosa  | mittel, Schnittrose   | 0.50       | 1.20  | 1.60 |
| 360   | „ Moreau (73) . .                           | M      | zinnoberröt   | mittel  | 0.50       | —     | —    |
| 365   | „ Norbert Leva-<br>vasseur (03) . .         | P      | leuchtendrot, ähnl.<br>Crimson Rambler,<br>in Büscheln stehend.<br>den ganzen Sommer<br>blühend | mittel, wächst<br>gedrungen, vorzüglich<br>zur Topfkultur und<br>Einfassungen                     | 0.50       | —     | —    |
| 367   | „ Pierre Cochet (92)                        | N      | goldgelb, in weiß<br>übergeh., mittelgroß   | stark   | 0.60       | —     | —    |
| 370   | „ Ravary (00) . . .                         | TH     | orange gelb, groß,<br>duftend   | schwach, sehr reich-<br>blühend, Gruppen- und<br>Schnittrose, extra!                              | 0.50       | 1.30  | 1.60 |
| 371   | „ Segond Weber<br>(08) . . . . .            | TH     | lachsrosa, sehr<br>groß, schalenförm.,<br>den ganzen Som-<br>mer blühend                        | mittel, neue Färbung<br>unt. den TH, langstielig  | 0.60       | 1.40  | 1.80 |
| 372   | „ Taft (10) . . . .                         | P      | hell Rubinrosa  | schwach, z. Einfassung  | 0.60       | —     | —    |
| 381   | Magna Charta (77)                           | HR     | prächtigerosa, groß   | sehr stark, Treibrose   | 0.40       | —     | —    |
| 390   | Maréchal Niel (64) .                        | T      | tiefgelb, becher-<br>förmig, sehr groß,<br>duftend  | stark, extra! Treibrose<br>im Freien empfindlich;<br>unstreitig eine der<br>schönst. gelben Rosen | 0.70       | 1.50  | 2.—  |
| 395   | Marie Baumann (64)                          | HR     | lebhaft rot, groß   | stark, Treibrose  | 0.40       | 1.20  | 1.50 |
| 400   | <b>Marquise de Sinety</b><br>(07) . . . . . | TH     | rötlich goldgelb,<br>sehr groß, gefüllt   | mittel, prachtvolle<br>Schnittrose  | 0.80       | —     | —    |
| 405   | Maupertius (69) . .                         | M      | dunkelsamtrot,<br>mittelgroß  | stark   | 0.60       | —     | —    |
| 410   | Mignonnette (32) . .                        | P      | zartrosa, in weiß<br>übergehend   | mittel, zur Einfassung  | 0.50       | —     | —    |
| 413   | Mrs. Aaron Ward (08)                        | TH     | indischgelb   | mittel, für Schnitt<br>und Rabatten   | 0.50       | 1.30  | 1.60 |
| 419   | „ John Laing (88)                           | HR     | seidenartig rosa,<br>groß   | stark, extra! Schnitt-<br>und Treibrose   | 0.40       | 1.20  | 1.50 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung         | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten                                 | Wuchs — Bemerkungen   | 1 Stück M. |       |      |
|---|---|--------|--|---|------------|-------|------|
|   |   |        |  |   | N          | 1/2 H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |   |        |  |   |            |       |      |
| 420   | Mrs. Joseph Hill (04)                   | TH     | orange-gelb  | stark, Schnittrose  | 0.60       | —     | —    |
| 425   | „ W. Cutbush (07)                       | P      | zartrosa, in großen<br>Dolden                                | mittel, empfehlens-<br>wert, für Gruppen und<br>Einfassungen;<br>sehr reichblühend    | 0.50       | —     | —    |
| 435   | <u>Natalia Böttner</u> (10)             | TH     | hellgelb   | stark, schöne Färbung   | 0.80       | 1.40  | 1.80 |
| 440   | Newport Fairy (08)                      | K      | einfach, hellrosa  | stark, schöne<br>Rankrose   | 0.70       | —     | —    |
| 443   | <u>Nordlicht</u> (10)                   | TH     | glänzend chines.-<br>rosa auf kupfrig-<br>gelbem Grunde      | mittel, Gruppenrose   | 0.80       | —     | —    |
| 445   | Oberbürgermeister<br>Dr. Troendlin (04) | TH     | heißfleischfarbig-<br>rosa, duftend                          | stark, gute Schnittrose   | 0.50       | 1.30  | 1.60 |
| 450   | <u>Orléans Rose</u> (09)                | P      | schön hellrot, Zen-<br>trum gelblich-weiß                    | schwach, außer-<br>gewöhnl. reichblühend,<br>sehr gut für Gruppen<br>und Einfassungen | 0.60       | —     | —    |
| 452   | Oscar Cordel (98)                       | HR     | leuchtend<br>karminrot                                       | mittel, stark duftend,<br>reichblühend  | 0.40       | —     | —    |
| 455   | Otto von Bismarck<br>(08)               | TH     | seidenfarbig rosa,<br>ähnlich La France,<br>sehr groß        | mittel, langknospig,<br>blüht ununterbrochen<br>bis zum Herbst                        | 0.50       | 1.30  | 1.60 |
| 467   | Paul Neyron (70)                        | HR     | dunkelrosa, groß,<br>schön geformt                           | sehr stark  | 0.40       | 1.20  | 1.60 |
| 480   | Perle von Godesberg<br>(02)             | TH     | gelblich weiß,<br>kugelig                                    | mittel, Schnittrose   | 0.70       | —     | —    |
| 490   | Pharisäer (01)                          | TH     | weißlich rosa,<br>innen lachsrosa                            | stark, sehr reich-<br>blühend, Schnitt-<br>Treib- und Gruppen-<br>rose, extra!        | 0.40       | 1.20  | 1.50 |
| 500   | Prince Camille de<br>Rohan (62)         | HR     | dunkelrot, groß  | stark, Treibrose, extra   | 0.40       | 1.20  | 1.50 |
| 505   | Prince de Bulgarie<br>(02)              | TH     | lachs-gelb   | mittel, Treibrose   | 0.60       | —     | —    |
| 510   | Princesse de Béarn<br>(85)              | HR     | schwärzlichrot, groß   | mittel, Treibrose   | 0.40       | —     | —    |
| 520   | <u>Rayon d'or</u> (10)                  | RP     | kupfrig gelb, groß,<br>gefüllt, Knospe<br>rötlich gestreift  | mittel, schöne, nicht<br>empfindliche Gruppen-<br>rose                                | 1.50       | —     | —    |
| 523   | Ranunculiflora (27)                     | K      | weiß gefüllt   | sehr stark, reich-<br>blühend   | 0.50       | —     | —    |
| 528   | Rêve d'or (80)                          | N      | ledergelb, schön<br>geformt                                  | stark, Treib- und<br>Schnittrose  | 0.40       | 1.20  | 1.60 |
| 540   | Rhea Rheid (08)                         | TH     | kirschrot bis<br>leuchtendrot                                | stark, sehr reich-<br>blühend, ausgezeichnete<br>Schnitt- u. Treibrose                | 0.60       | —     | —    |
| 542   | Richmond (06)                           | TH     | leuchtend scharlach-<br>rot, leicht gefüllt,<br>schön gebaut | mittel, la. Treibrose,<br>gut für Gruppen   | 0.50       | 1.20  | 1.60 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.



| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung                    | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten   | Wuchs — Bemerkungen   | 1 Stück M. |       |      |
|---|--|--------|--|---|------------|-------|------|
|   |  |        |  |   | N          | 1/2 H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |  |        |  |   |            |       |      |
| 544   | <b>Rodhätte</b> (11) . .<br>[Rotkäppchen] . .      | P      | leuchtend dunkelrot<br>nicht verblauend,<br>leicht gefüllt   | mittel, äußerst reich-<br>blühende Gruppen- u.<br>Topftreibrose   | 0.80       | —     | —    |
| 545   | <b>Rubin</b> (01) . . . . .                        | K      | leuchtendrot, groß,<br>in Dolden   | mittel, Park- und<br>Rankrose   | 0.50       | —     | —    |
| 546   | <b>Ruhm der Garten-<br/>welt</b> (05) . . . . .    | HR     | feuerrot   | stark, Treib- und<br>Schnittrose  | 0.50       | —     | —    |
| 548   | <b>Sachsengruß</b> (12)                            | HR     | zart fleischfarbig,<br>rosa  | hervorragende Schnitt-<br>und Treibrose   | 0.80       | —     | —    |
| 549   | <b>Schneewittchen</b> (01)                         | P      | rahmweiß, in rein-<br>weiß übergehend,<br>klein, duftend   | mittel, zur Einfassung  | 0.50       | —     | —    |
| 550   | <b>Sodenia</b> (11) . . .                          | K      | rein leuchtend<br>karmin bis schar-<br>lachrot, schöner wie<br>Crimson Rambler                             | stark, dunkelgrünes<br>Laub, leidet wenig von<br>Mehltau, doldenblütig,<br>sehr schöne, rote<br>Schlingrose | 0.70       | —     | 2.50 |
| 556   | <b>Souvenir de la Mal-<br/>maison</b> (43) . . . . | B      | zartfleischfarbig<br>weiß, sehr groß   | mittel, bekannt. Schnitt-<br>und Treibrose  | 0.60       | —     | —    |
| 558   | <b>de Président<br/>Carnot</b> (95) . . . .        | TH     | fleischfarbig, sehr<br>groß, Knospe lang   | mittel, sehr gute<br>Schnitt- u. Treibrose  | 0.60       | 1.20  | 1.60 |
| 575   | <b>Sunburst</b> (12) . .                           | TH     | fleischfarbig gelb<br>mit orangegelber<br>Mitte, Knospe lang,<br>auf langen kräftigen<br>Stielen           | ausgezeichn. Schnitt-<br>und Treibrose  | 1.—        | —     | —    |
| 580   | <b>Tausendschön</b> (06) .                         | K      | schön silberrosa,<br>duftend, in auffall.<br>groß. Dold. stehend   | stark, sehrempfehlens-<br>wert als Pyramide und<br>Parkrose   | 0.50       | —     | —    |
| 590   | <b>Thalia</b> (96) . . . . .                       | K      | reinweiß, in großen<br>Dolden stehend  | sehr stark  | 0.50       | —     | —    |
| 595   | <b>Toresbyana</b> (40) . .                         | K      | weiß, leicht rosa,<br>in Büscheln  | mittel  | 0.50       | —     | —    |
| 598   | <b>Trier</b> (04) . . . . .                        | K      | rahmweiß, Knospe<br>lachsrosa, ziemlich<br>gefüllt   | mittel, schöne Belau-<br>bung, den ganzen<br>Sommer blühend   | 0.50       | —     | —    |
| 599   | <b>Triomphe<br/>orléanais</b> (12) . .             | P      | lebhaft kirschrot,<br>ziemlich groß  | mittel, Blüten von<br>langer Dauer  | 0.80       | —     | —    |
| 600   | <b>Triumph</b> (07) . . . .                        | TH     | dunkelkarmin, groß   | mittel, reichblühend  | 0.60       | —     | —    |
| 610   | <b>Ulrich Brunner</b> (82)                         | HR     | kirschrot, duftend,<br>sehr langstielig  | stark, Treib- und<br>Schnittrose, extra   | 0.40       | 1.20  | 1.60 |
| 613   | <b>Van Houtte</b> (70) . .                         | HR     | feuerrot bis schwarz   | mittel, Treibrose, extra  | 0.50       | —     | —    |
| 620   | <b>Veilchenblau</b> (08) .                         | K      | im Aufblühen<br>veilchenblau, später<br>mehr lilafarben,<br>mittelgroß, halbge-<br>füllt, i. Dold. stehend | stark, ganz neue<br>Färbung unter den<br>Rosen  | 0.50       | —     | —    |
| 630   | <b>Veluwezoom</b> (09) .                           | TH     | rosigkarmin  | stark, Schnittrose  | 0.70       | —     | —    |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

| Nr.   | Name und<br>Jahr der Einführung                    | Klasse | Farbe und Form<br>der Blüten                                   | Wuchs — Bemerkungen   | 1 Stück M. |       |      |
|---|--|--------|--|---|------------|-------|------|
|   |  |        |  |   | N          | 1/2 H | H    |
| Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten. |  |        |  |   |            |       |      |
| 632   | <u>Viscountess Enfield</u><br>(10) . . . . .       | RP     | kupfriggelb,<br>außen karmin mit<br>gelb, groß, gefüllt        | mittel, aufrecht,<br>blüht dauernd  | 1.—        | —     | —    |
| 635   | <u>Viscountess Folke-<br/>stone</u> (87) . . . . . | T      | lachsrosa, sehr groß   | mittel, reichblühend  | 0.40       | 1.30  | 1.80 |
| 637   | <u>White Dorothy</u> (09)                          | K      | reinweiß, sehr<br>reichblühend                                 | stark, schön als Einzel-<br>pflanze, beste weiße<br>Schlingrose                           | 0.50       | —     | 2.50 |
| 640   | <u>Wichuraiana</u> . . . . .                       | K      | weiß, einfach, sehr<br>reichblühend                            | sehr stark, frischgrünes<br>Laub, wächst<br>kriechend, vorzüglich<br>an Grotten u. Felsen | 0.60       | —     | —    |
| 641   | „ <u>rubra</u> (00) . . . . .                      | K      | karminrot, innen<br>weißlich, einfach,<br>in Dolden stehend    | stark   | 0.70       | —     | —    |
| 642   | <u>William Allen<br/>Richardson</u> (79) . . . . . | N      | orange gelb, klein   | mittel, schöne Knospe   | 0.60       | —     | —    |
| 650   | <u>Williams Evergreen</u><br>(55) . . . . .        | K      | weiß   | stark, sehr reich-<br>blühend   | 0.50       | —     | 2.50 |
| 660   | <u>Willowmere</u> (13) . . . . .                   | RP     | karminrosa mit<br>gelber Mitte, groß,<br>gefüllt, Knospelängl. | mittel, aufrecht  | 1.50       | —     | —    |
| 665   | <u>Yvonne Rabier</u> (10)                          | P      | weiß, duftend  | widerstandsfähig, sehr<br>zu empfehlen  | 0.80       | —     | —    |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

## Sortimente:

### 10 der schönsten Rosen aller Farben { Hochstämme M. 14.— Sträucher M. 4.—

#### weiß:

Frau Karl Druschki  
Kaiserin Augusta Viktoria

#### gelb:

Madame Ravary  
Lyon Rose

#### rosa:

Madame Carol. Testout  
Mrs. John Laing  
Pharisäer

#### rot:

Fisher Holmes  
Ulrich Brunner  
Prince Camille de Rohan

### 25 der schönsten Rosen aller Farben { Hochstämme M. 34.— Sträucher M. 10.—

#### weiß:

Augustine Guinoisseau  
Elise Boëlle  
Frau Karl Druschki  
Kaiserin Augusta Viktoria  
Souv. de Prés. Carnot  
Viscountess Folkestone

#### gelb:

Gloire de Dijon  
Lyon Rose  
Mad. Ravary  
Rêve d'or  
Edu Meyer

#### rosa:

Belle Siebrecht  
Farbenkönigin  
Mad. Abel Châtenay  
Mad. Carol. Testout  
Mad. Jules Grolez  
Mrs. John Laing  
Pharisäer  
Kronprinzessin Cecilie

#### rot:

Eugène Fürst  
Fisher Holmes  
General Jaqueminot  
Gruß an Teplitz  
Prince C. de Rohan  
Ulrich Brunner

### 10 schöne Schlingrosen, Sträucher M. 4.50

#### weiß:

Trier  
White Dorothy

#### gelb:

Aglaia

#### rosa:

Dorothy Perkins  
Leuchstern  
Tausendschön  
Graf Zeppelin

#### rot:

Crimson Rambler  
„ Immerblüh.  
Hiawatha



# Diverse Rosenarten.

## Park- und botanische Sorten:

| Nr. | Name | Autor | Farbe, Form und Zeit der Blüte | Bemerkungen | 1 Stück M. |
|-----|------|-------|--------------------------------|-------------|------------|
|-----|------|-------|--------------------------------|-------------|------------|

Bei der Pflanzung bitten wir Notiz Seite 141 zu beachten.

| Rosa |  |                   |   |   |      |
|------|--|-------------------|---|---|------|
| 700  | " alpina . . . . .                         | L.                | rosa, Mai-Juni                                      |   | 0.60 |
| 703  | " arkansana . . . . .                      | Porter            | hellrosa, Mai-Juni                                  | Zweige sehr stachelig                               | 0.60 |
| 705  | " arvensis . . . . .                       | Huds.             | weißlichrosa, Juni-Juli                             | starkwachsend, kriechend                            | 0.60 |
| 708  | " californica fl. pl. . .                  | Ch. & Schl.       | leuchtendrosa, gefüllt, Juni                        | starkwachsend, sehr reichblühend                    | 0.60 |
| 710  | " canina . . . . .                         | L.                | leichtrosa, einfach, Mai-Juni                       | bekannte Heckenrose, Früchte leuchtendrot           | 0.30 |
| 712  | " carolina . . . . .                       | L.                | schön dunkelrot Juli-Aug.                           | starkwachsend                                       | 0.60 |
| 715  | " centifolia major . .                     | hort.             | rosa, gefüllt                                       | angenehm duftend                                    | 0.60 |
| 718  | " Conrad Ferd. Meyer                       | Dr. Müller Weing. | schön rosa, gefüllt, sehr groß                      | sehr starkwachsend, duftend                         | 0.60 |
| 719  | " ferox . . . . .                          | Bieb.             | weiß, einfach, Juni-August                          |   | 0.60 |
| 723  | " gallica . . . . .                        | L.                | einfach, rosa                                       |   | 0.60 |
| 724  | " gymnocarpa . . . .                       | Nutt.             | rosa, Mai   |   | 0.60 |
| 725  | " indica . . . . .                         | L.                | weiß, Juli, kleinfrüchtig                           | stark rankend                                       | 0.60 |
| 726  | " kamtschatka . . . .                      | Vent.             | purpur, Mai-Juni                                    | starkwachsend                                       | 0.60 |
| 728  | " Kochiana . . . . .                       | Koehne            | rosa, Mai-Juni                                      |   | 0.60 |
| 730  | " lucida . . . . .                         | Ehrh.             | leichtrosa  | reichblüh., schöne Belaub.                          | 0.60 |
| 731  | " lutea fl. pl. (Persian Yellow) . . . . . | hort.             | goldgelb, gefüllt                                   |   | 0.60 |
| 732  | " " jaune bicolor . .                      |                   | innen kapuzinerrot, außen gelb, einfach, großblumig |   | 0.60 |
| 736  | " multiflora . . . . .                     | Thbg.             | weißrosa, Mai-Juni                                  | sehr starkwachsend, überhängend, auß. reichblühend  | 0.60 |
| 740  | " pimpinellifolia . . .                    | L.                | weißrosa, Juni-Juli                                 | Zweige sehr stachelig                               | 0.60 |
| 743  | " rubiginosa . . . . .                     | L.                | einfach, rosa, Mai                                  | gemeine Weinrose, schott, Zaunrose                  | 0.30 |
| 750  | " " Lord. Penz. Hybriden . . . . .         |                   | rosa, rote und weiße Sorten einfach, Mai-Juni       | Blätter und Blüten angenehm duftend                 | 0.60 |
| 754  | " rubrifolia . . . . .                     | Vill.             | rosa, einfach, Mai                                  | Blätter dunkelrot, Früchte schwarzrot               | 0.50 |
| 758  | " rugosa (R. Regeliana)                    | Thbg.             | rot, sehr groß, Mai                                 | Hagebutte, Zweige stachel.                          | 0.40 |
| 759  | " " fl. albo . . . . .                     | hort.             | weiß, groß  | do.   | 0.50 |
| 760  | " setigera . . . . .                       | Mchx.             | rosarot, Juni-Juli                                  | stark rankend                                       | 0.60 |
| 761  | " stylosa . . . . .                        | Desv.             | rosa, Juni-Juli                                     |   | 0.60 |
| 762  | " sulphurea Soleild'or                     | P. D.             | herrlich goldgelb, rosa berandet                    | starkwachsend, duftend                              | 0.70 |
| 763  | " villosa (R. pomifera)                    | L.                | rosa, einfach, Mai-Juni                             | Hagebutte, Frucht dunkelrot, äußerst dankb. tragend | 0.50 |

Der Preis ermäßigt sich um 10% bei Abnahme von 10, um 20% bei Abnahme von 100, um 30% bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte.

## Einfassungs- und Heckenpflanzen.

(Ein Gebund reicht für 3—5 m je nach der Art der Verwendung.)

## Forstpflanzen.

|   |      |      |       |
|---|------|------|-------|
| <b>Picea excelsa</b> , Rottannen (Preis brieflich)                    |      |      |       |
| <b>Robinia Pseudacacia</b> , Akazien, 1 jährig . . . . 65—100 cm hoch | 3.80 | 35.— | 300.— |



## Edelreiser.

|   |            |   |                       |                        |   |  |
|---|------------|---|-----------------------|------------------------|---|--|
| Kernobst<br>Kirschen<br>Pflaumen<br>Gehölze | } pro Reis | { | 1 Reis . M. 0.20      | } Pfirsiche { pro Reis | { | 1 Reis . . . M. 0.30                     |
|   |            |   | 8—10 10 Reiser " 1.50 |                        |   | 8-10 Aug. 10 Reiser . . . " 2.50         |
|   |            |   | Augen 100 " " 10.—    |                        |   | 100 " . . . " 20.—                       |
|   |            |   |                       |                        |   | Rosen, pro Reis 4-6 " 100 " . . . " 20.— |

Neuheiten werden entsprechend höher berechnet.

## Grassamen.

Preisänderungen vorbehalten.

|                         |                    |                                |                 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| Nr. 1 Parkrasenmischung | °/o kg . . M. 78.— | Nr. 5 Schafftenrasenmischung   | °/o kg M. 108.— |
| " 2 Tiergarten          | " " " " 84.—       | " 6 Futtergras f. trock. Wies. | " " " 85.—      |
| " 3 Flora               | " " " " 100.—      | " 7 " " feuchte                | " " " 90.—      |
| " 4 " allerfeinste      | " " " " 108.—      |                                |                 |

Preis brutto für netto.

Bei Bestellungen unter 25 kg erhöht sich der Preis um 10 Pf. per kg.



*M. J. L. L. L.*


*M. J. L. L. L.*

*J. L. L.*



# GÄRTNERISCHE BEDARFSARTIKEL

IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE.



Nr. 542

## Baumschützer

Nr. 542 aus sechseckigem Maschendraht, bester Schutz gegen Hasen usw.

|                            |        |      |      |
|----------------------------|--------|------|------|
| Höhe . . . . .             | cm 100 | 120  | 150  |
| Lichte Weite . . . . .     | 13     | 13   | 13   |
| Preis per Stück . . . . M. | 0.25   | 0.30 | 0.35 |

Nr. 553 verzinktes Wellengitter mit Rundbogen

|                            |        |     |      |
|----------------------------|--------|-----|------|
| Höhe . . . . .             | cm 125 | 150 | 180  |
| Lichte Weite . . . . .     | 22     | 22  | 22   |
| Preis per Stück . . . . M. | 2.50   | 3.— | 3.75 |



Nr. 553

## Baumwachs

kaltflüssiges, zum Veredeln, sowie Überstreichen von Schnittwunden und kranken Stellen. Dieses hält sich mehrere Jahre, ist sehr zart, deshalb leicht aufzutragen.

|         |      |      |      |        |
|---------|------|------|------|--------|
| Dosen a | 50   | 125  | 250  | 500 gr |
| M.      | 0.20 | 0.35 | 0.65 | 1.10   |

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| Büchsen a | 1   | 5 kg |
| M.        | 2.— | 9.—  |

## Bindematerial

|                   |               |               |               |      |     |      |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|------|
| Bast (Raphia), kg | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | 1    | 5   | 50   |
| M.                | 0.30          | 0.45          | 0.75          | 1.30 | 6.— | 55.— |

Baumbänder, aus dreifachem Kokosgeflecht, { 50 60 70 cm lang,  
mit Drahtverschluß . . . . . { M. 3.— 3.50 4.— per 100 Stück

Kokosstricke,  $7\frac{1}{2}$  mm stark, zum Anbinden von Obst- und Allee-bäumen, 1 Originalgebund (ca. 150 lfdm.) = ca. 2 kg bei Entnahme von 1 5 25 Gebund  
M. 1.40 6.50 35.—

Bei weniger als 1 Originalgebund 25% Aufschlag.



## Blumenkästen

für Fensterbänke, Balkons usw. (17 cm breit, 16 cm hoch)

|  |    |    |    |    |    |     |             |
|--|----|----|----|----|----|-----|-------------|
|  | 40 | 50 | 65 | 90 | 95 | 100 | 125 cm lang |
|--|----|----|----|----|----|-----|-------------|

|                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Holz grün gestrichen . . per Stück M. | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.30 |
| „ weiß . . . . .                      | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.80 |

Preisänderungen vorbehalten.



## Draht usw.

**Maschendraht**, verzinkt, sechs- und viereckiges Geflecht, zu Einfriedigungen  
Da die Preise häufig wechseln, bitten wir, Offerte einzufordern, unter gefl.  
Angabe des Bedarfs, der gewünschten Stärke und Höhe.

**Zinkdraht**, glatt, in Ringen und meterweise, von allen Stärken

2,2 mm stark, (5 kg Ring) = ca. 170 lfdm.) . . . . . a Ring M. 2.20

2,5 " " (5 " " = " 125 " ) . . . . . a " " 2.—

3,5 " " (5 " " = " 65 " ) . . . . . a " " 1.60

Bei weniger als einem Ring 25% Aufschlag.

**Ösen**, verzinkt, zum Anheften des Drahtes an Spalierwände, 11 m lang,

per 100 Stück M. 4.—

**Spalierdrahthalter**, ges. gesch. Muster, beste und dauerhafteste Befestigungsart,  
4 Halter genügen für eine gerade Wandfläche von 15—20 m Länge und 3 m Höhe.

Preis a Stück M. 0.75 10 Stück M. 6.50.



Erdbeerstütze

## Erdbeerstützen,

D. R.-G.-M., verstellbar: Aus zwei neben-  
einander liegenden, verzinkten Eisen-  
ringen, welche sich durch Ein- und Aus-  
ziehen jeder Größe des Erdbeerstockes  
anpassen lassen.

Preis per Dutzend . . . . . M. 1.35

## Erdbohrer

zum Untersuchen des Bodens zum Setzen  
von Pfählen und besonders zur Anfertigung  
von Düngelöchern

|                          | Nr. 471   | 472  | 473  | 474   |
|--------------------------|-----------|------|------|-------|
| Durchmesser in mm . . .  | 80        | 130  | 180  | 230   |
| Stangenlänge in mm . . . | 1000—1500 |      |      |       |
| Preis per Stück . . .    | M. 3.80   | 5.80 | 8.90 | 12.30 |



Erdbohrer

## Etiketten

**Holzetiketten**, zum Anhängen, [mit Ölfarbe gestrichen

10 cm lang . . . . . 100 Stück M. 0.45

10 cm lang, an Kupferdraht . 100 Stück M. 1.—

zum Beistecken, mit Ölfarbe gestrichen

Länge in cm 14 20 35

Preis per 100 Stück . . . M. 0.50 0.90 2.20

Weniger wie 50 Stück-Originalgebund wird nicht abgegeben.

## Porzellanetiketten, diverse Größen

|                 | Nr. 8   | 2    | 5    | 16   | 18   |
|-----------------|---------|------|------|------|------|
| per Stück . . . | M. 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |

Bei Aufträgen von 50 Stück und mehr ermäßigt sich  
der Preis um 10%.


O  
**Gute Louise**  
**von Avranches**  
Sept.-Okt.



Garten- und Rasenwalze



Nr. 361. Gießkanne



Nr. 226. Gießkanne



Nr. 256. Jätégabel



Nr. 240. Doppelte Kartoffelhacke



Nr. 5F. Baummesser



Nr. 23A. Kopuliermesser



Nr. 254. Spatenhacke



Nr. 41F. Okuliermesser



Nr. 2277. Spargelmesser



**Garten- und Rasenwalze**, zweiteilig, in besonders schöner, äußerer Ausstattung.

Besondere Vorzüge dieser Walzen:

1. Die zweiteiligen Walzen ermöglichen es, bis dicht an die Pflanzen zu walzen, ohne dieselben zu beschädigen;
2. die Kanten der Walzen sind abgerundet und hinterlassen deshalb keine abgrenzenden Spuren;
3. der Griff der Walze ist ausbalanciert und steht immer aufrecht.

| Walze . . . . . Nr.          | 1    | 2    | 3    | 4    |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Durchmesser in cm . . . . .  | 30   | 40   | 50   | 60   |
| Breite in cm . . . . .       | 36   | 38   | 50   | 53   |
| Gewicht in kg. . . . . ca.   | 65   | 85   | 150  | 200  |
| Preis per Stück . . . . . M. | 40.— | 45.— | 70.— | 90.— |

**Gießkannen**, 1a. Qualität, in starker tadelloser Ausführung, mit Brause.

| In einem Stück verzinkt . Nr. | 361  | 362  | 226  | 227  | 228  |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Inhalt . . . . . Liter        | 6    | 8    | 12   | 14   | 16   |
| Preis per Stück . . . . . M.  | 4.90 | 5.40 | 6.20 | 6.40 | 6.70 |

**Zubehörteile** passend zu

|                                    | 361/62 | 226/28 |
|------------------------------------|--------|--------|
| 629 gerade Brause . . . . . a M.   | 1.—    | 1.10   |
| 630 schräge " . . . . . " "        | 0.80   | 0.95   |
| 631 Jauche-Verteiler . . . . . " " | 0.80   | 0.95   |
| 632 Aufsteckrohre . . . . . " "    | 0.35   | 0.50   |
| 633 " gebogene . . . . . " "       | 0.50   | 0.60   |

**Hacken**

|   |      |               |
|---|------|---------------|
| Nr. 200 aus bestem Stahl . . . . . mit eingesehtem Stiel a M. | 3.—  |               |
| Nr. 240 doppelte Kartoffelhacke . . . . .                     | dto. | " " 1.40      |
| Nr. 253 stählerne Spatenhacke mit 3 Zinken ohne Stiel a M.    | 1.—  | dto. " " 1.80 |
| Nr. 254 " " " 4 " " " a " "                                   | 1.20 | dto. " " 2.—  |

Auf Wunsch liefern wir diese mit runden Zinken.

**Jätégabel**

|   |      |
|---|------|
| Nr. 256 blau lackiert mit poliertem Heft . . . . . a M. | 0.40 |
|---|------|

| Messer, Baummesser oder Hippen Nr. | 3 Z. | 5 F. | 5 F. | 5 F. |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| Heftlänge in cm . . . . .          | 9½   | 10   | 11   | 12   |
| Preis per Stück . . . . . M.       | 2.20 | 2.30 | 2.65 | 2.95 |

|  |                                |      |
|--|--------------------------------|------|
| Kopuliermesser, mit Messingeinlagen Nr 23 A. { | Heftlänge 9½ cm . . . . . a M. | 1.50 |
|  | " 10 " . . . . . " M.          | 1.60 |

**Okuliermesser**, Heft mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen,


Löser aus Messing, Zelluloid oder Horn, Nr. 41 F. Heftlänge 8 cm . . . a M. 1.70

" mit breitem Heft, unten sanft abgebogen, Klinge sehr ballig, Löser aus Horn

oder Zelluloid, Nr. 42 M., Heftlänge 8½ cm . . . . . a M. 1.85

**Spargelmesser**, Nr. 2277 . . . . . " " 1.40

Preisänderungen vorbehalten.



Obtschrank



Obstgestelle

**Obstgestelle**, 108 cm breit, 50 cm tief, mit Deckel und ausziehbaren Horden

| Gestelle mit    | 6     | 8     | 10    | Horden  |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|
|                 | 90    | 105   | 125   | cm hoch |
| M.              | 14.—  | 16.50 | 19.50 |         |
| verschießbare „ | 15.50 | 19.—  | 22.50 |         |

**Obstkisten**, rheinische Originalkisten

|  |                         | bei Entnahme von . . . . . 1—5 | 6—10 | 11—50 | 51—200 Stück |
|--|-------------------------|--------------------------------|------|-------|--------------|
| zahlbar innerhalb 30 Tagen<br>ohne jeden Abzug | für 25 kg. Packung a M. | 1.—                            | 0.98 | 0.95  | 0.92         |
|  | „ 12½ „ „ a „           | 0.80                           | 0.78 | 0.75  | 0.72         |

**Obstpflücker**, Nr. 422, drei mit Stoff überzogene Greifer . . . . . a M. 1.80

„ 165, einfache Ausführung . . . . . „ „ 0.65

**Obtschrank** mit verschließbarer Tür, ringsum Drahtgaze, ca. 150 cm hoch, mit 8 ausziehbaren Horden, 110 cm breit, 50 cm tief . . . . . a M. 35.—


Vollständiger Schutz gegen Fliegen, Mäuse usw., ungehinderte Luftzirkulation; der Schrank kann beliebig als Speiseschrank benutzt werden.

**Obstverpackung:** Pomologenwolle B

|  |                                   | in Ballen von 50 kg, bei Abnahme von | 1 | 5—9 Ballen |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------|
| zahlbar innerhalb 30 Tagen<br>ohne jeden Abzug | Preis per Ballen . . . . .        | M. 9.—                               |   | 8.50       |
|  | unter 50 kg Preis M. 0.25 per kg. |                                      |   |            |

Preisänderungen vorbehalten.





### Pferdehacke „Planet Junior“

Beliebig zu verwenden als einfacher Kultivator, Furchenzieher bzw. Anhäufeler; bereits angehäufter Boden läßt sich wieder nach der Mitte der Reihen ziehen.

Sehr zu empfehlen. Das Gestell ist ganz aus Stahl gepreßt und vereinigt größte Widerstandsfähigkeit mit großer Leichtigkeit. Die Schare, aus bestem gehärtetem Stahl hergestellt, schärfen sich im Gebrauche von selbst. Durch einen Druck auf den vordern Hebel wird das Laufrad gehoben oder gesenkt, wodurch der Tiefgang des Gerätes reguliert wird. Durch einen Druck auf den hintern Hebel wird das Gerät enger oder weiter gestellt.

Preis M. 60.— per Stück.

Der Versand erfolgt ab Lager Hamburg.

### Pfähle, Stäbe, Tonkinstöcke.

**Baumpfähle** (Rottannenholz) sauber gepuht und gespißt

|                             |
|-----------------------------|
| 3 m lang, 100 Stück M. 40.— |
| 2,50 „ „ 100 „ „ 35.—       |

**Blumenstäbe**, aus astfreiem Holz gerissen, glatt und sauber gearbeitet

| Länge in cm . . . . .         | 20        | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 85   | 100  |
|-------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| weiß . . . . .                | 0 M. 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | 0.80 | 1.—  | 1.20 | 1.80 |
| mit grüner Ölfarbe gestrichen | 0 M. 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.80 |

Bei Aufträgen unter 100 Stück 20% Preisauflschlag.

**Gartenpfähle** (Rottannenholz) sauber geschält und gespißt, passend zum Anbinden von Rosen-, Stachel und Johannisbeer-Hochstämmen usw.

| Stärke der Größe entsprechend, Länge in cm | 125  | 150  | 175  | 200  |
|--|------|------|------|------|
| % M.                                       | 12.— | 14.— | 17.— | 20.— |

**Heckenpfähle** (Rottannenholz), je nach Stärke und Länge % M. 35.— bis 50.—

**Tonkinstäbe** (Bambusrohr) wegen ihres saubern Aussehens und großer Haltbarkeit sehr beliebt. Die kleinern eignen sich als Blumenstöcke und Formierstöcke, die dickern verwendet man zum Anbinden von Rosen-, Stachel- und Johannisbeer-Hochstämmen

| Länge in cm . . . . .            | 115       | 150   | 150   | 175   | 200   | 200   |
|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durchmesser in mm am dicken Ende | 9—11      | 13—15 | 16—18 | 17—20 | 14—16 | 17—20 |
| Preis . . . . .                  | % M. 3.50 | 8.—   | 12.—  | 20.—  | 14.—  | 22.—  |

Bei Aufträgen unter 50 Stück 20% Preisauflschlag.

Preisänderungen vorbehalten.



**Pflanzenkübel**, alt Eichen, geölt und lackiert, mit starken Reifen, Handhaben bronziert

| Höhe und obere Weite                 | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50    | 55    | 60 cm |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| ohne Handhaben p. St. M.             | 3.—  | 4.—  | 5.50 | 6.50 | 8.—  | 10.—  | 13.50 | 16.50 |
| mit „ „ „                            | 3.50 | 4.50 | 6.—  | 7.—  | 8.50 | 10.70 | 14.20 | 17.20 |
| einfach. Ausführung grün gestrichen, |      |      |      |      |      |       |       |       |
| ohne Handhaben p. St. M.             | 2.—  | 2.60 | 3.20 | 4.30 | 5.60 | 7.—   | 8.60  | 10.50 |




### Untersatzkreuzstücke

| für Kübel von    | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60 cm |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| grün gestrichen, |      |      |      |      |      |      |      |       |
| per Stück M.     | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.95  |

### Untersatzfeller,

fein gedreht, mit Füßchen, Eichen geölt, p. St. M. 2.— 2.50 3.— 3.60 4.20 5.— 5.50 6.—



**California**  
Selbsttätige Pflanzen- oder Rebenspritzen



**Piccola**



**Nr. 239**  
Pflanzseßholz



**Nr. 255**  
Pflanzkelle

**Nr. 71**  
Kantenstecher

### Pflanzen- oder Rebenspritze „California“

mit Einfüllsieb, Manometer, la. Gummischlauch, Strahlrohr und Verstäuber, geeignet für alle Flüssigkeiten, 22 Liter Inhalt, 10—15 Liter Flüssigkeit, da der übrige Raum für die Preßluft bestimmt ist . . . . . a M. 44.—

### Pflanzen- oder Rebenspritze „Piccola“

mit Manometer, ca. 1—1½ Liter Füllung . . . . . a M. 18.80

**Pflanzkellen Nr. 255** in gefälliger Ausführung . . . . . a M. 0.40

**Pflanzseßholz Nr. 239** mit Quergriff und Eisenspitze . . . . . a M. 0.40

**Rasenkantenstecher Nr. 71** . . . . . ohne Stiel a M. 2.—  
mit „ a „ 2.50

Preisänderungen vorbehalten.



**Rasenmäähmaschine „Brill's Reform“**

| Nr.                 | 1    | 2    | 3    | 4    |
|---------------------|------|------|------|------|
| Schnittbreite in mm | 260  | 312  | 364  | 416  |
| Gewicht . . . kg    | 12   | 13   | 14   | 15   |
| Preis per Stück M.  | 20.— | 22.— | 24.— | 26.— |



Rasenmäähmaschine „Reform“

**Rasenmäähmaschine „Brill's Optima“**

mit Präzisionskugellager D. R.-G.-M. und staub-sichern Helmölern. Wegen ihres leichten Ganges und äußerst kurzen Schneidens sehr zu empfehlen, namentlich für größere Park- und Gartenanlagen.

| Nr.                 | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---------------------|------|------|------|------|
| Schnittbreite in mm | 312  | 364  | 416  | 468  |
| Gewicht . . . kg    | 20   | 21   | 22   | 23   |
| Preis per Stück M.  | 35.— | 40.— | 42.— | 45.— |




Rasenmäähmaschine „Optima“

**Rasensprenger Nr. 310**


eignet sich ganz besonders zum Besprengen kleinerer Flächen, zerstäubt das Wasser je nach Zahl der Arme bis auf 70 qm im Umkreis.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 2 armig . . . . . | per Stück M. 9.— |
| 3 „ . . . . .     | „ „ 10.—         |
| 4 „ . . . . .     | „ „ 10.50        |



Rasensprenger


Preisänderungen vorbehalten.



Nr. 1827. Raupenschere




Nr. 1504. Präsentierschere




Nr. 2307. Baumsäge Hohenheimer



Nr. 243. Wühlisen



Nr. 3408. Heckenschere



Nr. 1806. Raupenschere




Nr. 1253.

Gartenscheren



Nr. 1024.



Nr. 2319. Baumsäge Iduna





Nr. 216. Stahlrechen



Nr. 95. Schlauchwagen

**Sägen: Baumsägen (Hohenheimer)** Nr. 2307, mittelgroß mit blankem Bügel, poliertem Holzheft und zwei Schrauben zum Drehen des Blattes, Blattlänge 33 cm a M. 2.—

„ **Baumsägen (Iduna)** Nr. 2319 mit Hakenheft; der Schnitt wird ganz glatt, wie mit einem Messer ausgeführt . . . . . „ „ 1.20

**Schärfsteine** bzw. Abziehsteine für Gartenmesser usw. . . . . a M. 0.60 und „ „ 0.80

**Scheren: Gartenschere** Nr. 1024, ganzblank, mit hohlen Schenkeln, 22 cm lang „ „ 1.60

Nr. 1253, halbblank, sehr fein, mit angenietetem Messer, Griff bronziert, mit ziehender Schneide, 22 cm lang „ „ 3.20

Nr. 1504, Präsentierschere, fein blank, zum Festhalten des abgeschnittenen Zweiges, 14 1/2 cm lang . . . . . „ „ 2.—

**Heckenschere** Nr. 3408, nach englischer Art, Blatt mit abgerundeten Schultern, Stahlflügelmutter mit polierten Heften . . . . . 2.75

**Raupenschere** Nr. 1806, Schneide blank, Griff geschwärzt, 20 cm lang „ „ 2.—

27 „ „ „ „ 2.70

Nr. 1827, ganz blank, Dülle bronziert, mit Vorrichtung zum Festhalten des abgeschnittenen Zweiges, 24 cm lang „ „ 5.50

**Schlauchwagen** Nr. 265, fahrbar . . . . . für 25 m 1/2“ Schlauch „ „ 9.—

Nr. 95, „ mit Handkurbel . . . . . 30 „ 1/2“ „ „ „ 15.—

Nr. 96, „ „ „ . . . . . 60 „ 1/2“ „ „ „ 17.—

**Schnurpfähle** zum Abstecken von Beeten usw., 33 cm lang, mit 7 m Schnur . . . . . „ „ 0.40

**Spaten** aus bestem Stahl, stark und bequem, ohne Stiel . . . . . „ „ 2.—

mit geradem Stiel, eingeseht „ „ 2.80

**Stahlrechen** D. R.-G.-M., aus einem Stück Stahl geschmiedet, fast unverwüßlich

Nr. 216 217 218 219 220

Zinkenzahl 8 10 12 14 16

ohne Stiel Preis per Stück M. 0.50 0.60 0.75 0.85 1.—

mit 1,50 m langem Stiel (eingeseht) per Stück M. 0.60 mehr.

mit gedrehten Zinken und Schaufel

Nr. 206 207 208 209 210

Zinkenzahl 8 10 12 14 16

ohne Stiel Preis per Stück M. 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60

mit 1,50 m langem Stiel (eingeseht) per Stück M. 0.60 mehr.

**Wühleisen** Nr. 243, verzinkt, mit poliertem Heft . . . . . per Stück M. 0.35


**Preisänderungen vorbehalten.**



**Futterringer für Vögel**, 10 Stück (unter 10 Stück werden nicht abgegeben) . . . . M. 2.—

1 Postpaket = 50 Futterringer einschließlich Packung . . . . . 8.—

Der Versand dieser Ringe findet nur in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar statt. Der Ring ist aus einer Mischung von bestem Vogelfutter und Talg zusammengesetzt, über eine dauerhafte Einlage gegossen. Außen sitzt ein Papierstreifen, der nach dem Aufhängen entfernt wird. Durch das Aufhängen unter einem Schutzdeckel, schwebend an Bindfaden, ist das Futter fast nur den nützlichen Insektenfressern, namentlich den Meisen zugänglich. Ferner kann das Futter leicht angenommen werden bei Schneefall, Glatteis, Rauhreif usw., wenn andere Futterplätze versagen.



Zweig mit Futterringer



Futterringer

### Nisthöhlen

Nr. 1 für Meisen, kleine Buntspechte usw.

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| Nisthöhlen, Durchmesser innen 60—95 mm | 1 St. | 10 St. |
| " Tiefe " 232 "                        | M.    | M.     |
| " Flug-Lochweite 32 "                  | 0.70  | 6.50   |
| " ganze Länge außen 292 "              |       |        |

Nr. 2 für Stare, Spechte, Kohlmeisen usw.

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| Nisthöhlen, Durchmesser innen 80—125 mm | 1 St. | 10 St. |
| " Tiefe " 335 "                         | M.    | M.     |
| " Flug-Lochweite 46 "                   | 0.90  | 8.50   |
| " ganze Länge außen 405 "               |       |        |



## Schädlings-Bekämpfungsmittel und Geräte.

### Insektenfanggürtel „Einfach“



Aufgerollt zum Gebrauch



Beim Anlegen



Fertig angelegt




mit Raupenleim überstrichen

Preisänderungen vorbehalten.



## Insektenfanggürtel

- 1) Der Zweck desselben ist, schädlichen Insekten und deren Larven an den Bäumen einen künstlichen Schlupfwinkel herzustellen, wo sie (auch von Vögeln) leicht gefunden und vernichtet werden können.



Nr. 2083. Baumkraßer

- 2) Das Anlegen des Gürtels erfolgt in den Monaten Mai bis September in folgender Art: Man schneidet von der Rolle ungefähr 1 cm mehr ab als der Umfang des Baumes beträgt, legt das Stück um den Baum, steckt die Enden ineinander und befestigt den Gürtel mit 2 Schnüren an den durch dunkle Linien bezeichneten Stellen. Bei alten Bäumen mit gerissener Rinde usw. ist die bestimmte Stelle vorher mittels Rindenbürste oder Baumkraßer glatt zu machen.
- 3) Die am meisten zu fangenden Schädlinge sind: Der kleine Frostspanner oder Frostnachtschmetterling, der Apfelblütenstecher, die Raupe des Apfelwicklers oder der Obstmade und der Pflaumenmade, sowie der Obstlaubminiermotte und der Zweigabstecher.
- 4) Um die von Oktober bis Dezember an den Obstbäumen hochsteigenden flügellosen Weibchen des Frostspanners zu fangen, bestreicht man Anfang Oktober die äußere Fläche des Gürtels mit Raupenleim.
- 5) Im November und Dezember reinigt man die Obstbäume mittels Bürste und Baumkraßer von abgestoßenen Rindenteilen, Moosen und Flechten und 14 Tage später nimmt man die Gürtel ab und verbrennt sie.

Original-Rollen a 30 m . . . . . M. 5.—  
meterweise a m . . . . . „ 0.20

**Antisual** zur sichern und radikalen Bekämpfung der Blut- oder Wollaus.

|                           |                |               |               |         |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 1 Glasflasche, Inhalt ca. | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{2}{5}$ | 1 Liter |
| M.                        | 0.80           | 1.20          | 2.—           | 4.—     |

**Gebrauchsanweisung:** Vor dem Gebrauch schüttelt man das Antisual kräftig und gießt es in ein sauberes, trocknes Gefäß. Man feuchtet einen kleinen, weichen Pinsel mit Antisual an und betupft die mit Blutlaus befallenen Stellen. Sehr vorteilhaft ist im Frühjahr die Benetzung des Wurzelhalses, der ersten Astgabelung und aller Wunden, weil hier die Überwinterung der Tiere stattfindet. Da der angefeuchtete Pinsel länger benutzt werden kann, ist der Verbrauch ein sehr sparsamer.

**Baumkraßer** oder Rindenreiniger Nr. 2083 mit 3 gleichen Seiten, eisernem Stiel und Holzheft . . . . . a M. 1.10

„**Cucasa**“, bester und bequemster Ersatz für Bordelaiser-Brühe gegen Peronospora.

Kartons für 10—20 50—100 100—200 Liter

Preis M. 0.50 0.90 1.80

Jedes Paket enthält eine Gebrauchsanweisung. Zum Spritzen belaubter Pflanzen nehme man die schwache, bei unbelaubten die starke Lösung.

(Lauril) **Raupenleim** . . . Blechdosen von 0,5 1 5 kg  
per Stück M. 0.60 1.— 4.—

**Quassia amara** (Fliegenholz) zur Vertilgung von Blattläusen, Milben usw.

|          |      |     |       |
|----------|------|-----|-------|
|          | 1    | 5   | 25 kg |
| Preis M. | 0.70 | 3.— | 14.—  |

**Gebrauchsanweisung:** Man kocht 2 kg Quassia in 10 Liter Wasser 2 Stunden, gießt die warme Brühe durch ein Tuch auf 2 kg gewöhnliche Schmierseife, löst letztere durch Umrühren auf und gibt dann noch 90 Liter kaltes Wasser hinzu. Es genügt, die befallenen Zweige in diese Brühe einzutauchen oder mit einer Pflanzenspritze zu bestäuben.

**Quassia-Seife** zur Vertilgung von Blattläusen, Milben usw.

|          |                |               |               |     |      |
|----------|----------------|---------------|---------------|-----|------|
|          | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | 1   | 4 kg |
| Preis M. | 0.50           | 1.—           | 1.60          | 3.— | 10.— |

**Gebrauchsanweisung:** Einen Teil Seife löst man in 100 Teilen warmem Wasser. Die Flüssigkeit ist dann direkt zum Gebrauch fertig. Man hat dabei das umständliche Kochen gespart.

**Rindenbürste** Nr. 410

aus Gußstahlendraht . . . . . a M. 1.20



Preisänderungen vorbehalten.



# Gartenbau-Literatur.

.....

- Nr. 1. **Die Lehre vom Baumschnitt**, für die deutschen Gärten bearbeitet, von *Dr. Ed. Lucas*. 8. Auflage von Ökonomierat *Fr. Lucas*, mit 4 lithographischen Tafeln und 256 Abbildungen, gebunden . . . . . M. 7.50
- Nr. 2. **Gartenbuch für Anfänger**. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und Blumenzucht, von *Johannes Böttner*. 9. vermehrte und verbesserte Auflage, mit 631 Abbildungen im Text. In dauerhaftem handlichem Gauzleinenband . . . . . M. 6.—
- Nr. 3. **Äpfel und Birnen**. Farbige Abbildungen und Beschreibungen der wichtigsten, deutschen Kernobstsorten, von *R. Goethe, H. Degenkolb und R. Mertens*, unter Leitung der Obst- und Weinbau-Gesellschaft der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. 104 Farbendrucktafeln nebst Text, gebunden . . . . . M. 17.—
- Nr. 4. **Praktisches Lehrbuch des Obstbaues**, von *Johannes Böttner*, Chefredakteur des Prakt. Ratgebers. Vierte Auflage, mit 580 Abbildungen im Text. Elegant und handlich gebunden . . . . . M. 6.—
- Nr. 5. **Anleitung zum Obstbau** mit spezieller Berücksichtigung der Spalierzucht. Ferner der Obstbaum, seine Erziehung, Pflanzung und Pflege, seine Freunde und Feinde, sowie die Verwertung seiner Ernten, von *F. Rebholz*, königl. Bayr. Landes-Inspektor. Siebente, verbesserte und vermehrte Auflage, mit 261 Abbildungen und einer Farbtafel . . . . . M. 3.—
- Nr. 6. **Das Buschobst**. Schnell lohnende Obstzucht nach vereinfachtem Verfahren, von *Johannes Böttner*. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 78 Abbildungen, broschiert M. 1.80
- Nr. 7. **Die Freilandzucht des Pfirsichbusches** im Deutschen Klima. Eine neue Erwerbsquelle für Gartenbesitzer und Landwirte, sowie eine Quelle erhöhter Gartenfreude für Liebhaber, von Prof. *Dr. Felix Rudolph*. Mit 15 Abbildungen . . . . M. 1.20
- Nr. 8. **Luftverwertung** in Garten, Feld, Weinberg, Wald und Wiese, nach langjährigen Beobachtungen und Versuchen von *B. Dabs* . . . . . M. 0.50  
Inhalt: 1. Tiefes Pflanzen, 2. Tiefes Unterbringen des Düngers, 3. Krustenbildung der Erdoberfläche, 4. Bearbeitung nasser Ackerkrume, 5. Betreten nasser Gartenbeete, Weinberge und Wiesen, 6. Stauwasser im Boden, 7. Unzeitiges und andauerndes Berieseln der Wiesen und Begießen der Pflanzen, 8. Versäumnis der Erdlockerung, 9. Verspätete Lichtung der Pflanzen, 10. Übermäßiger und unzeitiger Rückschnitt der Obstbäume, Reben und anderer Pflanzen.
- Nr. 9. **Pflanzung und Behandlung** von Rosen, Obst- und Zierbäumen, geheftet M. 0.10
- Nr. 10. **Praktische Erdbeerkultur-Anleitung** zur Anlage und Pflege von Erdbeerpflanzen, sowie zur Ernte, Verpackung, Versand und Verwertung der Früchte, von *E. Spangenberg*; mit 63 Abbildungen im Text . . . . . M. 1.50
- Nr. 11. **Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues**, von *Johannes Böttner*, vierte, vermehrte und verbesserte Auflage, mit 71 Abbildungen im Text . . . . . M. 1.50
- Nr. 12. **Was habe ich bei der Anlage eines Obstgutes zu beachten?** Nebst Gewinn- und Verlust-Berechnungen aus einem deutschen Obstgut vom gärtnerischen und kaufmännischen Standpunkt aus; von *F. Stoffert*, Leiter des Obstgutes Tannenhof-Schwerin . . . . . M. 1.50
- Nr. 13. **Der Großobstbau**. Hand- und Lehrbuch des Obstplantagenbetriebes, von Obstbauinspektor *A. Janson*. Mit 151 Textabbildungen und 1 Plan. Gebunden M. 5.50 (Für Gärtner, Landwirte und zum Gebrauch an Lehranstalten. Unter besonderer Berücksichtigung der Unter- und Zwischenkulturen.)
- Nr. 14. **Die Verwertung und Konservierung des Obstes und der Gemüse**, von Landwirtschaftsinspektor *Karl Bach*. 2. Auflage mit 87 Abbildungen. Gebunden M. 2.80
- Nr. 15. **Das Einmachen der Früchte** in 300 erprobten Rezepten, von *L. von Proepper*. 6. Auflage, herausgegeben von *Marie Breithaupt*. Gut gebunden . . . . . M. 2.—



- Nr. 16. **Das Obst in der Küche.** 520 erprobte Rezepte zur Verwertung der verschiedenen Obstsorten, von *L. von Proepper*. Zweite Auflage, herausgegeben von *Marie Breithaupt*. Gut gebunden . . . . . M. 2.—
- Nr. 17. **Obst-Einkochbüchlein** für den bürgerlichen und feineren Haushalt. Ausführliche Anleitung zur Behandlung des Frischobstes, sowie zur Herstellung von Pasten, Mus, Marmelade, Kraut, Gelee, Latwerge, Saft, Dunst- und Einmachobst, Limonaden-essig und Essigfrüchten, anhangsweise auch von Beerenobstweinen, alkoholfreien Weinen, Obstlikören und Obstessig. Dreizehnte Auflage mit 66 Abbildungen, von *R. Mertens*. Neu bearbeitet von *E. Junge*, Garteninspektor und Obstbaulehrer an der Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau in Geisenheim a. Rh. . M. 1. 50
- Nr. 18. **Rosenbuch für jedermann.** Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitsleistung. Unter Mitwirkung hervorragender Rosenzüchter bearbeitet von *Paul Juraß*; mit 8 Tafeln und 19 Textabbildungen. Gebunden M. 2. 50
- Nr. 19. **Handbuch der Nadelholzkunde.** Systematische Beschreibung, Verwendung und Kultur der Freiland-Koniferen, bearbeitet von *L. Beißner*, Königl. Garteninspektor am botanischen Garten der Universität Bonn, mit 138 nach der Natur aufgenommenen Abbildungen. Gebunden . . . . . M. 20.—
- NB. Der Verfasser, als erste Autorität auf dem Gebiete der Nadelholzkunde bekannt, hat in diesem Werke die Resultate seiner 30 jährigen Arbeit und Erfahrung in meisterhafter Darstellung niedergelegt.
- Nr. 20. **Die schönsten Blütensträucher für Gartenausschmückung und Treiberei** von *Max Hesdörffer*, mit 24 Farbendrucktafeln nach Originalen von *Johanna Beckmann* und zahlreichen Habitusbildern. Gebunden in Prachtband . . M. 10.—
- Nr. 21. **Gärtnerische Düngerlehre.** Ein praktisches Handbuch für Gärtner und Laien, Zierpflanzen im Zimmer und Garten, sowie Gemüse und Obstbäume auf angemessene Art zu düngen; von *H. Gaerdt*, weil. Kgl. Gartenbaudirektor. Dritte Auflage mit dreifachem alphabetischem Sachregister. In Leinen gebunden M. 3.—
- Nr. 22. **Praktischer Ungeziefer-Kalender.** Ein Buch für jedermann, von *Heinrich Frhr. v. Schilling*. Mit 332 Originalzeichnungen des Verfassers. In Leinen gebunden M. 3.—
- NB. Das Buch ist ein unentbehrliches Rüstzeug im Kampfe gegen Ungeziefer jeder Art. Es registriert in monatsweiser Anordnung das jeweils auftretende Ungeziefer und erinnert somit stets zum richtigen Zeitpunkt an die notwendigen Maßregeln. Dieser Kalender kann nicht warm genug empfohlen werden.
- Nr. 23. **Die wichtigsten Feinde der Obstbäume**, von Prof. *Dr. Gustav Lüstner*, Vorstand der Pflanzen-pathol. Versuchsstation der Kgl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim. Mit 30 Abbildungen . . . . . M. 1.—
- Nr. 24. **Die Obstbaumfeinde, ihre Erkennung und Bekämpfung**, von Prof. *Dr. O. v. Kirchner*. Mit über 100 Abbildungen. Zweite Auflage . . . . . M. 2.—
- Nr. 25. **Praktisches Taschenbuch für Gartenfreunde.** Ein Ratgeber für die Pflege und sachgemäße Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- und Obstgartens. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 137 Textabbildungen. Gebunden . . . . M. 3. 50
- Nr. 26. **Vorgarten- und Balkon-Ausschmückung**, von Garteninspektor *Arthur Glogau*. Mit 23 Abbildungen . . . . . M. 1.—



# Alphabetisches Register

der im Katalog enthaltenen Pflanzengattungen und diversen Artikel.

|   |                    |                              |                   |                                      |                    |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Abies . . . . .                             | 37 62              | Bastardindigo . . . . .      | 73                | Chionanthus . . . . .                | 77                 |
| Acaena . . . . .                            | 128                | Baumbänder . . . . .         | 155               | Christrose . . . . .                 | 134                |
| Acanthopanax . 71 108 109 120               | 120                | Baumhasel . . . . .          | 78 111 120        | Chrysanthemum . . . . .              | 130                |
| Acer . . . . .                              | 71 108 109 120 122 | Baumkrauter . . . . .        | 166               | Citrus . . . . .                     | 77                 |
| Achillea . . . . .                          | 128                | Baummesser . . . . .         | 158               | Cladrastis . . . . .                 | 77                 |
| Aconitum . . . . .                          | 128                | Baumpfähle . . . . .         | 160               | Clematis . . . . .                   | 126 130            |
| Acorus . . . . .                            | 128                | Baumsägen . . . . .          | 164               | Clethra . . . . .                    | 77                 |
| Actinidia . . . . .                         | 125                | Baumschlinge . . . . .       | 127               | Cocosstricke . . . . .               | 155                |
| Adonis . . . . .                            | 128                | Baumschützer . . . . .       | 155               | Colchicum . . . . .                  | 130                |
| Aepfel . . . . .                            | 10—16              | Baumwachs . . . . .          | 155               | Colutea . . . . .                    | 77                 |
| Aesculus . . . . .                          | 72 110 120         | Bellis . . . . .             | 130               | Convallaria . . . . .                | 130                |
| Ahorn . . . . .                             | 71 108 109 120     | Benthämie . . . . .          | 77                | Coreopsis . . . . .                  | 130                |
| Ailantus . . . . .                          | 72 110 120         | Berberis . . . . .           | 65 74 153         | Coriaria . . . . .                   | 131                |
| Akazien (Robinien) . 96 108 114 120 122 153 |                    | Beerenangelike . . . . .     | 129               | Cornus . . . . .                     | 77 108             |
| Akebia . . . . .                            | 125                | Berufungskraut . . . . .     | 132               | Coronilla . . . . .                  | 78                 |
| Akelei . . . . .                            | 129                | Betonica . . . . .           | 130               | Corylus . . . . .                    | 78 111 121 122     |
| Alant . . . . .                             | 135                | Betula . . . . .             | 74 108 110 122    | Cotoneaster . . . . .                | 79 108 111         |
| <b>Alleebäume</b> . . . . .                 | 109—120            | Bignonia siehe Tecoma        |                   | Cotula . . . . .                     | 131                |
| Alnus . . . . .                             | 73 110 120         | Bindematerial . . . . .      | 155               | Crataegus . . . . .                  | 79 108 111 120     |
| Alpenrosen . . . . .                        | 69                 | Biota . . . . .              | 39                | Crinum . . . . .                     | 131                |
| Althaea . . . . .                           | 128                | Birken . . . . .             | 74 108 110 122    | Cryptomeria . . . . .                | 45 62              |
| Alyssum . . . . .                           | 128                | Birnen . . . . .             | 17—21             | Cydonia . . . . .                    | 80                 |
| Amberbaum . . . . .                         | 89                 | Bitternuß . . . . .          | 76 110            | Cytisus . . . . .                    | 81 108             |
| Amelanchier . . . . .                       | 73                 | Blasenhülse . . . . .        | 77                | <b>Dahlia</b> . . . . .              | 131                |
| Amorpha . . . . .                           | 73                 | Blasenspiere . . . . .       | 93                | Daphne . . . . .                     | 67 81              |
| Ampelopsis . . . . .                        | 125                | Blumenkästen . . . . .       | 155               | Delphinium . . . . .                 | 131                |
| Amygdalus . . . . .                         | 73 108             | Blutströpfchen . . . . .     | 128               | Deutzia . . . . .                    | 81 108             |
| Anchusa . . . . .                           | 128                | Bocksdorn . . . . .          | 91                | Dianthus . . . . .                   | 132                |
| Andromeda . . . . .                         | 65                 | Borago . . . . .             | 130               | Dicentra . . . . .                   | 132                |
| Anemone . . . . .                           | 128                | Brombeeren . . . . .         | 29 97             | Dictamnus . . . . .                  | 132                |
| Anthemis . . . . .                          | 128                | Broussonetia . . . . .       | 75                | Diervilla . . . . .                  | 82 108             |
| Antirrhinum . . . . .                       | 129                | Buchen . . . . .             | 83 108 111 122    | Digitalis . . . . .                  | 132                |
| Antisual . . . . .                          | 166                | Buddleia . . . . .           | 75                | Diptam . . . . .                     | 132                |
| Aprikosen . . . . .                         | 22                 | Büffelbeere . . . . .        | 99                | Doronicum . . . . .                  | 132                |
| Aquilegia . . . . .                         | 129                | Buschklee . . . . .          | 88                | Douglastannen . . . . .              | 55                 |
| Arabis . . . . .                            | 129                | Buxbaum . . . . .            | 65 153            | Drachenkopf . . . . .                | 132                |
| Aralia . . . . .                            | 73 108 129         | Buxus . . . . .              | 65 153            | Dracocephalum . . . . .              | 132                |
| Araucaria . . . . .                         | 39                 | <b>Calycanthus</b> . . . . . | 75                | Draht . . . . .                      | 156                |
| Aristolochia . . . . .                      | 125                | Campanula . . . . .          | 130               | Drahtgeflecht . . . . .              | 156                |
| Armeria . . . . .                           | 129                | Caragana . . . . .           | 75 108 110 122    | <b>Ebereschen</b> 99 108 116 120 124 |                    |
| Aronia . . . . .                            | 74                 | Carlina . . . . .            | 130               | Eberraute . . . . .                  | 74                 |
| Artemisia . . . . .                         | 74                 | Carpinus . . . . .           | 75 110 120 153    | Echinops . . . . .                   | 132                |
| Arundo . . . . .                            | 129                | Carya . . . . .              | 75 110            | Edeldistel . . . . .                 | 132                |
| Asclepias . . . . .                         | 129                | Caryopteris . . . . .        | 76                | <b>Edelreiser</b> . . . . .          | 154                |
| Asperula . . . . .                          | 129                | Castanea . . . . .           | 27 76 108 110 120 | Edeltannen . . . . .                 | 37                 |
| Aster . . . . .                             | 129                | Catalpa . . . . .            | 76 108 111        | Edelweiß . . . . .                   | 136                |
| Astilbe . . . . .                           | 129                | Ceanothus . . . . .          | 76                | Efeu . . . . .                       | 67 126             |
| Aukuba . . . . .                            | 65                 | Cedrus . . . . .             | 39 62             | Ehrenpreis . . . . .                 | 140                |
| Azalea . . . . .                            | 65 69              | Celtis . . . . .             | 76 108            | Eibenbaum . . . . .                  | 55                 |
| <b>Baccharis</b> . . . . .                  | 74                 | Centaurea . . . . .          | 130               | Eibisch . . . . .                    | 85                 |
| <b>Bahnfarif</b> . . . . .                  | 5                  | Cephalanthus . . . . .       | 76                | Eichen . . . . .                     | 95 108 114 120 122 |
| Bambusa . . . . .                           | 129                | Cephalotaxus . . . . .       | 41                | <b>Einfassungspflanzen</b> . . . . . | 153                |
| Bambusrohr . . . . .                        | 129                | Cerastium . . . . .          | 130               | Eisenhut . . . . .                   | 128                |
| Baptisia . . . . .                          | 129                | Cercidiphyllum . . . . .     | 77                | Elacagnus . . . . .                  | 67 82              |
| Bärenklau . . . . .                         | 134                | Cercis . . . . .             | 77                | Elsbeere . . . . .                   | 99                 |
| Barblume . . . . .                          | 76                 | Chaenomeles . . . . .        | 77                | Elymus . . . . .                     | 132                |
| Barfaden . . . . .                          | 138                | Chamaecyparis . . . . .      | 41—45 62          | Enzian . . . . .                     | 133                |
|   |                    | Cheiranthus . . . . .        | 130               |                                      |                    |
|   |                    | Chelone . . . . .            | 130               |                                      |                    |



|   |                |                                  |            |                                     |            |
|---|----------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Epilobium . . . . .                       | 132            | Ginster . . . . .                | 83         | Hyacinthus . . . . .                | 134        |
| Erbsenstrauch . . . . .                   | 75 110         | Gipskraut . . . . .              | 134        | Hydrangea . . . . .                 | 87 108 134 |
| Erdbeeren . . . . .                       | 3              | Gladiolus . . . . .              | 133        | Hypericum . . . . .                 | 87         |
| Erdbeerstüßen . . . . .                   | 156            | Glanzgras . . . . .              | 138        |                                     |            |
| Erdbohrer . . . . .                       | 156            | Glanzmehlbeere . . . . .         | 68         | Jasminum (Jasmin) . . . . .         | 87         |
| Eremurus . . . . .                        | 132            | Gleditschia . . . . .            | 85 111     | Jasminotropete . . . . .            | 127        |
| Erica . . . . .                           | 67             | Glockenblume . . . . .           | 130        | Jätegabel . . . . .                 | 158        |
| Erigeron . . . . .                        | 132            | Glyceria . . . . .               | 133        | Johannisbeeren . . . . .            | 31 96      |
| Erlen . . . . .                           | 73 110 120     | Glycine siehe Wistaria . . . . . | 127        | Johanniskraut . . . . .             | 87         |
| Eryngium . . . . .                        | 132            | Goldlack . . . . .               | 130        | Judasbaum . . . . .                 | 77         |
| Eschen . . . . .                          | 83 111 120     | Goldlärche . . . . .             | 55         | Judas-Silberling . . . . .          | 76 137     |
| Eifketten . . . . .                       | 156            | Goldregen . . . . .              | 87 112     | Judenkirsche . . . . .              | 138        |
| Eulalia . . . . .                         | 132            | Goldrute . . . . .               | 139        | Juglans . . . . .                   | 27 120     |
| Eupatorium . . . . .                      | 133            | Götterbaum . . . . .             | 72 110 120 | Jungfernwein . . . . .              | 125        |
| Evonymus . . . . .                        | 82 126         | Grasnelke . . . . .              | 129        | Juniperus . . . . .                 | 46 62      |
| Exochorda . . . . .                       | 83             | <b>Grassamen</b> . . . . .       | 154        |                                     |            |
|   |                | Grindkraut . . . . .             | 139        | Iberis . . . . .                    | 134        |
| Fagus . . . . .                           | 83 108 111 122 | Gunnera . . . . .                | 133        | Ilex . . . . .                      | 67         |
| Färberhülse . . . . .                     | 129            | Gurkenkraut . . . . .            | 130        | <b>Immergrüne Gehölze</b> . . . . . | 64—69      |
| Färbernessel . . . . .                    | 133            | Gymnocladus . . . . .            | 85         | Incarvillea . . . . .               | 134        |
| Farnkraut . . . . .                       | 133            | Gynerium . . . . .               | 133        | Indigofera . . . . .                | 87         |
| Faulbaum . . . . .                        | 96             | Gypsophila . . . . .             | 134        | Indigostrauch . . . . .             | 87         |
| Felsenbirne . . . . .                     | 73             |                                  |            | Insektenfanggürtel . . . . .        | 165        |
| Felsenrose . . . . .                      | 69             | Hacken . . . . .                 | 158        | lnula . . . . .                     | 165        |
| Fetthenne . . . . .                       | 139            | <b>Hängebäume</b> . . . . .      | 122        | Iris . . . . .                      | 165        |
| Feuerdorn . . . . .                       | 69             | Hagebutten . . . . .             | 27 152     |                                     |            |
| Fichten . . . . .                         | 49             | Hahnenkopf . . . . .             | 85         | Kaiserkrone . . . . .               | 133        |
| Fiederspierstrauch . . . . .              | 99             | Hahnenfuß . . . . .              | 139        | Kalmia . . . . .                    | 67         |
| Filices . . . . .                         | 133            | Hainbuchen . . . . .             | 75 110 120 | Kalmus . . . . .                    | 128        |
| Fingerhut . . . . .                       | 132            | Hakenlilie . . . . .             | 132        | Kamille . . . . .                   | 128        |
| Fingerkraut . . . . .                     | 138            | <b>Halbstämme</b> . . . . .      | 108        | Kastanie . . . . .                  | 27 76 110  |
| Flammenblume . . . . .                    | 131            | Halesia . . . . .                | 85         | Kerria . . . . .                    | 87         |
| Flieber . . . . .                         | 101 108        | Halimodendron . . . . .          | 85 108     | Kiefer . . . . .                    | 53         |
| Fliegenholz . . . . .                     | 166            | Hamamelis . . . . .              | 85         | Kirschäpfel . . . . .               | 26 91 112  |
| Flügelnuß . . . . .                       | 95             | Hartheu . . . . .                | 87         | Kirschen . . . . .                  | 24 94      |
| Flußzeder . . . . .                       | 49             | Hartriegel . . . . .             | 77         | Kirschlorbeer . . . . .             | 68         |
| Föhre . . . . .                           | 53             | Haselnüsse . . . . .             | 27 78      | Kniphofia . . . . .                 | 136        |
| Fontanesia . . . . .                      | 83             | Hauslauch . . . . .              | 139        | Knopfblume . . . . .                | 76         |
| <b>Forstpflanzen</b> . . . . .            | 153            | Heckenkirche . . . . .           | 89         | Knöterich . . . . .                 | 127 138    |
| Forsythia . . . . .                       | 83             | Heckenpfähle . . . . .           | 160        | Knotenblume . . . . .               | 136        |
| Fraxinus . . . . .                        | 83 111 120     | <b>Heckenpflanzen</b> . . . . .  | 153        | Koelreuteria . . . . .              | 87         |
| Freiland—Gloxinie . . . . .               | 134            | Heckenschere . . . . .           | 164        | Kokardenblume . . . . .             | 133        |
| Fritillaria . . . . .                     | 133            | Hedera . . . . .                 | 67 126     | Kokosstricke . . . . .              | 155        |
| Fünffingerstrauch . . . . .               | 94             | Hedysarum . . . . .              | 85         | Kolbenrohr . . . . .                | 140        |
| Funkia . . . . .                          | 133            | Helenium . . . . .               | 134        | <b>Koniferen</b> . . . . .          | 37—61      |
| Futterringe . . . . .                     | 165            | Helianthus . . . . .             | 134        | Königskerze . . . . .               | 140        |
|   |                | Heliopsis . . . . .              | 134        | Kopfeibe . . . . .                  | 41         |
| Gaillardia . . . . .                      | 133            | Helleborus . . . . .             | 134        | Kopuliersmesser . . . . .           | 158        |
| Galanthus . . . . .                       | 133            | Hemerocallis . . . . .           | 134        | Korkbaum . . . . .                  | 92         |
| Gamander . . . . .                        | 102            | Hemlockstannen . . . . .         | 61         | Kornblume . . . . .                 | 130        |
| Gänseblümchen . . . . .                   | 130            | Hepatica . . . . .               | 134        | Kornelkirsche . . . . .             | 77         |
| Gänsekraut . . . . .                      | 129            | Heracleum . . . . .              | 134        | Kranzspiere . . . . .               | 101        |
| <b>Gartenbau-Literatur</b> . . . . .      | 167            | Herbstzeitlose . . . . .         | 130        | Kreuzdorn . . . . .                 | 96         |
| Gartenpfähle . . . . .                    | 160            | Herzblume . . . . .              | 132        | Kreuzkraut . . . . .                | 139        |
| Gartenwalze . . . . .                     | 158            | Hesperis . . . . .               | 134        | Kreuzstrauch . . . . .              | 74         |
| <b>Gärtnerei-Bedarfsartikel</b> . . . . . | 155—166        | Heuchera . . . . .               | 134        | Kronwicke . . . . .                 | 78         |
|   |                | Hiba . . . . .                   | 61         | Kugeldistel . . . . .               | 132        |
| Geißblatt . . . . .                       | 126            | Hibiscus . . . . .               | 85         | Kunigundenkraut . . . . .           | 133        |
| Geißklee . . . . .                        | 81             | Himbeeren . . . . .              | 29 97      |                                     |            |
| Gelbholz . . . . .                        | 78 105         | Hippophaë . . . . .              | 85         | Laburnum . . . . .                  | 87 108 112 |
| Gemswurz . . . . .                        | 132            | Hollunder . . . . .              | 98         | Larix . . . . .                     | 49         |
| Genista . . . . .                         | 83             | Holodiscus . . . . .             | 85         | Lärchen . . . . .                   | 49         |
| Gentiana . . . . .                        | 133            | Holzetiketten . . . . .          | 156        | Lathyrus . . . . .                  | 136        |
| Georgine . . . . .                        | 131            | Holzvolle . . . . .              | 159        | <b>Laubhölzer</b> . . . . .         | 71—105     |
| Gerberstrauch . . . . .                   | 131            | Hopfenbuche . . . . .            | 92         | Laugenblume . . . . .               | 131        |
| Geum . . . . .                            | 133            | Hornkraut . . . . .              | 130        | Lebensbäume . . . . .               | 57         |
| Gewürzstrauch . . . . .                   | 75             | Hortensie . . . . .              | 87 134     | Lebensbaum-Zypressen . . . . .      | 41—45      |
| Gießkannen . . . . .                      | 158            | Hülsen . . . . .                 | 67         | Leberblümchen . . . . .             | 134        |
| Ginkgo . . . . .                          | 46 62          |                                  |            |                                     |            |



|                                     |                 |                                |                |                                  |                     |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Lederblume . . . . .                | 95              | Obstkisten . . . . .           | 159            | Purpurglöckchen . . . . .        | 134                 |
| Ledum . . . . .                     | 67              | Obstpflücker . . . . .         | 159            | Pyracantha . . . . .             | 69                  |
| Leontopodium . . . . .              | 136             | Obstschrank . . . . .          | 159            | Pyrethrum . . . . .              | 139                 |
| Lespedeza . . . . .                 | 88              | Obstverpackung . . . . .       | 159            |                                  |                     |
| Leucojum . . . . .                  | 136             | Ochsenauge . . . . .           | 140            | Quassia . . . . .                | 166                 |
| Leycesteria . . . . .               | 89              | Okushenzunge . . . . .         | 128            | Quercus . . . . .                | 95 108 114 120 122  |
| Liatris . . . . .                   | 136             | Oelweide . . . . .             | 67 82          | Quitten . . . . .                | 27 79               |
| Libocedrus . . . . .                | 49 62           | Oenothera . . . . .            | 137            |                                  |                     |
| Lichtnelke . . . . .                | 137             | Oesen . . . . .                | 156            | Rainweide . . . . .              | 89 153              |
| Ligustrum . . . . .                 | 89 108 153      | Okulirmesser . . . . .         | 158            | Ranunculus . . . . .             | 139                 |
| Lilienschweif . . . . .             | 132             | Orobis . . . . .               | 137            | Raphiabast . . . . .             | 155                 |
| Lilium (Lilien) . . . . .           | 136             | Osagedorn . . . . .            | 91             | Rasenkantenstecher . . . . .     | 161                 |
| Linden . . . . .                    | 104 116 120 124 | Osmanthus . . . . .            | 68             | Rasennähmaschinen . . . . .      | 162                 |
| Liquidambar . . . . .               | 89              | Ostrya . . . . .               | 92             | Rasensprenger . . . . .          | 162                 |
| Liriodendron . . . . .              | 89 108 112      |                                |                | Rasenwalze . . . . .             | 158                 |
| <b>Literatur</b> . . . . .          | 167—168         | Paeonia . . . . .              | 92 138         | Raupenleim . . . . .             | 166                 |
| Lonicera . . . . .                  | 89 126          | Palmlilie . . . . .            | 140            | Raupenscheren . . . . .          | 164                 |
| Löwenmaul . . . . .                 | 129             | Pampasgras . . . . .           | 133            | Rebenspiße . . . . .             | 161                 |
| Lunaria . . . . .                   | 137             | Papaver . . . . .              | 137            | Reineclauden . . . . .           | 25                  |
| Lupinus (Lupinen) . . . . .         | 137             | Papier Maulbeerbaum . . . . .  | 77             | Rhabarber . . . . .              | 139                 |
| Lychnis . . . . .                   | 137             | Pappel . . . . .               | 93             | Rhamnus . . . . .                | 96                  |
| Lycium . . . . .                    | 91              | Parrotia . . . . .             | 92             | Rheum . . . . .                  | 139                 |
|                                     |                 | Paulownia . . . . .            | 92 108 112     | Rhododendron . . . . .           | 69                  |
| Maclura . . . . .                   | 91              | Pavia siehe Aesculus . . . . . | 72             | Rhodotypus . . . . .             | 96                  |
| Mädchenauge . . . . .               | 130             | Pentstemon . . . . .           | 138            | Rhus . . . . .                   | 96                  |
| Magnolia . . . . .                  | 68              | Periploca . . . . .            | 127            | Ribes . . . . .                  | 96                  |
| Mahonien . . . . .                  | 65 74 153       | Pernetia . . . . .             | 68             | Riesen-Steinbrech . . . . .      | 137                 |
| Maiglöckchen . . . . .              | 130             | Perückenstrauch . . . . .      | 96             | Rindenbürste . . . . .           | 166                 |
| Malus . . . . .                     | 91 108 112 122  | Pfähle . . . . .               | 160            | Rindenreiniger . . . . .         | 166                 |
| Malve . . . . .                     | 128             | Pfeifenblume . . . . .         | 125            | Riifersporn . . . . .            | 131                 |
| Mammutbaum . . . . .                | 55              | Pfeifenstrauch . . . . .       | 92             | Robinia 97 108 114 120 122 153   |                     |
| Mandel . . . . .                    | 73              | Pferdehacke . . . . .          | 160            | <b>Rosen</b> . . . . .           | 141—152             |
| Magaretenblume . . . . .            | 139             | Pfingstrose . . . . .          | 92 138         | Rosenarten . . . . .             | 152                 |
| Margueriten . . . . .               | 130             | Pfirsiche . . . . .            | 23             | Rofkastanie . . . . .            | 72 110 120          |
| Maronen . . . . .                   | 27 120          | Pflanzenkübel . . . . .        | 161            | Rotbuche . . . . .               | 83 108 111 122 153  |
| Mauerröschchen . . . . .            | 87              | Pflanzenspiße . . . . .        | 161            | Roldorn . . . . .                | 79 108 111          |
| Maschendraht . . . . .              | 156             | Pflanzkellen . . . . .         | 161            | Rottannen . . . . .              | 49 153              |
| Maulbeeren . . . . .                | 31 92 112       | Pflanzsetzholz . . . . .       | 161            | Rubus . . . . .                  | 97                  |
| Megasea . . . . .                   | 137             | Pflaumen . . . . .             | 25 94          | Rudbeckia . . . . .              | 139                 |
| Mehlbeeren . . . . .                | 99 108 116      | Pfriemen . . . . .             | 81 100         | Rüster . . . . .                 | 104 108 118 120 124 |
| Mehlbeerspiere . . . . .            | 85              | Phalaris . . . . .             | 138            |                                  |                     |
| Messer . . . . .                    | 158             | Phellodendron . . . . .        | 92             | Sadebaum . . . . .               | 46                  |
| Mespilus siehe Pyracantha . . . . . | 69              | Philadelphus . . . . .         | 92             | Säckelblume . . . . .            | 76                  |
| Milchlattich . . . . .              | 137             | Phillyrea . . . . .            | 68             | Sägen . . . . .                  | 164                 |
| Mirabellen . . . . .                | 25              | Phlox . . . . .                | 138            | Salix . . . . .                  | 98 108 116 120 124  |
| Mispeln . . . . .                   | 26              | Phoetinia . . . . .            | 68             | Salzstrauch . . . . .            | 85                  |
| Mohn . . . . .                      | 137             | Physalis . . . . .             | 138            | Sambucus . . . . .               | 98                  |
| Montbretia . . . . .                | 137             | Physocarpus . . . . .          | 92             | Sanddorn . . . . .               | 85                  |
| <b>Moorbeetpflanzen</b> . . . . .   | 64—69           | Picea . . . . .                | 49—53 62 153   | Sandnelke . . . . .              | 149                 |
| Morus . . . . .                     | 92 108 112      | Pimpernuß . . . . .            | 101            | Sauerdorn . . . . .              | 74                  |
| Mulgedium . . . . .                 | 137             | Pinus . . . . .                | 53 63          | Saxifraga . . . . .              | 139                 |
| Myosotis . . . . .                  | 137             | Pirus . . . . .                | 112 122        | Scabiosa . . . . .               | 139                 |
| Myrica . . . . .                    | 92              | Platanus . . . . .             | 93 112 120     | Schädlings-Bekämpfung . . . . .  | 165                 |
|                                     |                 | Platterbse . . . . .           | 136            | Schafgarbe . . . . .             | 128                 |
| Nachtkerze . . . . .                | 137             | Plattglocke . . . . .          | 140            | Schärfsteine . . . . .           | 164                 |
| Nachtviole . . . . .                | 134             | Polemonium . . . . .           | 138            | Scheinfelsenbirne . . . . .      | 82                  |
| <b>Nadelhölzer</b> . . . . .        | 37—61           | Polygonum . . . . .            | 127 138        | Scheinkerrie . . . . .           | 96                  |
| Narcissus . . . . .                 | 137             | Populus . . . . .              | 93 108 112 120 | Scheinequiite . . . . .          | 77                  |
| Nektarinen . . . . .                | 23              | Porst . . . . .                | 67             | Scheinzist . . . . .             | 130                 |
| Nelken . . . . .                    | 132             | Porzellanetiketten . . . . .   | 156            | Scheren . . . . .                | 164                 |
| Nelkenwurz . . . . .                | 133             | Potentilla . . . . .           | 94 138         | Schierlingstanne . . . . .       | 61                  |
| Nisthöhlen . . . . .                | 165             | Prachtscharte . . . . .        | 136            | Schildblume . . . . .            | 130                 |
| Nixenblume . . . . .                | 137             | Prachtspiere . . . . .         | 129            | Schirmtanne . . . . .            | 55                  |
| Nuphar . . . . .                    | 137             | Primula . . . . .              | 138            | Schlauchwagen . . . . .          | 164                 |
| Nymphaea . . . . .                  | 137             | Prunus 68 94 108 114 120 122   |                | Schlehe . . . . .                | 94                  |
|                                     |                 | Pseudolarix . . . . .          | 55             | Schleifenblume . . . . .         | 134                 |
| <b>Obstbäume</b> . . . . .          | 10—35           | Pseudotsuga . . . . .          | 55 63          | <b>Schlingpflanzen</b> . . . . . | 125—127             |
| Obstgestelle . . . . .              | 159             | Ptelea . . . . .               | 95             | Schlüsselblume . . . . .         | 138                 |
| Obsthorden . . . . .                | 159             | Pterocarya . . . . .           | 95             |                                  |                     |



|                                   |                    |                                   |                     |                                      |                    |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Schnurpfähle . . . . .            | 164                | Stechpalme . . . . .              | 67                  | Vergißmeinnicht . . . . .            | 137                |
| Schneeball . . . . .              | 104                | Steinbrech . . . . .              | 139                 | <b>Verkaufsbedingungen</b> . . . . . | 4                  |
| Schneebeere . . . . .             | 101                | Steinkraut . . . . .              | 128                 | Veronica . . . . .                   | 140                |
| Schneeglöckchen . . . . .         | 77                 | Steinlinde . . . . .              | 68                  | Viburnum . . . . .                   | 104 108            |
| Schneeglöckchen . . . . .         | 133                | Stephanandra . . . . .            | 101                 | Vinca . . . . .                      | 127                |
| Schusserbaum . . . . .            | 85                 | Sternblume . . . . .              | 129                 | Viola . . . . .                      | 140                |
| Schwarzdorn . . . . .             | 94                 | Stiefmütterchen . . . . .         | 141                 | Vogelbeere 99 108 116 120 124        | 124                |
| Schwertlilie . . . . .            | 135                | Stokesia . . . . .                | 140                 | Vogel-Futterringe . . . . .          | 165                |
| Sciadopitys . . . . .             | 55                 | Stockrose . . . . .               | 128                 |                                      |                    |
| Sedum . . . . .                   | 139                | Strahlengriffel . . . . .         | 125                 | Wacholder . . . . .                  | 46                 |
| Seerose . . . . .                 | 137                | Strandroggen . . . . .            | 132                 | Wachsmyrte . . . . .                 | 92                 |
| Seidelbast . . . . .              | 67 81              | Süßgras . . . . .                 | 133                 | Wahlenbergia . . . . .               | 140                |
| Seidenpflanze . . . . .           | 129                | Sumach . . . . .                  | 96                  | Waldrebe . . . . .                   | 126 130            |
| Sempervivum . . . . .             | 139                | Sumpfpypresse . . . . .           | 55                  | Waldmeister . . . . .                | 129                |
| Senecio . . . . .                 | 139                | Symphoricarpus . . . . .          | 101                 | Waldwicke . . . . .                  | 137                |
| Sequoia . . . . .                 | 55                 | Syringa . . . . .                 | 101 108             | Walnüsse . . . . .                   | 27 120             |
| Shepherdia . . . . .              | 99                 |                                   |                     | Wasserrohr . . . . .                 | 129                |
| Siegwurz . . . . .                | 133                | Tagilie . . . . .                 | 134                 | Wegdorn . . . . .                    | 96                 |
| Silberdistel . . . . .            | 130                | Tamarix (Tamariske) . . . . .     | 102                 | Weiden . . . . .                     | 98 108 116 120 124 |
| Singrün . . . . .                 | 127                | Taxodium . . . . .                | 55                  | Weidenröschen . . . . .              | 132                |
| Solidago . . . . .                | 139                | Taxus . . . . .                   | 55 63               | Weigelia . . . . .                   | 82                 |
| <b>Solitäräume</b> . . . . .      | 120                | Tecoma . . . . .                  | 127                 | Wellingtonie . . . . .               | 55                 |
| <b>Solitärkoniferen</b> . . . . . | 62                 | Telekia . . . . .                 | 140                 | Weinreben . . . . .                  | 29                 |
| Sonnenauge . . . . .              | 134                | Teucrium . . . . .                | 102                 | Weißdorn . . . . .                   | 79 108 111 120 153 |
| Sonnenblume . . . . .             | 134                | Thalictrum . . . . .              | 140                 | Weißtannen . . . . .                 | 37                 |
| Sonnenbraut . . . . .             | 134                | Thuya . . . . .                   | 57—61               | Wiesenraute . . . . .                | 140                |
| Sophora . . . . .                 | 99 116 124         | Thuyopsis . . . . .               | 61                  | Wilder Jasmin . . . . .              | 92                 |
| Sorbaria . . . . .                | 99                 | Tilia . . . . .                   | 104 116 120 124     | Windröschen . . . . .                | 128                |
| Sorbus . . . . .                  | 99 108 116 120 124 | Tonkinstäbe . . . . .             | 160                 | Wistaria . . . . .                   | 108 127            |
| Spargelmesser . . . . .           | 158                | Torfmyrte . . . . .               | 68                  | Wucherblume . . . . .                | 130                |
| Spargelpflanzen . . . . .         | 29                 | <b>Traueräume</b> . . . . .       | 122                 | Wühlleisen . . . . .                 | 164                |
| Spalierdrahthalter . . . . .      | 156                | Tritome siehe Kniphofia . . . . . | 136                 |                                      |                    |
| Spartium . . . . .                | 100                | Trollblume . . . . .              | 140                 | Xanthoceras . . . . .                | 105                |
| Spaten . . . . .                  | 164                | Trollius . . . . .                | 140                 |                                      |                    |
| Sperrkraut . . . . .              | 138                | Trompetenbaum . . . . .           | 76 108 111          | Yucca . . . . .                      | 140                |
| Spierstrauch . . . . .            | 100 140            | Tsuga . . . . .                   | 61 63               |                                      |                    |
| Spindelbaum . . . . .             | 82 126             | Tulipa . . . . .                  | 140                 | Zaubernuß . . . . .                  | 85                 |
| Spiraea . . . . .                 | 100 140            | Tulpen . . . . .                  | 140                 | Zeder . . . . .                      | 39                 |
| Stachelbeeren . . . . .           | 34 96              | Tulpenbaum . . . . .              | 89 108 112          | <b>Zierhalbstämme</b> . . . . .      | 108                |
| Stachel-Kraftwurz . . . . .       | 71                 | Typha . . . . .                   | 141                 | Zinkdraht . . . . .                  | 156                |
| Stachelnüsschen . . . . .         | 128                |                                   |                     | Zitrone . . . . .                    | 77                 |
| Stahlrechen . . . . .             | 164                | Ulex . . . . .                    | 105                 | Zwergmispel . . . . .                | 79 111             |
| Staphylea . . . . .               | 101                | Ulmus . . . . .                   | 104 108 118 120 124 | Zwerg-Vogelbeere . . . . .           | 74                 |
| Statice . . . . .                 | 140                |                                   |                     | Zwetschen . . . . .                  | 25                 |
| <b>Stauden</b> . . . . .          | 128—140            | Veilchen . . . . .                | 140                 | Zürgelbaum . . . . .                 | 76                 |
| Stechginster . . . . .            | 104                | Verbascum . . . . .               | 140                 |                                      |                    |











Dahlg. REUTER & Co. Dampstedt 7 Oberpfeils

**Buxus sempervirens (Kugelformen)**



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)